

## ІНТЕГРАЛЬНІ НЕРІВНОСТІ В ТЕОРІЇ РІВНЯНЬ ГІПЕРБОЛІЧНОГО ТИПУ З ІМПУЛЬСНИМ ЗБУРЕННЯМ

Массалітіна Є. В.<sup>a</sup>, Кільчинський О. О.<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Національний технічний університет України “КПІ”  
пр-т Перемоги 37, 03056, Київ, Україна

<sup>b</sup> Державний економіко-технологічний університет транспорту  
вул. Лукашевича 19, 03049, Київ, Україна

(Отримано 3 вересня 2013 р.)

Знайдена інтегральна оцінка для функції двох змінних, що задовольняє рівняння гіперболічного типу та отримує імпульсні збурення як дискретного, так і неперервного характеру на заданих кривих.

Ключові слова: інтегральні нерівності, рівняння гіперболічного типу, імпульсні збурення.

**Ключові слова:** інтегральні нерівності, рівняння гіперболічного типу, імпульсні збурення.

2000 MSC: 34A37, 35L70, 58J45

УДК: 517.9

### I. Постановка задачі

Інтегральні нерівності часто використовують під час вивчення широкого кола питань, пов'язаних із дослідженням поведінки розв'язків диференціальних, інтегро-диференціальних, інтегральних рівнянь, а також рівнянь в частинних похідних [1–3]. У статті наведені результати, що узагальнюють оцінку, отриману в роботі [4] для функції двох змінних, яка задовольняє рівняння в частинних похідних другого порядку гіперболічного типу на випадок розривних функцій, а також продовжують дослідження, розпочаті в роботах [5, 6].

Розглянемо функцію  $v(x, y)$ , що задовольняє рівняння гіперболічного типу [7] в деякій області  $D^* \subset \mathbb{R}^2$ , в припущенні, що вона на заданих кривих

$$L_j = \{(x, y) : \psi_j(x, y) = 0\}, \quad j = \overline{1, n},$$

отримує імпульсні збурення, які можуть відбуватися як в фіксованих точках на кривій, так і миттєво на всій довжині кривої, тобто можуть мати як дискретний, так і неперервний характер. Область  $D^* = D \cup L$ , де

$$L = \bigcup_{j=1}^n L_j, \quad L_i \cap L_j = \emptyset, \quad i \neq j, \quad D = \bigcup_{j=1}^n D_j,$$

$$D_1 = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0, \psi_1(x, y) < 0\},$$

$$D_j = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0, \psi_{j-1}(x, y) > 0, \psi_j(x, y) < 0\}, \quad j = \overline{2, n};$$

Нехай еволюція цього процесу описується рівнянням гіперболічного типу з імпульсним збуренням

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y} = H^*(x, y, v(x, y)), \\ v(x, y_0) = g_1^*(x), \\ v(x_0, y) = g_2^*(y), \end{cases} \quad \forall (x, y) \notin L_j, \quad (1)$$

$$\Delta v(x, y) \Big|_{(x, y) \in L_j} = \int_{L_j \cap G_n} \omega_j^*(M) v(M) d\mu_{\psi_j}, \quad (2)$$

де інтеграл Лебега-Стілтєса (2) описує умову стрибка функції  $v(x, y)$  на кривих  $L_j$ , функції  $\omega_j^*(x, y)$ ,  $j = \overline{1, n}$ ,  $H^*(x, y, v(x, y))$  неперервні в області  $D^*$ , область

$$G_j = \{(s, t) : (x, y) \in D_j,$$

$$(x_0, y_0) \in D_1, x_0 \leq s \leq x, y_0 \leq t \leq y\}, \quad j = \overline{1, n},$$

функції  $g_1^*(x)$ ,  $g_2^*(y)$  є диференційовними та задовольняють умову узгодженості

$$g_1^*(x_0) = g_2^*(y_0), \quad (3)$$

причому  $v(x_0, y_0) \neq 0$ .

### II. Оцінка функції, що задовольняє рівняння гіперболічного типу з імпульсним збуренням

**Теорема 1.** *Нехай в області  $D^* \subset \mathbb{R}^2$ ,  $D^* = D \cup L$  виконуються умови:*

1. Невід'ємна функція  $u(x, y)$  є неперервною в області  $D$ ;
2.  $L = \bigcup_{j=1}^n L_j$ , де  $L_j = \{(x, y) : \psi_j(x, y) = 0\}$  – сукупність кривих, на яких функція  $u(x, y)$  має скінченний стрибок,  $L_i \cap L_j = \emptyset$ ,  $i \neq j$ ;
3. Криві  $\psi_j(x, y)$  є неперервно диференційовними та монотонно спадними,  $\text{grad } \psi_j(x, y) > 0$ ;

4.  $\mu_{\psi_j}$  – міра Лебега-Стілтєса [8], яка зосереджена на кривій  $L_j$ ;

5. Функція  $H(x, y, u(x, y))$  – неперервна та невід’ємна відносно своїх змінних,  $H(x, y, u(x, y)) \leq f(x, y)h(u)$ ;

6. Функції  $\omega_j(x, y)$ ,  $j = \overline{1, n}$ ,  $f(x, y)$  – неперервні та невід’ємні в області  $D^*$ ;

7. Функція  $h(u)$  – неперервна, додатна та неспадна відносно змінної  $u$ , задовольняє умову  $h(vw) \leq h(v)h(w)$ ;

8. Функції  $g_1(x)$ ,  $g_2(y)$  є додатними, диференціальними та задовольняють умову узгодженості  $g_1(x_0) = g_2(y_0)$ ;

9.  $\frac{dg_1(x)}{dx} \geq 0$ ,  $\frac{dg_2(y)}{dy} \geq 0$ ;

10. Функція  $u(x, y)$  задовольняє в області  $D^*$  інтегральну нерівність

$$u(x, y) \leq g_1(x) + g_2(y) + \iint_{G_n} H(s, t, u(s, t)) dsdt + \sum_{j=1}^{n-1} \int_{L_j \cap G_n} \omega_j(M) u(M) d\mu_{\psi_j}, \quad (4)$$

де  $M(\xi, \eta)$  – змінна точка кривої  $L_j$ .

Тоді для  $(x, y) \in \widetilde{D}_i$ ,  $i = \overline{2, n}$ , справджуються оцінки:

$$u(x, y) \leq \prod_{j=1}^{i-1} \left( 1 + \int_{L_j \cap G_i} \omega_j(M) d\mu_{\psi_j} \right) \times$$

$$\times \Psi^{-1} \left\{ \int_{v_0}^{g_1(x)+g_2(y_0)} \frac{ds}{h(s)} + \int_{y_0}^y \frac{g'_2(t) dt}{h(g_1(x_0) + g_2(t))} + \iint_{G_i} f(s, t) h \left( \prod_{j=1}^{i-1} \left( 1 + \int_{L_j \cap G_i} \omega_j(M) d\mu_{\psi_j} \right) \right) dsdt \right\} \quad (5)$$

або

$$u(x, y) \leq \prod_{j=1}^{i-1} \left( 1 + \int_{L_j \cap G_i} \omega_j(M) d\mu_{\psi_j} \right) \times \Psi^{-1} \left\{ \int_{v_0}^{g_1(x_0)+g_2(y)} \frac{dt}{h(t)} + \int_{x_0}^x \frac{g'_1(s) ds}{h(g_1(s) + g_2(y_0))} + \iint_{G_i} f(s, t) h \left( \prod_{j=1}^{i-1} \left( 1 + \int_{L_j \cap G_i} \omega_j(M) d\mu_{\psi_j} \right) \right) dsdt \right\}, \quad (6)$$

де  $\Psi^{-1}$  – функція, обернена до функції

$$\Psi(v) = \int_{v_0}^v \frac{ds}{h(s)}, \quad 0 < v_0 \leq v, \quad (7)$$

а область  $\widetilde{D}_i$ ,  $i = \overline{2, n}$ , визначається відповідно з таких співвідношень:

$$\widetilde{D}_i = \left\{ (x, y) \in D_i : \int_{v_0}^{g_1(x)+g_2(y_0)} \frac{ds}{h(s)} + \int_{y_0}^y \frac{g'_2(t) dt}{h(g_1(x_0) + g_2(t))} + \iint_{G_i} f(s, t) h \left( \prod_{j=1}^{i-1} \left( 1 + \int_{L_j \cap G_i} \omega_j(M) d\mu_{\psi_j} \right) \right) dsdt \in Dom(\Psi^{-1}) \right\}$$

або

$$\widetilde{D}_i = \left\{ (x, y) \in D_i : \int_{v_0}^{g_1(x_0)+g_2(y)} \frac{dt}{h(t)} + \int_{x_0}^x \frac{g'_1(s) ds}{h(g_1(s) + g_2(y_0))} + \iint_{G_i} f(s, t) h \left( \prod_{j=1}^{i-1} \left( 1 + \int_{L_j \cap G_i} \omega_j(M) d\mu_{\psi_j} \right) \right) dsdt \in Dom(\Psi^{-1}) \right\}.$$

□ *Доведення.* Для доведення використаємо метод математичної індукції. Нехай  $(x, y) \in D_1$ . Враховуючи умову 5 теореми 1, можна записати

$$u(x, y) \leq g_1(x) + g_2(y) + \iint_{G_1} H(s, t, u(s, t)) dsdt \leq g_1(x) + g_2(y) + \iint_{G_1} f(s, t) h(u(s, t)) dsdt. \quad (8)$$

Позначимо праву частину нерівності (8)

$$\Phi_u(x, y) = g_1(x) + g_2(y) + \iint_{y \leq x} f(s, t) h(u(s, t)) ds dt. \quad (9)$$

Оскільки функція  $u(x, y)$  в області  $D_1$  не зазнає імпульсного впливу, то за теоремою 1.5.2, с. 55 [1] для нерівності (8) буде правильною оцінка

$$u(x, y) \leq \Psi^{-1} \left\{ \int_{v_0}^{g_1(x) + g_2(y_0)} \frac{ds}{h(s)} + \int_{y_0}^y \frac{g'_2(t) dt}{h(g_1(x_0) + g_2(t))} + \iint_{G_1} f(s, t) ds dt \right\} \quad (10)$$

або

$$u(x, y) \leq \Psi^{-1} \left\{ \int_{v_0}^{g_1(x_0) + g_2(y)} \frac{dt}{h(t)} + \int_{x_0}^x \frac{g'_1(s) ds}{h(g_1(s) + g_2(y_0))} + \iint_{G_1} f(s, t) ds dt \right\}, \quad (11)$$

за умови, що

$$\int_{v_0}^{g_1(x) + g_2(y_0)} \frac{ds}{h(s)} + \int_{y_0}^y \frac{g'_2(t) dt}{h(g_1(x_0) + g_2(t))} + \iint_{G_1} f(s, t) ds dt \in \text{Dom}(\Psi^{-1})$$

або

$$\int_{v_0}^{g_1(x_0) + g_2(y)} \frac{dt}{h(t)} + \int_{x_0}^x \frac{g'_1(s) ds}{h(g_1(s) + g_2(y_0))} + \iint_{G_1} f(s, t) ds dt \in \text{Dom}(\Psi^{-1}).$$

Розглянемо область  $D_2$ . Для  $(x, y) \in D_2$  маємо

$$u(x, y) \leq \Phi_u(x, y) + \int_{L_1 \cap G_2} \omega_1(M) u(M) d\mu_{\psi_1}. \quad (12)$$

Позначимо праву частину нерівності (12)

$$\Phi_{1u}(x, y) = \Phi_u(x, y) + \int_{L_1 \cap G_2} \omega_1(M) u(M) d\mu_{\psi_1}.$$

Враховуючи нерівність (8) та те, що функція  $\Phi_u(x, y)$  є неспадною за кожною змінною, тобто

$$\frac{\partial \Phi_u(x, y)}{\partial x} \geq 0, \quad \frac{\partial \Phi_u(x, y)}{\partial y} \geq 0,$$

$\forall M(\xi, \eta) \in L_1$  можемо записати

$$u(M) \leq \Phi_u(M) \leq \Phi_u(x, y). \quad (13)$$

З нерівностей (12) та (13) випливає

$$\Phi_{1u}(x, y) \leq \left( 1 + \int_{L_1 \cap G_2} \omega_1(M) d\mu_{\psi_1} \right) \Phi_u(x, y).$$

Тоді нерівність (12) набуде вигляду

$$u(x, y) \leq \gamma_1(x, y) \Phi_u(x, y),$$

де позначено

$$\gamma_1(x, y) = 1 + \int_{L_1 \cap G_2} \omega_1(M) d\mu_{\psi_1}.$$

Тоді

$$u(x, y) \leq$$

$$\gamma_1(x, y) \left( g_1(x) + g_2(y) + \iint_{G_2} f(s, t) h(u(s, t)) ds dt \right),$$

$$\frac{u(x, y)}{\gamma_1(x, y)} \leq g_1(x) + g_2(y) +$$

$$+ \iint_{G_2} f(s, t) h\left(\frac{u(s, t)}{\gamma_1(s, t)}\right) ds dt.$$

Скориставшись умовою 8 теорема 1, отримаємо

$$\frac{u(x, y)}{\gamma_1(x, y)} \leq g_1(x) + g_2(y) + \iint_{G_2} f_1(s, t) h\left(\frac{u(s, t)}{\gamma_1(s, t)}\right) ds dt, \quad (14)$$

де  $f_1(s, t) = f(s, t) h(\gamma_1(s, t))$ . За теоремою 1.5.2, с. 55 [1] для нерівності (14)  $\forall (x, y) \in \tilde{D}_2$  буде правильною оцінка

$$\frac{u(x, y)}{\gamma_1(x, y)} \leq \Psi^{-1} \left\{ \int_{v_0}^{g_1(x) + g_2(y_0)} \frac{ds}{h(s)} + \int_{y_0}^y \frac{g'_2(t) dt}{h(g_1(x_0) + g_2(t))} + \iint_{G_2} f_1(s, t) ds dt \right\} \quad (15)$$

або

$$\frac{u(x, y)}{\gamma_1(x, y)} \leq \Psi^{-1} \left\{ \int_{v_0}^{g_1(x_0)+g_2(y)} \frac{dt}{h(t)} + \int_{x_0}^x \frac{g'_1(s) ds}{h(g_1(s) + g_2(y_0))} + \iint_{G_2} f_1(s, t) dsdt \right\}. \quad (16)$$

Припустимо, що нерівність (5)((6)) виконується для  $(x, y) \in D_k$ . Доведемо, що вона буде правильною і для  $(x, y) \in D_{k+1}$ . Справді,

$$\begin{aligned} u(x, y) &\leq \Phi_u(x, y) + \sum_{j=1}^k \int_{L_j \cap G_{k+1}} \omega_j(M) u(M) d\mu_{\psi_j} \leq \\ &\leq \Phi_{k-1u}(x, y) + \int_{L_k \cap G_{k+1}} \omega_k(M) u(M) d\mu_{\psi_k} = \Phi_{ku}(x, y). \end{aligned} \quad (17)$$

Звідси, враховуючи властивості функції  $\Phi_{k-1u}(x, y)$ ,  $\forall M(\xi, \eta) \in L_k$  можемо записати

$$u(M) \leq \Phi_{k-1u}(M) \leq \Phi_{k-1u}(x, y). \quad (18)$$

або

$$\begin{aligned} u(x, y) &\leq \prod_{j=1}^k \gamma_j(x, y) \left( g_1(x) + g_2(y) + \iint_{G_{k+1}} f(s, t) h(u(s, t)) dsdt \right), \\ \frac{u(x, y)}{\prod_{j=1}^k \gamma_j(x, y)} &\leq \left( g_1(x) + g_2(y) + \iint_{G_{k+1}} f_k(s, t) h \left( \frac{u(s, t)}{\prod_{j=1}^k \gamma_j(s, t)} \prod_{j=1}^k \gamma_j(s, t) \right) dsdt \right) \leq \\ &\leq \left( g_1(x) + g_2(y) + \iint_{G_{k+1}} f_k(s, t) h \left( \frac{u(s, t)}{\prod_{j=1}^k \gamma_j(s, t)} \right) dsdt \right), \end{aligned} \quad (20)$$

де позначено

$$f_k(s, t) = f(s, t) h \left( \prod_{j=1}^k \lambda_j(s, t) \right). \quad (21)$$

За теоремою 1.5.2, с. 55 [1] для нерівності (20)  $\forall (x, y) \in \tilde{D}_{k+1}$  буде правильною оцінка

$$\begin{aligned} u(x, y) &\leq \prod_{j=1}^k \gamma_j(x, y) \Psi^{-1} \left\{ \int_{v_0}^{g_1(x)+g_2(y_0)} \frac{ds}{h(s)} + \right. \\ &\left. + \int_{y_0}^y \frac{g'_2(t) dt}{h(g_1(x_0) + g_2(t))} + \iint_{G_{k+1}} f_k(s, t) dsdt \right\} \end{aligned}$$

або

$$u(x, y) \leq \prod_{j=1}^k \gamma_j(x, y) \Psi^{-1} \left\{ \int_{v_0}^{g_1(x_0)+g_2(y)} \frac{dt}{h(t)} + \right.$$

З нерівностей (17) та (18) випливає

$$\begin{aligned} \Phi_{ku}(x, y) &\leq \Phi_{k-1u}(x, y) \gamma_k(x, y) \leq \\ &\leq \Phi_u(x, y) \gamma_k(x, y) \prod_{j=1}^{k-1} \gamma_j(x, y) = \Phi_u(x, y) \prod_{j=1}^k \gamma_j(x, y), \end{aligned}$$

де позначено

$$\gamma_j(x, y) = 1 + \int_{L_j \cap G_{k+1}} \omega_j(M) d\mu_{\psi_j}. \quad (19)$$

Тоді нерівність (18) набуде вигляду

$$u(x, y) \leq \Phi_u(x, y) \prod_{j=1}^k \gamma_j(x, y)$$

$$\left. + \int_{x_0}^x \frac{g'_1(s) ds}{h(g_1(s) + g_2(y_0))} + \iint_{G_{k+1}} f_k(s, t) dsdt \right\},$$

де функції  $\gamma_j(x, y)$  та  $f_k(s, t)$  визначаються за формулами (19), (21), а функція  $\Psi^{-1}$  є оберненою до функції (7). Область  $\tilde{D}_{k+1}$  визначається відповідно з таких співвідношень:

$$\tilde{D}_{k+1} = \left\{ (x, y) \in D_{k+1} : \int_{v_0}^{g_1(x)+g_2(y_0)} \frac{ds}{h(s)} + \right.$$

$$\left. + \int_{x_0}^x \frac{g'_1(s) ds}{h(g_1(s) + g_2(y_0))} + \iint_{G_{k+1}} f_k(s, t) dsdt \in Dom(\Psi^{-1}) \right\},$$

або

$$\tilde{D}_{k+1} = \left\{ (x, y) \in D_{k+1} : \int_{v_0}^{g_1(x_0)+g_2(y)} \frac{dt}{h(t)} + \int_{x_0}^x \frac{g'_1(s) ds}{h(g_1(s)+g_2(y_0))} + \iint_{G_{k+1}} f_k(s, t) ds dt \in Dom(\Psi^{-1}) \right\}.$$

Отже, отримано нерівність (5)((6)) для  $n = k + 1$ . Згідно з методом математичної індукції нерівність виконується  $\forall n \in N$ . Теорему доведено.

Для знаходження оцінки розв'язків поставленої задачі (1), (2) з імпульсним збуренням, зробимо деякі припущення. Нехай в області  $D^* \subset \mathbb{R}^2$  для неперервних функцій  $\omega_j^*(x, y)$ ,  $j = \overline{1, n}$ ,  $H^*(x, y, u(x, y))$  виконуються такі співвідношення:

$$|H^*(x, y, v(x, y))| \leq f(x, y) h(|v(x, y)|), \quad (22)$$

$$|\omega_j^*(x, y)| \leq \omega_j(x, y), \quad (23)$$

де функції  $\omega_j(x, y)$ ,  $j = \overline{1, n}$ ,  $f(x, y)$  – задовольняють умови теореми 1. Прийнемо  $u(x, y) = |v(x, y)|$  та

припустимо

$$|g_1^*(x) - g_1^*(x_0)| \leq g_1(x), \quad |g_2^*(y)| \leq g_2(y), \quad (24)$$

де функції  $g_1(x)$ ,  $g_2(y)$  задовольняють умови теореми 1. ■

**Наслідок.** Нехай в області  $D^*$  виконуються співвідношення (22)–(24) та функція  $h(|v(x, y)|)$  задовольняє умову 7 теореми 1. Тоді для розв'язків задачі (1), (2) виконуються оцінки (5)((6)).

**Теорема 2.** Нехай в області  $D^*$  виконуються умови 1–7 теореми 1 та функція  $u(x, y)$  задовольняє інтегральну нерівність

$$u(x, y) \leq g(x, y) + \iint_{G_n} H(s, t, u(s, t)) ds dt + \sum_{j=1}^{n-1} \int_{L_j \cap G_n} \omega_j(M) u(M) d\mu_{\psi_j}, \quad (25)$$

де  $g(x, y)$  додатна, неспадна функція.

Тоді для  $(x, y) \in D_i^*$ ,  $i = \overline{2, n}$ , справджується оцінка

$$u(x, y) \leq g(x, y) \prod_{j=1}^{i-1} \left( 1 + \int_{L_j \cap G_i} \omega_j(M) d\mu_{\psi_j} \right) \times \Psi^{-1} \left\{ \Psi(1) + \iint_{G_i} f(s, t) \frac{h(g(s, t))}{g(s, t)} h \left( \prod_{j=1}^{i-1} \left( 1 + \int_{L_j \cap G_i} \omega_j(M) d\mu_{\psi_j} \right) \right) ds dt \right\},$$

де функція  $\Psi^{-1}$  визначається формулою (7), а область  $D_i^*$  визначається відповідно зі співвідношення

$$D_i^* = \left\{ (x, y) \in D_i : \Psi(1) + \iint_{G_i} f(s, t) \frac{h(g(s, t))}{g(s, t)} h \left( \prod_{j=1}^{i-1} \left( 1 + \int_{L_j \cap G_i} \omega_j(M) d\mu_{\psi_j} \right) \right) ds dt \in Dom(\Psi^{-1}) \right\}.$$

□ *Доведення.* Розглянемо нерівність (25). Враховуючи властивості функцій, які входять в цю нерівність, можемо записати

$$\begin{aligned} \frac{u(x, y)}{g(x, y)} &\leq 1 + \iint_{G_n} f(s, t) h \left( \frac{u(s, t)}{g(s, t)} g(s, t) \right) ds dt + \\ &+ \sum_{j=1}^{n-1} \int_{L_j \cap G_n} \omega_j(M) \frac{u(M)}{g(M)} d\mu_{\psi_j} \leq \\ &\leq 1 + \iint_{G_n} f(s, t) \frac{h(g(s, t))}{g(s, t)} h \left( \frac{u(s, t)}{g(s, t)} \right) ds dt + \\ &+ \sum_{j=1}^{n-1} \int_{L_j \cap G_n} \omega_j(M) \frac{u(M)}{g(M)} d\mu_{\psi_j}. \end{aligned}$$

Застосовуючи до цієї нерівності схему доведення теореми 1 та теорему 1.5.1 с. 51 [1], отримаємо потрібний результат. ■

## Висновки

Характерною особливістю отриманих результатів є те, що під час знаходження оцінок для розривних функцій двох змінних були застосовані теорія міри та інтеграл Лебега-Стілтєса. Цей підхід дав змогу об'єднати в одному результаті два випадки:

1. Міра Лебега-Стілтєса  $\mu_{\psi_j}$ , яка зосереджена на кривій  $L_j$ , дискретна;
2. Міра Лебега-Стілтєса  $\mu_{\psi_j}$ , яка зосереджена на кривій  $L_j$ , абсолютно неперервна.

Отримані результати можуть бути використані для дослідження властивостей розв'язків рівнянь гіперболічного типу з імпульсним збуренням.

## Література

- [1] Мартынюк А.А., Гутовски Р. Интегральные неравенства и устойчивость движения. – К.: Наук. думка, 1979. – 249 с.
- [2] Мартынюк А.А., Лакшмикантам В., Лида С. Устойчивость движения: метод интегральных неравенств. – К.: Наук. думка, 1989. – 272 с.
- [3] Самойленко А.М., Перестюк Н.А. Дифференциальные уравнения с импульсным воздействием. – К.: Вища шк., 1987. – 287 с.
- [4] Гутовски Р. Некоторые вопросы устойчивости дифференциальных уравнений в частных производных, описывающих движение механических систем в теории колебаний // VII Int. Conf. nichtlineare Schwing. – Berlin, 1977. – В. 1. – S. 289–305.
- [5] Массалітіна Є.В. Про інтегро-сумарну нерівність Перова для функцій двох змінних // Укр. мат. журн. – 2004. – 56, №11. – С. 1569–1575.
- [6] Массалітіна Є.В. Оцінка функції, яка задовольняє задачі Гурса // Вісник Харківського університету. Серія: Математика, прикладна математика і механіка. – 2005. – №711. – С. 8–16.
- [7] Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1977. – 737 с.
- [8] Шилов Г.Е., Гуревич Б.Л. Интеграл, мера и производная. – М.: Наука, 1967. – 220 с.

## ИНТЕГРАЛЬНЫЕ НЕРАВЕНСТВА В ТЕОРИИ УРАВНЕНИЙ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО ТИПА С ИМПУЛЬСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ

Массалитина Е. В.<sup>a</sup>, Кильчинский О. О.<sup>b</sup>

<sup>a</sup> *Національний технічний університет України “КПІ”,  
проспект Перемоги 37, 03056, Київ, Україна*

<sup>b</sup> *Государственный экономико-технологический университет транспорта,  
ул. Лукашевича 19, 03049, Киев, Украина*

Найдена интегральная оценка для функции двух переменных, удовлетворяющей уравнению гиперболического типа и получающей импульсные воздействия как дискретного, так и непрерывного характера на заданных кривых.

**Ключевые слова:** интегральные неравенства, уравнения гиперболического типа, импульсные воздействия.

2000 MSC: 34A37, 35L70, 58J45

УДК: 517.9

## INTEGRAL INEQUALITIES IN THE THEORY OF EQUATION OF HYPERBOLIC TYPE WITH IMPULSE PERTURBATION

Massalitina E.V.<sup>a</sup>, Kilchinskiy O. O.<sup>b</sup>

<sup>a</sup> *National Technical University of Ukraine “KPI”  
1Prospect Peremogy 37, 03056, Kyiv, Ukraine*

<sup>b</sup> *State Economy and Technology University of Transport  
str. Lukashevich 19, 03049, Kyiv, Ukraine*

Integral estimation for function of two variables which satisfies the equation of hyperbolic type and receives impulse perturbations both discrete and continuous character on given curves is founded.

**Key words:** integral inequalities, hyperbolic equation, impulse perturbation.

2000 MSC: 34A37, 35L70, 58J45

УДК: 517.9