

Тестовые вопросы для самоконтроля

- 1. Высказывание, которое правильно отражает место некомпактной кардиомиопатии левого желудочка (НКЛЖ) в современной классификации:**
 - а) НКЛЖ – разновидность дилатационной кардиомиопатии;
 - б) НКЛЖ относится к неклассифицируемым кардиомиопатиям;
 - в) НКЛЖ – особая форма миокардита.
- 2. Для постановки диагноза НКЛЖ необходимы следующие критерии:**
 - а) триада клинических признаков – застойная сердечная недостаточность, тромбоэмболия, нарушения ритма;
 - б) признаки некомпактности миокарда ЛЖ по данным эхокардиоскопии;
 - в) все перечисленное.
- 3. Какое высказывание верно:**
 - а) межтрабекулярные пространства при НКЛЖ сообщаются с полостью ЛЖ;
 - б) межтрабекулярные пространства сообщаются с миокардиальными сосудами;
 - в) межтрабекулярные пространства – замкнутые полости, не сообщающиеся с полостью ЛЖ или его сосудами.
- 4. Какое соотношение максимальной толщины некомпактного эндокардиального слоя и компактного миокарда в конце систолы является диагностическим критерием НКЛЖ:**
 - а) больше 3;
 - б) больше 2;
 - в) меньше 1,5.
- 5. Какие признаки имеют негативное прогностическое значение при НКЛЖ:**
 - а) ширина комплекса QRS < 0,12 сек;
 - б) III–IV функциональный класс сердечной недостаточности;
 - в) постоянная форма фибрилляции предсердий, блокада ножки пучка Гиса.
- 6. Наиболее частое нарушение ритма у больных НКЛЖ:**
 - а) фибрилляция предсердий;
 - б) синдром WPW;
 - в) желудочковая тахикардия.
- 7. Для предупреждения тромбоэмболических осложнений при НКЛЖ показано назначение:**
 - а) варфарина;
 - б) ацетилсалициловой кислоты;
 - в) комбинации ацетилсалициловая кислота + клопидогрель.
- 8. В качестве антиаритмических препаратов при НКЛЖ применяются:**
 - а) пропafenон, этацинин;
 - б) дизопирамид, флекаинид;
 - в) амиодарон, блокаторы β -адренорецепторов.
- 9. У больного с НКЛЖ имеется застойная сердечная недостаточность, фракция выброса ЛЖ – 17%, ритм синусовый, ширина комплекса QRS – 0,14. Какие изменения в лечении показаны в этом случае:**
 - а) отмена блокаторов β -адренорецепторов;
 - б) ресинхронизирующая электрокардиостимуляция;
 - в) назначение дигоксина.
- 10. Степень некомпактности миокарда расценивается как тяжелая, если соотношение слоя «плотного» истинного миокарда к толщине всей стенки сердца на уровне верхушки ЛЖ достигает:**
 - а) 0,33–0,26;
 - б) 0,25–0,2;
 - в) меньше 0,2.