

## Тестовые вопросы для самоконтроля

1. При неспецифическом аортоартериите (НАА) может поражаться:
  - а) только аорта;
  - б) только аорта и ее ветви;
  - в) аорта, ее ветви и иногда легочная артерия.
2. НАА чаще встречается:
  - а) у женщин;
  - б) у мужчин;
  - в) у лиц пожилого возраста.
3. НАА чаще встречается:
  - а) у жителей Европы;
  - б) у жителей Азии;
  - в) у жителей Северной Америки.
4. НАА:
  - а) заболевание полиэтиологичное;
  - б) возбудитель – бацилла Коха;
  - в) наследственная предрасположенность.
5. В патогенезе НАА ведущая роль принадлежит:
  - а) аутоиммунным нарушениям;
  - б) наследственности;
  - в) прогрессированию атеросклероза.
6. Коллатерали при НАА функционируют:
  - а) плохо;
  - б) окклюзированы;
  - в) хорошо.
7. Какое утверждение является верным:
  - а) тяжесть поражения сосудов всегда меньше, чем клинические проявления;
  - б) тяжесть поражения сосудов всегда больше, чем клинические проявления;
  - в) тяжесть поражения сосудов сопоставима с клиническими проявлениями.
8. Локализации стенозирующего процесса в аорте, при которой развивается артериальная гипертензия:
  - а) инфраренальная;
  - б) любая локализация;
  - в) любая локализация, кроме инфраренальной.
9. Наиболее часто в воспалительный процесс вовлекаются:
  - а) дуга аорты и ее ветви;
  - б) проксимальные отделы коронарных артерий;
  - в) проксимальные отделы брыжеечных артерий.
10. «Золотым стандартом» диагностики НАА является:
  - а) компьютерная томография;
  - б) магнитно-резонансная томография;
  - в) ангиография.
11. Консервативное лечение НАА:
  - а) глюкокортикоиды и цитостатики;
  - б) антибиотики;
  - в) блокаторы  $\beta$ -адренорецепторов.
12. Показания к операции:
  - а) острое воспаление;
  - б) почечная недостаточность;
  - в) стойкая вазоренальная гипертензия.