

Суанопрокаріота прибережних солонців Куяльницького лиману

ОКСАНА МИКОЛАЇВНА ВІНОГРАДОВА

VYNOGRADOVA O.M. (2016). **Cyanoprokaryota of the coastal solonets of the Kualnik Estuary.** Chornomors'k. bot. z., **12** (1): 85-94. doi:10.14255/2308-9628/16.121/9.

At the parched areas of the Kuyalnik Estuary, in alkaline soils covered by communities of true saline vegetation and brackish forb meadows, 42 species of Cyanoprokaryota were revealed by cultures. They belong to 19 genera, 10 families and 4 orders from subclasses *Synechococcophycidae* (41,5 %), *Oscillatoriophycidae* (34,1 %) and *Nostochophycidae* (24,4 %). Characteristic features of the studied habitat are the constant presence and quantitative predominance of cyanoprokaryota in the samples comparing to diatoms and chlorophytes, high number of species per sample, a considerable variety of heterocytous taxa and abundant development of representatives of Nostocales in soil cultures. Ecologically, most of the species are aquatic-subaerophytes known as halophytes (11,9 %), halobionts (40,1 %) and halotolerants (47,6 %). Sites with different plant associations differed in species composition and taxonomic structure of *Cyanoprokaryota*, which may be associated with varying soil moisture. Identified species analyzed in terms of current views on their taxonomy. New records for Ukraine are *Pseudocapsa maritima* Komárek, *Leptolyngbya norvegica* (Gomont) Anagn. et Komárek, *Phormidium litorale* Golubić, *Ph. viride* (Vaucher ex Gomont) Lemmermann, *Porphyrosiphon fuscus* Gomont ex Frémy, *Nodularia crassa* (Voronichin) Komárek, Hübel et M. Hübel. The checklist of Cyanoprokaryota of the Kuyalnik estuary based on the original and literature data is given.

Keywords: *Cyanoprokaryota*, *cyanobacteria*, *hypersaline environments*, *species diversity*, *ecology*, *Kuyalnik estuary*

ВІНОГРАДОВА О.М. (2016). **Суанопрокаріота прибережних солонців Куяльницького лиману.** Чорноморськ. бот. ж., **12** (1): 85-94. doi:10.14255/2308-9628/16.121/9.

На пересохлих ділянках Куяльницького лиману, у солонцевому ґрунті, вкритому рослинними асоціаціями справжньосолончакової рослинності та різнотравних засолених лук, методом культур виявлено 42 види Cyanoprokaryota з 19 родів, 10 родин та чотирьох порядків підкласів *Synechococcophycidae* (41,5 %), *Oscillatoriophycidae* (34,1 %) та *Nostochophycidae* (24,4 %). Характерними рисами місцезростання були постійна присутність та кількісне переважання ціанопрокаріот у досліджених зразках (порівняно із діатомовими та зеленими водоростями), висока насыченність проб видами, значне різноманіття гетероцитних форм та яскінний розвиток у ґрунтових культурах представників порядку Nostocales. За екологічним профілем, переважають аквально-субаерофітні форми, що відбиває екотонний характер досліджених ділянок. За ставленням до умов солоності, виявлені види належать до галофілів (11,9 %), галобіонтів (40,1 %) та галотолерантів (47,6 %). Ділянки із рослинністю різного типу дещо відрізняються за видовим та таксономічним складом Cyanoprokaryota, що пов'язано із різницею у ступені зволоженості ділянок. Виявлені види проаналізовано з точки зору сучасних поглядів на їх таксономічне положення. Зроблено ряд цікавих флористичних знахідок – вперше для України вказуються *Pseudocapsa maritima* Komárek, *Leptolyngbya norvegica* (Gomont) Anagn. et Komárek, *Phormidium litorale* Golubić, *Ph. viride* (Vaucher ex Gomont) Lemmermann, *Porphyrosiphon fuscus* Gomont ex Frémy, *Nodularia crassa* (Voronichin) Komárek, Hübel et M. Hübel. Складено перевірений список ціанопрокаріот Куяльницького лиману за оригінальними та літературними даними.

Ключові слова: *Суанопрокаріота*, *синьозелені водорости*, *солонці*, *видове різноманіття*, *нові таксони*, *екологія*, *Куяльницький лиман*

Виноградова О.Н. (2016). *Суапорокагута прибрежних солонців Куюльницького лиману*. Черноморск. бот. ж., 12 (1): 85–94. doi:10.14255/2308-9628/16.121/9.

На пересохших участках Куюльницького лимана, в солонцової почві под истинносолончаковою растительностю і разнотравними солончаковими лугами, методом культур виявлено 42 вида Суапорокагута из 19 родів, 10 семейств і чотирех порядков підкласів *Synechococcophycidae* (41,5 %), *Oscillatoriophycidae* (34,1 %) і *Nostochophycidae* (24,4 %). Характерні черти изученого місцебитання – постійне присутнє і кількісне преобладання ціанопрокаріот в ісследованих образцах, висока насыщеність проб видами, значительне разнообразие гетероцитних форм і обильне розвиття в почвенних культурах представителів порядку Nostocales. По екологічному складу, преобладають аквально-субаерофітні форми, що відображає екотонний характер ісследованих участків. По відношенню до засоленості місцебитання, виявлені види відомі як галофіти (11,9 %), галобіонти (40,1 %) і галотолеранти (47,6 %). Участки з різними растительними асоціаціями нещодавно відрізнялися за видовим і систематичним складом Суапорокагута, що може бути пов'язано з різною вологістю ґрунтів. Виявлені види проаналізовані з точки зору сучасного взгляду на їх таксономічне положення. Обнаружено нові для України види: *Pseudocapsa maritima* Komárek, *Leptolyngbya norvegica* (Gomont) Anagn. et Komárek, *Phormidium litorale* Golubić, *Ph. viride* (Vaucher ex Gomont) Lemmermann, *Porphyrosiphon fuscus* Gomont ex Frémy, *Nodularia crassa* (Voronichin) Komárek, Hübel et M. Hübel. Составлен обобщений чек-лист ціанопрокаріот Куюльницького лимана по оригінальним і літературним джерелам.

Ключові слова: Суапорокагута, синезелені водорослі, солонці, видове разнообразие, нові таксони, екологія, Куюльницький лиман

Засолені місцезростання, прикладом яких є причорноморські лимани, можуть бути важливим джерелом відомостей про різноманіття водоростей. Особливо перспективними вони є стосовно поповнення списку ціанопрокаріот України, адже відомо [OREN, 2000; VINOGRADOVA, 2013], що в засолених екосистемах основою видового багатства є прокаріотичні оксіфототрофи, клітини яких забезпечені морфофізіологічними механізмами адаптації до екстремальних умов існування.

У посушливих умовах півдня України в лиманних екосистемах лімітуючими факторами є не лише високі концентрації солей у воді і ґрунті, але і різкі сезонні та навіть добові коливання основних фізико-хімічних параметрів. За відношенням короткі проміжки часу показники солоності та температура води можуть суттєво змінюватись; зменшення глибини та площа водного дзеркала призводить до осушення мілководь, оголення дна та затакирювання його поверхні тощо. Ґрунтову альгофлору таких місцезростань формують види, здатні витримувати комплексну дію стрес-факторів.

Куюльницький лиман, розташований на Чорноморському узбережжі в Одеській області, являє собою гіпергалінну водойму із обмеженим водообміном, нестабільним гідрологічним режимом та широким діапазоном коливань солоності води: від 49,9 ‰ до 399 ‰ [ENNAN, SHYKHALEEV, SHYKHALEEEVA, ADOBOVSKIY, KIRIUSHKINA, 2014]. Морфометрично це солоне озеро подовженої форми, що утворилося в результаті затоплення гирлової ділянки річки Великий Куюльник морською водою. Кліматичні умови регіону сприяють значним коливанням рівня води в лимані: його площа, що складає 61 км², в посушливі роки зменшується майже вдвічі, на пересохлих ділянках лиману розвиваються угруповання справжньосолончакової рослинності та засолених лук. Мікрокові та сезонні коливання площи водного дзеркала та солоності води мають циклічний характер [KOLESNIKOVA, NOSYREV, SHMURATKO, 1997]; в той же час, в останні десятиліття спостерігається стійка тенденція зростання солоності та зниження рівня води в лимані [ENNAN, SHYKHALEEV, SHYKHALEEEVA, ADOBOVSKIY, KIRIUSHKINA, 2014].

Відомості про альгофлору Куюльницького лиману не можна вважати вичерпними, хоча інтерес до її вивчення виник досить давно [РОНРЕБНІАК, 1949]. В

роботі В.П. Герасимюка із співавторами (2011) проаналізовано існуючі публікації на цю тему та представлені результати тривалих (2001–2008) спостережень над фітобентосу лиману із особливою увагою до ділянок, де відбувається скидання стічних вод курорту «Куюльник» та водотоків антропогенного походження [GERASIMIUK, ENNAN SHYKHALEEEVA, 2011]. Автори виявили 87 видів водоростей із трьох відділів (Bacillariophyta, Cyanophyta, Chlorophyta), частка діатомових складала близько 70 %, синьозелені були представлені 18 видами, займаючи друге місце. Стосовно водоростей позаводних місцезростань Куюльника відомостей майже немає, лише в монографії Л.П. Приходькової «Синезеленые водоросли почв степной зоны Украины» (1992) наведено вісім видів, знайдених на вологому березі цього лиману.

Метою нашої роботи було вивчення видового складу та особливостей поширення синьозелених водоростей у ґрунті пересохлих ділянок Куюльницького лиману.

Матеріали та методи дослідження

Матеріал для нашого дослідження, а саме об'єднані ґрутові зразки, були відібрані д.б.н., проф. Д.В. Дубиною у вересні 2007 г. Обстежені пересохлі ділянки лиману розташовані поблизу села Стара Кубанка ($46^{\circ}37'7''N$ $30^{\circ}43'35''E$) в Комінтернівському р-ні Одеській обл. Ґрутовий покрив тут утворений солонцем із засоленням сульфатного типу ($CaSO_4$, $MgSO_4$). На відміну від солончаків, солі в солонцях знаходяться не на поверхні, а на деякій глибині, присутні в ньому колоїди легко пептизуються і, розчиняючись у воді, закупорюють пори. В результаті при зволоженні ґрунт сильно набухає, а в сухому стані стає дуже твердим і щільним [NAZARENKO, POL'CHYNA, NIKORYCH, 2004], що робить його подібним до такиру.

Зразки відбирали із поверхневого шару ґрунту в 10 точках кожної асоціації, потім об'єднували в один збірний зразок. Всього було обстежено 14 рослинних асоціацій, що належать до класів справжньосолончакової рослинності (формації *Salicornietà* і *Artemisieta santhoniae*) та різnotравних солончакових лук із домінуванням айстри солончакової (*Tripolietum vulgaris*). Всі обстежені ділянки були вкриті рясною рослинністю: їх проективне покриття майже скрізь складало 100 % і лише на одній ділянці воно було 80 %. Відбір та культивування ґрутових зразків проводили за методикою, описаною в наших попередніх публікаціях [VINOGRADOVA, DARIENKO, 2008]. Дослідження культур тривало чотири місяці від появи перших ознак росту водоростей, використовувався світловий мікроскоп МБИ-3 (ЛОМО) з імерсійним об'єктивом. Ідентифікацію здійснювали із застосуванням низки видань: KONDRATYEVA, 1968; KOVALENKO, 2009; KOMÁREK, ANAGNOSIDIS, 1998; 2005; KOMÁREK, 2013. У роботі прийнята система *Cyanoprokaryota* I. Комарека із співавторами [KOMÁREK et al., 2014].

Результати дослідження та їх обговорення

В переважній більшості випадків обстежені ділянки прибережних солонців Куюльницького лиману були позбавлені ознак присутності водоростей; лише в деяких місцях поверхня ґрунту була вкрита порошистим або повстистим нальотом жовтуватого, зеленкуватого та чорного кольорів, проте синьозелені водорости в їх формуванні участі не брали. Натомість в культурах із усіх вивчених зразків ґрунту зафіксована наявність *Cyanoprokaryota*, представники зелених водоростей відмічені на 10 з 14 ділянок, в ґрунті шести ділянок спостерігались мертві стулки діатомових водоростей і лише в культурах з одного зразку (засолена лука) вегетували живі діатомей.

Всього в культурах було виявлено 42 види *Cyanoprokaryota* з 19 родів, 10 родин та чотирьох порядків, які належать до трьох підкласів: *Synechococcophycidae* (41,5 %), *Oscillatoriophycidae* (34,1 %) та *Nostochophycidae* (24,4 %). Підклас *Synechococcophycidae* переважав не тільки за видовим, але і таксономічним

різноманіттям: його представники належать до двох порядків, 4 родин та 8 родів. Серед порядків найвищою була частка *Synechococcales* (38,0 %), а найменшою – *Chroococcales*, що виявився представленим у дослідженіх місцезростаннях лише одним видом (табл.1). Родини *Oscillatoriaceae* (23,8 %), *Leptolyngbyaceae* (16,7 %) та *Merismopediaceae* (14,3 %) в сумі охоплюють більше половини виявленіх видів. Родовий спектр утворюють 19 родів синьозелених водоростей, їх різноманіття в дослідженіх екотопах різко поляризоване: при середній кількості видів у роді 2,1 десять родів, або 52,6 % від числа знайдених представлених лише одним видом, натомість роди *Phormidium* (8 видів, 19,0 %) та *Leptolyngbya* (6, або 14,3 %) перевищують середній показник відповідно в 4 та 3 рази.

Частота трапляння більшості знайдених видів синьозелених була досить невисокою, кожен п'ятий (21,1 %) був відмічений лише раз. Натомість *Phormidium takyricum* (71,4 %), *Nostoc linckia* ($F=64,3$), *Leptolyngbya fragilis* та *Nodularia sphaerocarpa* (для кожного $F=57,1$ %) мали досить високу частоту трапляння в дослідженіх місцезростаннях. *Aphanocapsa salina* та *Trichormus variabilis* зафіковані у половині вивчених зразків.

Ділянки із рослинністю різного типу дещо відрізнялись за видовим та таксономічним складом Суанопрокаруто. В зразках ґрунту під справжньосолончаковою сукулентно-травянистою рослинністю формації *Salicornieteta* синьозелені водорости зустрічались разом із одноклітинними зеленими та діatomовими водоростями, у культурах із двох збірних ґрутових зразків відмічено нитки цікового роду *Dilabifilum* (Ulvales, Chlorophyta). Середня кількість видів ціанопрокаріот у пробі складала для цього місцезростання 7,6 видів, а ідентифіковано їх 30 з 14 родів та 9 родин. Більше третини видів досягали в культурах значного кількісного розвитку; *Nodularia sphaerocarpa*, *N. sputigena*, *Nostoc linckia* та *Trichormus variabilis*, що ряснно розвивалися у культурах, мали також найвищі показники трапляння у ґрунті під травянистою рослинністю. Ціковою особливістю цього місцезростання було різноманіття видів роду *Nodularia*, причому якщо *Nodularia sphaerocarpa* входила до домінуючого комплексу солонців під усіма трьома вивченими рослинними формаціями, то *Nodularia crassa* та *N. sputigena* були знайдені лише на ділянках *Salicornieteta*.

На ділянках справжньосолончакової напівчагарникової рослинності формації *Artemisieta santhoniae* рослини утворюють щільний покрив, на поверхні ґрунту де-неде спостерігалось його позеленіння. В культурах, крім ряснно вегетуючих ціанопрокаріот, постійно траплялись одноклітинні зелені водорости і мертві стулки діatomових, в одному зразку також відмічені нитки *Dilabifilum*. Видове багатство проб тут виявилось найвищим серед трьох варіантів місцезростань, дослідженіх нами на Куяльницькому лимані – 11,3 види. Методом культур виявлено 26 видів з 14 родів і 9 родин Суанопрокаруто. Найчастіше в зразках із полінових солонців траплялись *Phormidium takyricum* та *Leptolyngbya fragilis* (в обох випадках $F=100,0$ %), *Pseudophormidium hollerbachianum*, *Coleofasciculus chthonoplastes*, *Nodularia sphaerocarpa* та *Nostoc linckia* (в усіх випадках $F=75,0$ %). Останні три види також досягали значного кількісного розвитку у культурах поряд із *Leptolyngbya norvegica* та *Trichormus variabilis*.

В ґрунті під солончаковими луками формації айстри солончакової альгофлору також формували представники Суанопрокаруто, одноклітинні зелені та діatomові водорості. Суанопрокаруто переважали за видовим багатством та рясністю розвитку в культурах. Середня кількість видів синьозелених у пробі дорівнювала 10,7 вида; всього тут знайдено 21 вид з 13 родів. Їх таксономічний склад помітно відрізняється від зафікованого для ділянок справжньосолончакової рослинності (табл. 1): частка ностокальних (33,3 %) є найвищою серед трьох дослідженіх типів екотопів, тільки тут

знайдені представники родини Chroococcaceae, родів *Pseudocapsa*, *Kamptonetia*, *Cylindrospermum*. Найпоширенішим видом у ґрунті солончакових лук виявився *Phormidium takyricum* ($F=100,0\%$), *Leptolyngbya. saxicola*, *Lyngbya martensiana*, *Nodularia sphaerocarpa*, *Nostoc linckia*, *Trichormus variabilis*, що мали частоту трапляння 66,7 %, активно вегетували в культурах, утворюючи макроскорічні розростання. Лише в ґрунті засолених лук було знайдено *Pseudocapsa maritima*, *Kamptonetia animale*, *Leptolyngbya saxicola*, *Lyngbya martensiana*, *Cylindrospermum michailovskoense*.

Таблиця 1

Cyanoprokaryota Куяльницького лиману

(джерела: 1-2 – оригінальні дані: 1 – ділянки справжньо-солончакової рослинності; 2 – ділянки засолених лук; 3 – за PRIKHODKOVA, 1992; за Gerasimuk, ENNAN, SHYKHALEEEVA, 2011)

Table 1

Cyanoprokaryota of the Kuyalnik Estuary

(1-2 – original data: 1 – sites of true saline vegetation; 2 – sites of brackish forb meadows; 3 – after PRIKHODKOVA, 1992; after Gerasimuk, ENNAN, SHYKHALEEEVA, 2011)

Таксон	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5
<i>SYNECHOCOCCOPHYCIDAE</i>					
<i>Synechococcales</i>					
<i>Synechococcaceae</i>					
' <i>Anathece clathrata</i> (W. West et G.S. West) Komárek, Kastovsky et Jezberová http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=X3d13670f49df1d9b	+	-	-	-	-
<i>Cyanobiumgaarderi</i> (Ålvik) Komárek et al.	+	-	-	-	-
<i>Synechococcus salinarum</i> Komárek	+	-	-	-	-
<i>Merismopediaceae</i>					
<i>Synechocystis minuscula</i> Woron.	+	-	-	-	-
<i>Synechocystis salina</i> Wislouch	+	+	-	-	-
<i>Aphanocapsa litoralis</i> (Hansg.) Komarek et Anagn.	+	+	-	-	-
<i>Aphanocapsa muscicola</i> (Menegh.) Wille	+	-	-	-	-
<i>Aphanocapsa parasitica</i> (Kütz.) Komarek et Anagn.	+	-	-	-	-
<i>Aphanocapsa salina</i> Woron.	+	+	-	-	-
<i>Leptolyngbyaceae</i>					
<i>Jaaginema kisselevii</i> (Anissimova) Anagn. et Komárek	-	-	-	-	+
<i>Jaaginema neglectum</i> (Lemmermann) Anagn. et Komárek	+	+	-	-	-
<i>Jaaginema quadripunctatum</i> (Bruhl et Biswas) Anagn. et Komárek	-	-	-	-	+
<i>Leptolyngbya foveolata</i> (Rabenh. ex Gomont) Anagn. et Komárek	+	+	-	-	-
<i>Leptolyngbya fragilis</i> (Gomont) Anagn. et Komárek	+	+	-	-	-
<i>Leptolyngbya halophila</i> (Hansgirg ex Gomont) Anagn. et Komárek	+	-	-	-	-
<i>Leptolyngbya norvegica</i> (Gomont) Anagn. et Komárek	+	+	-	-	-
<i>Leptolyngbya saxicola</i> (Gardner) Anagn.	+	+	-	-	-
<i>Leptolyngbya tenuis</i> (Gomont) Anagn. et Komárek	+	-	-	-	-
<i>'Spirulinales</i>					
<i>'Spirulinaceae</i>					
<i>Spirulina major</i> Kütz. ex Gomont	-	-	-	-	+
<i>Spirulina meneghiniana</i> Zanardini ex Gomont	-	-	-	-	+
<i>Chroococcales</i>					
<i>Aphanothecaceae</i>					
<i>Aphanothece salina</i> Elenkin et A.N. Danilov	-	-	+	-	-
<i>Aphanothece utahensis</i> Tilden	-	-	-	-	+
<i>Chroococcaceae</i>					
<i>Pseudocapsa maritima</i> Komárek	-	+	-	-	-
<i>Gomphosphaeriaceae</i>					
<i>Gomphosphaeria multiplex</i> (Nygaard) Komárek	-	-	+	-	-
<i>OSCILLATORIOPHYCIDAE</i>					

Продовження табл. I

1	2	3	4	5
Oscillatoriales				
'Coleofasciculaceae'				
<i>Coleofasciculus chthonoplastes</i> ¹ (Gomont) M. Siegesmund, J.R.Johansen et T. Friedl	+	-	-	-
<i>Geitlerinema amphibium</i> (Agardh ex Gomont) Anagn.	-	-	-	+
'Microcoleaceae'				
<i>Johanseninema</i> ¹ <i>constrictum</i> (Szafer) Hasler, Dvorák et Poulicková	-	-	-	+
<i>Kamptonetema animale</i> Strunecký, Komárek et Šmarda	-	+	-	-
<i>Microcoleus amoenus</i> ¹ (Gomont) Strunecký, Komárek et J.R.Johansen	-	-	-	+
<i>Porphyrosiphon fuscus</i> * Gomont ex Frémy	+	+	-	-
<i>Pseudophormidium hollerbachianum</i> (Elenkin) Anagn.	+	-	-	-
Oscillatoriaceae				
<i>Lyngbya confervoides</i> C. Agardh ex Gomont	-	-	-	+
<i>Lyngbya mартensiana</i> Meneghini ex Gomont	-	+	-	-
<i>Lyngbya lutea</i> Gomont ex Gomont	+	-	-	+
<i>Oscillatoria komarovii</i> Anissimova et Elenkin	-	-	-	+
<i>Oscillatoria limosa</i> Agardh	-	-	-	+
<i>Oscillatoria margaritifera</i> Kütz. ex Gomont		-	-	+
<i>Phormidium boryanum</i> (Bory ex Gomont) Anagn. et Komárek	+	-	-	-
<i>Phormidium breve</i> (Kütz. ex Gomont) Anagn. et Komárek	+	+	-	+
<i>Phormidium corium</i> Gomont	+	-	-	-
<i>Phormidium henningsii</i> Lemmerm.	+	-	-	-
<i>Phormidium litorale</i> * Golubić	+	-	-	-
<i>Phormidium nigroviride</i> (Thw. ex Gomont) Anagn. et Komárek	-	-	-	+
<i>Phormidium thwaitesii</i> ¹ I.Umezaki et M.Watanabe	+	-	-	-
<i>Phormidium takyricum</i> (Novichk.) O.M. Vynogr.	+	+	-	-
<i>Phormidium viride</i> * (Vaucher ex Gomont) Lemmermann	+	-	-	-
NOSTOCOPHYCIDAЕ				
Nostocales				
Rivulariaceae				
<i>Calothrix brevissima</i> G.S. West	-	-	+	-
<i>Calothrix contarenii</i> [Zanardini] Bornet et Flahault	+	-	-	-
<i>Calothrix fusca</i> Bornet et Flahault	-	-	+	+
<i>Calothrix parietina</i> (Nägeli) Thur.	+	+	-	-
<i>Calothrix scopolorum</i> Agardh ex Bornet et Flahault	+	+	-	-
'Aphanizomenonaceae'				
<i>Nodularia crassa</i> * (Voronichin) Komárek, Hübel et M. Hübel	+	-	-	-
<i>Nodularia harveyana</i> Thuret ex Bornet et Flahault	-	-	+	-
<i>Nodularia sphaerocarpa</i> Born. et Flah.	+	+	-	-
<i>Nodularia spumigena</i> Mertens ex Bornet et Flahault	+	-	-	-
Nostocaceae				
<i>Anabaena cylindrica</i> Lemmerm.	-	-	+	-
<i>Cylindrospermum michailovskoense</i> Elenkin	-	+	-	-
<i>Nostoc linckia</i> (Roth) Bornet ex Bornet et Flahault f. <i>terrestris</i> Elenkin	+	+	-	-
<i>Nostoc punctiforme</i> (Kützing) Hariot	+	-	-	-
<i>Nostoc sphaeroides</i> Kütz. ex Bornet et Flahault	-	-	-	+
<i>Trichormus propinquus</i> (Setchell et Gardner) Komárek et Anagn.	+	+	-	-
<i>Trichormus variabilis</i> (Kützing ex Bornet et Flahault) Komárek et Anagn.	+	+	+	-

Примітка: * – нові для України види; ¹ – нові таксони для української флориNote: * – species first cited for Ukraine; ¹ – taxonomical novelties

Порівняння видового складу Суапорокаріота солонця під трьома різними рослинними формациями за допомогою коефіцієнта Жаккара підтвердило значну подібність за цим показником ділянок справжньосолончакової рослинності ($K_j = 51,4\%$), засолені луки мали більше відмінностей на рівні видового складу: $K_{j(1,3)} =$

40,0 %; $K_{j(2,3)} = 40,0 \%$, що, на нашу думку, пов'язано із різницею у ступені зволоженості ділянок.

Склад Суанопрокаріота, виявлений у ґрунті прибережних солонців Куюльницького лиману, за систематичним складом та екологічною структурою в загальних рисах співпадає із відомим для інших гіпергалінних екосистем України [VINOGRADOVA, 2012]. За екологічною характеристикою, переважають аквально-субаeroфітні форми (76,2 %), тобто види із високою екологічною валентністю; це відбиває екотонний характер досліджених ділянок. Щодо ставлення до солоності оточуючого середовища, то всі виявлені нами види відомі своєю здатністю існувати в умовах її підвищених значень: 47,6 % є галотолерантами, 40,1 % – галобіонти та 11,9 % – галофіли.

Цікаво також порівняти отримані дані В.П. Герасимюка із співавт. (2011) щодо фітобентосу Куюльницького лиману. Авторами були виявлені представники діатомових, синьозелених та зелених водоростей із суттєвим переважанням Bacillariophyta (68,8 % видів). Синьозелені були на другому місці за видовим різноманіттям. Їх систематична структура відрізняється від встановленої нами для солонців суттєво меншою часткою видів порядку Synechococcales (11,8 % проти 38,8 %) та зростанням ролі Oscillatoriales (56,3 %), і, особливо, родини Oscillatoriaceae (43,8 %). У ґрунті їх частки були відповідно 33,3 % та 23,8 %. Переважна більшість видів, що наводяться для бентосу, широко поширені у водоймах різного типу. Спільними для фітобентосу та солонців були лише два види – *Lyngbya lutea* та *Phormidium breve*.

Проведене дослідження дозволило зробити ряд цікавих флористичних знахідок. Шість видів із солонців Куюльницького лиману вперше наводяться для території України. Серед них *Nodularia crassa* (Voronichin) Komárek, Hübel et M. Hübel – рідкісний галофільний вид, відомий із солоних озер у південно-західному Сибіру та гіпергалінного озера Гнатук в Австралії. *Nodularia sputigena* var. *crassa* була описана М.М. Вороніхіним із солоних озер Кулундінського степу. І. Комарек із співавторами [KOMÁREK et al., 1993] провели таксономічну ревізію роду *Nodularia* та надали цій формі статус виду. Автори розділили види роду *Nodularia* за екологічними групами: групу планктонних видів, здатних утворювати газові вакуолі та групу бентосних. *Nodularia crassa* віднесена до групи планктонних видів. Новими для української флори також виявились види морської літоралі *Pseudocapsa maritima* Komárek, *Leptolyngbya norvegica* (Gomont) Anagn. et Komárek та *Phormidium litorale* Golubić. Всі вони були описані із різних приморських регіонів Європи, а пізніше підтвердженні знахідками з інших морських локалітетів. Також було виявлено цікавий терестріальний вид *Porphyrosiphon fuscus*. Описаний із В'єтнаму, пізніше був знайдений на скелях у Каліфорнії, як домінант у біологічних кірках у пустелі Соноран в Аризоні, США [CAMERON, 1960] та Південній Сахарі [ISSA, STAL, DÉFARGE, COUTÉ, TRICHET, 2001]; повідомляли також про його знахідку у прибережних засолених ґрунтах в басейні річки Ербо в Іспанії [KOMÁREK, ANAGNOSTIDIS, 2005].

Деякі із виявленіх видів, що вже були відомі в Україні, завдяки поступу у використанні молекулярних методів та номенклатурним передбудовам останніх років тепер належать до нових для нашої флори родів. Так, за результатами секвенування 16S рДНК, а також вивчення ультраструктур, екологічних особливостей та морфологічної мінливості ряду представників роду *Aphanathece* Nägeli (пор. *Chroococcales*) частина видів була виділена у новий рід *Anathece* (W. West et G.S. West) Komárek, Kastovsky et Jezberová, що філогенетично найближчий до роду *Cyanobium* (пор. *Synechococcales*). Типовий вид нового роду – *Anathece clathrata* (W. West et G.S. West) Komárek, Kastovsky et Jezberová – ми виявили на ділянках справжньосолончакової рослинності. Хоча у Algaebase він характеризується як прісноводний, досить часто його знаходять і в умовах підвищеної солоності. В Україні це прибережні ділянки та солончаки на

узбережжі Азовського моря [BORYSIUK, 2002; SOLONENKO YAROVOI, PODOROZHNYI, RAZNOPOLOV, 2006], а також Слепне з групи Слов'янських мінералізованих озер [LIALIU, KLIUIK, 2011]. Вірогідно, цей вид є галотолерантом.

Характерний матоутворюючий вид гіпергалінних екосистем *Microcoleus chthonoplastes* в сучасному розумінні є типовим (і поки що єдиним) видом роду *Coleofasciculus* Siegesmund, J.R. Johans. et Friedl, описаного за результатами філогенетичного аналізу 16S р-ДНК представників роду *Microcoleus* [SIEGESMUND et al., 2008]. В описі цього роду вказані не тільки морфологічні та ультраструктурні ознаки, але і особливості геному. Підкреслюється, що рід еугалобний, бентичний та не містить жодних інших представників роду *Microcoleus* [SIEGESMUND et al., 2008]. Пізніше [КОМАРЕК et al., 2014] на базі цього роду було створено родину *Coleofasciculaceae*, до якої віднесли рід *Geitlerinema* (Anagn. et Kom.) Anagn. із *Pseudanabaenaceae*, а також низку новоописаних родів (*Anagnostidinema*, *Desertifilum*, *Kastovskya* та ін.). *Geitlerinema amphibium* знайдена у бентосі Куяльницького лиману [GERASIMIUK, ENNAN, SHYKHALEEVA, 2011].

Також новим для української флори є рід *Kamptonetma* Struneczký, Komárek et Šmarda. Його описано за результатами комплексного вивчення клональної популяції термальних вод. Морфологічно цей матеріал відповідав опису виду *Oscillatoria animalis* C. Agardh, що також була описана із термальних джерел; відповідно, *Kamptonetma animale* (C. Agardh ex Gomont) Struneczký, Komárek et Šmarda визнана типовим видом цього роду, до якого віднесено ще 9 видів, які раніше належали до родів *Oscillatoria* чи *Phormidium* (в класичному розумінні). Як видно з таблиці, деякі види також отримали нові назви. Наприклад, *Phormidium subuliforme* (Kütz. ex Gomont) Anagn. et Komárek, виявлений на ділянках справжньосолончакової рослинності, тепер в якості синоніма віднесений до морського виду *Phormidium thwaitesii*, який раніше не був відомий в Україні. Це ж стосується декількох видів із списку Герасимюка із співавторами. *Oscillatoria amoena* Kütz. ex Gomont тепер розглядається як *Microcoleus amoenus*. *Anabaena constricta* (Szafer) Geitler (взагалі то ця назва вважається *nomen nudum*, вид більше відомий як *Pseudanabaena constricta* (Szafer) Lauterborn) стала предметом дуже цікавого комплексного дослідження [HAŠLER, DVOŘÁK, POULÍČKOVÁ, 2014a,b], за результатами якого був описаний новий рід *Johanseninema* [HAŠLER, DVOŘÁK, POULÍČKOVÁ].

Висновки

На пересохлих ділянках Куяльницького лиману у солонцевому ґрунті, вкритому справжньосолончаковою рослинністю та різnotравними засоленими луками, методом культур виявлено 42 види Cyanoprokaryota з 19 родів, 10 родин та чотирьох порядків підкласів *Synechococcophycidae* (41,5 %), *Oscillatoriophycidae* (34,1 %) та *Nostochophycidae* (24,4 %). Частота трапляння більшості знайдених видів була невисокою, з них 21,1 % відмічені лише раз. Найчастіше в ґрутових зразках траплялись *Phormidium takyricum*, *Nostoc linckia*, *Leptolyngbya fragilis* та *Nodularia sphaerocarpa*.

Відмічено постійну присутність та кількісне переважання ціанопрокаріот у досліджених зразках (порівняно із діатомовими та зеленими водоростями), висока насиченість проб видами, значне різноманіття гетероцитних форм та рясний розвиток у ґрутових культурах представників порядку Nostocales. За екологічним профілем, більшість знайдених видів відомі як аквально-субаeroфітні, що відбиває екотонний характер вивченого місцезростання. За ставленням до умов солоності, виявлені види належать до галофілів (11,9 %), галобіонтів (40,1 %) та галотолерантів (47,6 %). Ділянки із рослинністю різного типу дещо відрізнялися за видовим та таксономічним складом Cyanoprokaryota, що пов'язано із різницею у ступені зволоженості ділянок.

Зроблено ряд цікавих флористичних знахідок – вперше для України вказуються *Pseudocapsa maritima* Komárek, *Leptolyngbya norvegica* (Gomont) Anagn. et Komárek, *Phormidium litorale* Golubić, *Ph. viride* (Vaucher ex Gomont) Lemmermann, *Porphyrosiphon fuscus* Gomont ex Frémy, *Nodularia crassa* (Voronichin) Komárek, Hübel et M. Hübel.

Виявлені види проаналізовано з точки зору сучасних поглядів на їх таксономічне положення. Складено перевірений список цianопрокаріот Куяльницького лиману за оригінальними та літературними даними.

Подяка

Автор висловлює ширу подяку д.б.н. проф. Д.В. Дубині за допомогу із відбором ґрутових зразків та відомості щодо рослинності досліджених ділянок.

References

- BORYSIUK M.V. (2002). *Alholohia*, **12** (4): 408-420. [БОРИСЮК М.В. (2002). Видовой состав фитоперифитона Таганрогского залива Азовского моря. *Альгология*, **12** (4): 408-420]
- CAMERON R.E. (1960). Communities of soil algae occurring in the Sonoran Desert in Arizona. *Journal of the Arizona Academy of Science*, **1** (3):85-88.
- ENNAN A.A., SHYKHALEEV I.I., SHYKHALEEEVA G.N., ADOBOVSKIY V.V., KIRIUSHKINA A.N. (2014). *Visnyk ONU, Ser.: Chemistry*, **19** (3/51): 60-70. [Эннан А.А., Шихалеев И.И., Шихалеева Г.Н., Адобовский В.В., Кирюшкина А.Н. (2014). Причины и последствия деградации Куяльницкого лимана (Северо-Западное Причерноморье, Украина). *Вісник ОНУ. Сер.: Хімія*, **19** (3/51): 60-70]
- GERASIMIUK V.P., ENNAN A.A., SHYKHALEEEVA G.N. (2011). *Alholohia*, **21** (2): 408-420. [ГЕРАСИМЮК В.П., Эннан А.А., Шихалеева Г.Н. (2011). Видовой состав водорослей бентоса Куяльницкого лимана (Северо-Западное Причерноморье, Украина). *Альгология*, **21** (2): 226-240]
- HAŠLER P., DVOŘÁK P., POULÍČKOVÁ A. (2014a). A new genus of filamentous epipelic cyanobacteria, *Johansenia*. *Preslia*, **86** (I-XX): 1-15.
- HAŠLER P., DVOŘÁK P., POULÍČKOVÁ A. (2014b). *Johanseninema*, a corrected name for a recently described genus of filamentous epipelic cyanobacteria. *Preslia*, **86**: 293-294.
- ISSA O.M., STAL L.J., DÉFARGE C., COUTÉ A., TRICHET J. (2001). Nitrogen fixation by microbial crusts from desiccated Sahelian soils (Niger). *Soil Biology & Biochemistry*, **33**:1425-1428.
- KOLESNIKOVA A.A., NOSYREV S.V., SHMURATKO V.I. (1997). *Dopovidi NAN України*, **8**: 123-128. [КОЛЕСНИКОВА А.А., НОСЫРЕВ И.В., ШМУРАТКО В.И. (1997). Циклический характер изменчивости гидролого-гидрохимических параметров Куяльницкого лимана (Северное Причерноморье). *Доповіді НАН України*, **8**: 123-128]
- KOMÁREK J. (2013). Cyanoprokaryota. 3rd part: Heterocytous Genera – Berlin Heidelberg: Elsevier. 1130 s. [Süßwasserflora von Mitteleuropa. Band 19/3]
- KOMÁREK J., ANAGNOSTIDIS K. (1999). Cyanoprokaryota. 1. Teil: Chroococcales. Jena; etc.: G. Fisher. 548 s. [Süßwasserflora von Mitteleuropa. – Band 19/1]
- KOMÁREK J., ANAGNOSTIDIS K. (2005). Cyanoprokaryota. 2. Teil: Oscillatoriales. Jena etc.: Elsevier. 759 s. [Süßwasserflora von Mitteleuropa. Band 19/2]
- KOMÁREK J., HÜBEL M., HÜBEL H. & SMARDA J. (1993). The *Nodularia* studies 2. Taxonomy. *Algological Studies*, **68** (1-2): 1-25.
- KOMÁREK J., KAŠTOVSKÝ J. & JEZBEROVÁ J. (2011). Phylogenetic and taxonomic delimitation of the cyanobacterial genus *Aphanothecae* and description of *Anathece gen. nov.* *European Journal of Phycology*, **46** (3): 315-326.
- KOMÁREK J., KAŠTOVSKÝ J., MAREŠ J., JOHANSEN J.R. (2014). Taxonomic classification of cyanoprokaryotes (cyanobacterial genera) 2014 using a polyphasic approach. *Preslia*, **86** (4): 295-235.
- KONDRAТЬЄVA N.V. (1968). Klas gormogonievi – Hormogoniophyceae. Kyiv: Naukova Dumka. 523 p. [КОНДРАТЬЄВА Н.В. (1968). Клас гормогонієві – Hormogoniophyceae. Визначник прісноводних водоростей Української РСР. 7. Вип.2. Синьозелені водорості – Cyanophyta; Ч.1. Київ: Наук. думка, 523 с.]
- KOVALENKO O.V. (2009). Flora vodorostey Ukrainy, vol. I, issue 1. Chroococcales. Kyiv: Aristey. 387 p. [КОВАЛЕНКО О.В. (2009). Флора водоростей України. Синьозелені водорості. Том I. Спеціальна частина. Вип. 1. Порядок Chroococcales. Київ: Арістей. 387 с.]
- LIALIUK N.M., KLIMIUK V.N. (2011). *Alholohia*, **21** (3): 321-328. [Лялюк Н.М., Климюк В.Н. (2011). Фитопланктон Славянских соленых озер (Украина). *Альгология*, **21** (3): 321-328]
- NAZARENKO I.I., POL'CHYNA S.M., NIKORYCH V.F. Gruntoznavstvo. Chernivtsi: Knhy – XXI. 400 p. [НАЗАРЕНКО І.І., Польчина С.М., Нікорич В.А. (2004). Грунтознавство. Чернівці: Книги – XXI. 400 с.]

- OREN A. (2000). Salts and Brines. In: The Ecology of Cyanobacteria. Their Diversity in Time and Space. Whitton, B. & Potts, M. (eds.). Dordrecht, London, Boston: Kluwer Akad. Publ.: 281-306.
- ПОХРЕБНІАК І.І. (1949). *Pr. ODU. Zb. Biol. Fak.*, **4** (57): 123-133. [ПОГРЕБНЯК І.І. (1949). Фітобентос Куяльницького лиману. *Пр. Одесськ. держ. ун-ту. Зб. біол. фак.*, **4** (57): 123-133]
- PRIKHODKOVA L.P. (1992). Sinezelenye vodorosli pochv stepnoi zony Ukrayny. Kyiv: Naukova Dumka. 218 p. [ПРИХОДЬКОВА Л.П. (1992). Синезеленые водоросли почв степной зоны Украины. Киев: Наук. думка. 218 с.]
- SOLONENKO A.N., YAROVOI S.A., PODOROZHNYI S.N., RAZNOPOLOV O.N. (2006). *Gruntoznavstvo*, **7** (3-4): 123-127. [СОЛОНЕНКО А.Н., ЯРОВОЙ С.А., ПОДОРОЖНЫЙ С.Н., РАЗНОПОЛОВ О.Н. (2006). Водоросли солончаков Степановской и Федотовой кос Северо-Западного побережья Азовского моря. *Грунтознавство*, **7** (3-4): 123-127.]
- SIEGESMUND M.A., JOHANSEN J.R., KARSTEN U., FRIEDL T. (2008). *Coleofasciculus* gen. nov. (Cyanobacteria): morphological and molecular criteria for revision of the genus *Microcoleus* Gomont. *J. Phycol.*, **44**: 1572-1585.
- STRUNECKÝ O., KOMÁREK J., JOHANSEN J., LUKEŠOVÁ A., ELSTER J. (2013). Molecular and morphological criteria for revision of the genus *Microcoleus* (Oscillatoriaceae, cyanobacteria). *J. Phycol.*, **49**(6): 1167-1180.
- STRUNECKÝ, O., KOMÁREK, J. & SMARDA, J. (2014). *Kamptonema* (Microcoleaceae, Cyanobacteria), a new genus derived from the polyphyletic *Phormidium* on the basis of combined molecular and cytological markers. *Preslia (Prague)*, **86**: 193-207.
- VINOGRADOVA O.M. (2012). Cyanoprokaryota hiperhalinnykh ekosistem Ukrayny. Kyiv: Alterpress. 200 p. [ВИНОГРАДОВА О.М. (2012). Cyanoprokaryota гіпергалінних екосистем України. Київ: Альтерпрес. 200 с.]
- VINOGRADOVA O.M. (2013). Syniozeleni vodorosti ekstremalnykh mistsezrostan. Diss. doct. biol. n. Kyiv: 466 p. [ВИНОГРАДОВА О.М. (2013). Синьозелені водорості екстремальних місцезростань. Дис. ... докт. біол. наук. Київ. 466 с.]
- VINOGRADOVA O.M., DARIENKO T.M. (2008). *Ukr. botan. zhurn.*, **65** (3): 380-398. [ВИНОГРАДОВА О.М., ДАРІЄНКО Т.М. (2008). Нові та цікаві види водоростей із Азово-Сиваського національного природного парку (Херсонська область, Україна). *Укр. ботан. журнал*, **65** (3):380-398]

Рекомендую до друку
О.Є. Ходосовцев

Отримано 05.03.2016

Адреса автора:
О.М. Виноградова
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН
України
вул. Терещенківська, 2
Київ, 01001
Україна
e-mail: o.vinogradova@gmail.com

Author's address:
O.M. Vynogradova
M.G. Kholodny Institute of Botany
National Academy of Sciences of Ukraine
2, Tereschenkivska str.
Kyiv, 01001
Ukraine
e-mail: o.vinogradova@gmail.com