

- . . . . . , . . . . . ” . . . . . ” . . . . . . . . . . .
- . . . . . , . . . . . ” . . . . . ” . . . . . . . . . . .
- . . . . . , . . . . . ” . . . . . ” . . . . . . . . . . .
- . . . . . , . . . . . ” . . . . . ” . . . . . . . . . . .
- . . . . . , . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . .
- « . . . . . »

8-10

: - . . . . . : . . . . . )

- ; , - ) -

- ;

12 - )

( 8 . ) 2-

: ;

) « »;

) - , [1-3].


2 : - )

( ' - )

); ,

) ( - ;


4 - )




. 1.



- ; ( - - ;  
 - ) ; - ( ) ;  
 - ; ( ) ;



. 4. ( ) ( ) 2010-2012 ( %).



. 5. 2010-2012 ( %).




Рис. 6. Розширена резистентність МБТ до АМБІ у хворих при повторному лікуванні (у %).





Рис. 7. Розширена резистентність в процесі контролю основного курсу хіміотерапії (у %).



8. ( %).

2.

( )

21.12.2012 . 1091.

3.

( . 1).

( )

( . 2-8).

4.

1.

5

3

1. I f: 3. . . . . , 2009. — 488 .

2- / . . . . . , 2011. — 1362 . — 261 . — 147 .

2. ( ) ( / -

91 21.12.2012 . // , - 167 .

26.04.2013

616.24-002.5-085:615.015.8\_

∴ , ∴ , ∴ , ∴ ,

3

5

V. P. Melnyk, O. V. Panasyuk, T. G. Khursa, O. O. Petrenko,  
H. V. Honcharova

**PALIAITIVE TREATMENT OF PATIENTS WITH FAILURE  
OF TREATMENT IN CASE OF MULTIDRUG RESISTANCE  
TUBERCULOSIS**

**Key words:** paliative treatment, extensively drug resistant.

Frequency and profile of chemoresistant are studied among the different categories of patients by tuberculosis. The of high level of extensively drug resistant of MBT is set to antimycobacterial preparations, frequency of that for the last 3 years grew in 5 times, that causes a disturbance in the plan of paliative treatment.

616.366-002-036.12-0.36.12-08



... , ... , ... , ... ,  
...  
:  
3 5 ,  
,  
• • • , • • • •  
• « »  
( ) [2, 3, 4].  
,  
( ); , , ( ) [5,6].  
; ( ).  
- - - - -  
[7,8].  
[1].  
- - - - -  
[7-9].  
[9].  
[7,9 ].  
[7], ( )