



Ю.В. Родин, Д.Ш. Дюба,
Н.В. Яснопольская, Р.Ю. Юсупов

КОРРЕКЦИЯ СИНДРОМА ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ВНУТРИЧЕРЕПНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРАКТОМИИ ПУТЕМ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО УЛУЧШЕНИЯ ВЕНОЗНОГО ОТТОКА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СИНДРОМА ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГИПЕРПЕРФУЗИИ

ГУ «Институт неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака
НАМН Украины», Донецк

Цель работы — изучение венозного и ликворного компонентов внутричерепного давления (ВД) у пациентов с синдромом доброкачественной внутричерепной гипертензии (СДВГ) при выполнении каротидной эндартерэктомии (КЭ); оценка коррекции ВД путем фармакологического улучшения венозного оттока для профилактики синдрома церебральной гиперперфузии (СЦГП).

Материалы и методы. На основании клинически и инструментально подтвержденного СДВГ в исследование было включено 60 пациентов в возрасте от 40 до 65 лет (средний возраст — 55 лет), находившихся на лечении в сосудистом отделении ГУ «Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака НАМН Украины». Венозный отток из полости черепа исследовали при помощи сонографии (в двухмерном и доплеровском режиме), что позволило оценить морфологические изменения в сосудах, функциональные параметры кровотока. Коррекцию венозного тонуса у больных с признаками повышения ВД проводили комбинированным препаратом «Нормовен» (диосмин и гесперидин (ДГ), Киевский витаминный завод) в дозе 500 мг 2 раза в сутки с интервалом 12 ч на протяжении 14 дней. Больных распределили на две группы: контрольную — 30 пациентов, которые не принимали венотонических препаратов в дооперационный период, и основную — 30 пациентов, которые в течение 1 месяца до операции получали ДГ.

Результаты и обсуждение. Быстрая нормализация венозно-ликворных показателей отмечена в группе больных, которые, кроме стандартной медикаментозной терапии, получали ДГ.

Выводы. Применение венотоников способствует улучшению венозного оттока из полости черепа за счет снижения венозно-ликворных показателей у больных с СДВГ при выполнении каротидной эндартерэктомии. Их целесообразно включать в комплекс лечения пациентов с СЦГП.

Ключевые слова: внутричерепное давление, синдром доброкачественной внутричерепной гипертензии, каротидная эндартерэктомия, диосмин с гесперидином.

Внутричерепное давление (ВД) — это давление в полости черепа (в венозных синусах мозга, мозговых желудочках, эпидуральном и субарахноидальном пространствах [2, 4]), которое обусловлено динамическим равновесием объемного мозгового

кровотока, объемов цереброспинальной жидкости и ткани мозга. Нормальное ВД — это необходимое условие адекватного кровоснабжения мозга, его метаболизма и функциональной активности. ВД обеспечивается сложными механизмами регу-

ляции церебрального перфузионного давления, тонусом мозговых сосудов, объемным мозговым кровотоком, скоростью продукции и резорбции цереброспинальной жидкости, проницаемостью гематоэнцефалического барьера, коллоидно-осмотическим гомеостазом внутри- и внеклеточной жидкости мозга и некоторыми другими факторами [3, 5].

Важной составляющей повышения ВД является венозный компонент. Повышение ВД сопровождается сдавливанием мостиковых вен и расширением конвексимальных подпаутинных пространств. Роль базальных вен в оттоке крови от головного мозга при этом существенно возрастает, что приводит к ускорению кровотока в глубоких венах мозга, в частности, — в венах Розенталя. Повышение ВД, в свою очередь, вызывает повышение градиента давления на границе между венозной кровью и ликвором с вероятным замедлением резорбции ликвора. Развивается артеробитивная ликворная гипертензия, диагностическим признаком которой является эхокопическое расширение III желудочка мозга.

Фармакологическая коррекция тонуса венозной стенки диосмином с гесперидином (ДГ) улучшает отток венозной крови из полости черепа и способствует нормализации ликворного давления. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о возможности вмешательства в механизм артеробитивной ликворной гипертензии посредством улучшения венозного оттока из полости черепа при помощи венотонических препаратов. В.В. Куприянов (1975) и М.И. Холоденко (1963) установили обильную иннервацию глубоких вен мозга и наличие мышечного слоя в венах Розенталя и вене Галена. Поэтому применение венотоника является обоснованным для воздействия на нервно-мышечный аппарат глубоких вен мозга, который, вероятно, может регулировать отток венозной крови.

Синдром церебральной гиперперфузии (СЦГП) — это сочетание повышения артериального давления с клинической триадой симптомов (относящихся к соответствующей стороне тела): мигреноподобная головная боль, эпилептические приступы и преходящий неврологический дефицит при отсутствии мозговой ишемии после успешно проведенной каротидной эндартерэктомии (КЭ). Гораздо чаще возникает «малый гиперперфузионный синдром» [4], протекающий в виде головной боли различной интенсивности (односторонняя кластероподобная, возникающая с частотой 1—2 раза в сутки в виде приступов продолжительностью 2—3 ч, или односторонняя пульсирующая боль значительной интенсивности).

В доступной литературе мы не нашли упоминания о венозной регуляции для предупреждения синдрома мозговой гиперперфузии при КЭ. Как известно, дисбаланс венозного церебрального кровообращения снижает гемодинамический ре-

зерв мозгового кровообращения, способствуя развитию хронической ишемии мозга и формированию структурной патологии.

Цель работы — изучение венозного и ликворного компонентов внутричерепного давления у пациентов с синдромом доброкачественной внутричерепной гипертензии при выполнении каротидной эндартерэктомии, оценка коррекции внутричерепного давления путем фармакологического улучшения венозного оттока для профилактики синдрома церебральной гиперперфузии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

На основании клинически и инструментально подтвержденного синдрома доброкачественной внутричерепной гипертензии (СДВГ) в исследовании было включено 60 пациентов, находившихся на лечении в сосудистом отделении ГУ «Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака НАМН Украины», в возрасте от 40 до 65 (средний возраст — 55 лет).

Всем больным проводили комплексное клиническое, аппаратно-инструментальное и лабораторное обследование, а также ортопедический и неврологический осмотр. Венозный отток из полости черепа исследовали при помощи сонографии (датчики: линейный с частотой 7 МГц для экстракраниального отдела и векторный с частотой 2,5 МГц для интракраниального исследования). Применяли двухмерный и доплеровский режимы, что позволяло оценить морфологические изменения в сосудах, функциональные параметры кровотока. Критерием нарушения венозного оттока служили гемодинамические показатели в глубоких венах мозга, в частности в венах Розенталя.

Синдром церебральной гиперперфузии проявлялся нестабильностью гемодинамики с выраженной гипертензией в послеоперационный период, цефалгией, устойчивой к терапии, развитием эйфории и неадекватности, психозов и агрессии, эпилептиками. Также наблюдали явные клинические признаки СЦГП в различных сочетаниях и с разной степенью выраженности.

Фармакологическую коррекцию венозного тонуса у больных с признаками повышения ВД проводили биофлавоноидами с венотонической и ангиопротекторной активностью — комбинированным препаратом ДГ «Нормовен» (Киевский витаминный завод) в дозе 500 мг 2 раза в сутки с интервалом 12 ч на протяжении 14 дней. Такой режим приема препарата обеспечивал его стабильную концентрацию в крови.

Больных распределили на две группы. Контрольную группу составили 30 пациентов, прооперированных в отделе неотложной и восстановительной хирургии сосудов, которые не принимали венотонических препаратов в дооперационный период. Основная группа — 30 пациентов, которые в течение 1 мес до операции получали ДГ (предоставлен-

ный для исследования производителем) по 1 таблетке 2 раза в сутки. Распределение больных по полу и возрасту было однородным в обеих группах. Степень поражения и степень предшествующей неврологической симптоматики были примерно одинаковыми.

Учитывая, что одним из наиболее частых симптомов гиперперфузии в послеоперационный период является головная боль, которая остается основным воспоминанием пациентов о послеоперационном периоде, с целью объективизации данных и оценки интенсивности боли мы использовали визуальную аналоговую шкалу (ВАШ). Интенсивность головной боли определяли сами больные по 10-балльной системе (слабая боль — от 1 до 3 баллов, умеренная — от 4 до 6 баллов, сильная — от 7 до 10 баллов). Также использовали Лидский опросник (LDQ), который отражает зависимость пациентов от анальгетиков, применяемых для купирования головной боли до проводимой терапии и через месяц после нее. Для оценки общего состояния и качества жизни пациента использовали краткий опросник (НІТ-6): чем выше балл, тем больше влияние головной боли на качество жизни.

Статистическую обработку материала проводили с помощью расчетных формул и методов математической статистики. Вычисляли среднее арифметическое значение показателей (M), их среднее квадратическое отклонение (σ), стандартную ошибку средней величины (m). Для оценки значимости различий использовали t -критерий для двух зависимых выборок. Различия считали значимыми при величине $t > 2$ (вероятность ошибки — $p < 0,05$). Связь между показателями определяли при помощи коэффициента линейной корреляции Пирсона (r). Силу связи оценивали по величине коэффициента корреляции: сильная — при $r = 0,7-0,99$, средняя — при $r = 0,3-0,69$, слабая — при $r = 0,01-0,29$.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Согласно полученным данным, повышение ВД с ультразвуковыми признаками ликворо-венозной гипертензии сопровождалось вегетососудистыми нарушениями в 36 % случаев, цефалгическим или вестибулоломозжечковым синдромом — в 23 %. В

менее чем 5 % случаев повышенное ВД проявлялось прогрессирующим снижением остроты зрения, сенсорной тугоухостью, синдромом нарушения внимания, гиперактивностью, зрительными расстройствами в виде тумана перед глазами, заторможенностью, безынициативностью. При этом, по данным ультразвукового исследования, зафиксировано повышение максимальной скорости кровотока в базальных венах мозга (Розенталя, Галена и прямого синуса), а также псевдопульсации в этих сосудах, которые оценивали по усредненной во времени максимальной скорости кровотока (time-averaged mean maximum velocity — ТАМх). Повышение ТАМх сопровождалось выраженной или сильной пульсацией М-эха. Слабую пульсацию расценивали как вариант нормы.

Анализ полученных данных свидетельствовал о наличии признаков повышения ВД за счет ликворного и венозного компонентов. Прослеживалась взаимообусловленность этих процессов: установлена достоверная прямая сильная связь между систолической скоростью венозного кровотока (V_{ps}) и шириной М-эха ($r = 0,77$; $p < 0,05$), между диастолической скоростью венозного кровотока (V_{ed}) и ТАМх ($r = 0,76$; $p < 0,01$), а также прямая связь средней силы между V_{ps} и ТАМх ($r = 0,65$; $p < 0,05$). Наличие таких связей указывает на устойчивую взаимозависимость повышения ВД и ускорения кровотока в глубоких венах мозга.

Применение препарата «Нормовен» способствовало достоверному ($p < 0,01$) снижению скорости венозного кровотока по венам Розенталя, что свидетельствовало об улучшении венозного оттока из полости черепа и снижении ВД (табл. 1).

Стабилизация венозного кровотока в головном мозге коррелировала со статистически достоверным ($r = 0,77$, $p < 0,05$) уменьшением размеров III желудочка мозга. Нормализация ликворно-венозных показателей сопровождалась положительной динамикой состояния больных с регрессом большинства описанных клинических признаков.

У всех пациентов в до- и послеоперационный период исследовали показатели кровотока в венозном русле «сосудов возврата», принимающих кровь из региона головного мозга (в частности, во внутренней яремной вене). Значимых различий не получено ($p = 0,05$), однако отмечена тенден-

Т а б л и ц а 1
Динамика скоростных показателей венозного оттока из полости черепа в базальных венах мозга и ликворного пространства III желудочка при фармакологической коррекции вентониками

Показатель	До лечения ($M \pm m$)	После лечения ($M \pm m$)	t	p
V_{ps} , см/с	$17,6 \pm 0,65$	$13,6 \pm 0,52$	5,4	$< 0,0001$
V_{ed} , см/с	$12,4 \pm 0,53$	$10,5 \pm 0,47$	3,0	$< 0,01$
ТАМх, см/с	$14,7 \pm 0,33$	$12,67 \pm 0,36$	4,0	$< 0,002$
Ширина М-эха, мм	$9,46 \pm 0,27$	$7,46 \pm 0,18$	10,2	$< 0,0001$

ция к замедлению кровотока во внутренней яремной вене, начиная с первого часа после операции, по мере развития СЦГП.

Скорость кровотока при развитии СЦГП во внутренней яремной вене снижалась на 14 % в основной группе и на 18 % — в контрольной, хотя различия этих величин с контрольными значениями не достигали статистически значимого уровня ($p > 0,05$). Венозный поток крови в глазничных венах в горизонтальном положении больных с церебральной ишемией достоверно возрастал на 11,9 % ($p < 0,05$) уже на начальных стадиях СЦГП, тогда как в глубоких венах мозга он существенно отличался от нормы (замедление) лишь при выраженных стадиях СЦГП (соответственно на 19,1 и 29,6 %).

По данным ультразвукового исследования, у больных имел место сосудистый (венозный) фактор в виде увеличения максимальной скорости кровотока в базальных венах мозга (Розенталя, Галена и прямом синусе). Отмечена выраженная псевдопульсация в этих сосудах, оцененная по ТАМх. Увеличение ТАМх сопровождалось выраженной или сильной пульсацией М-эха. Стабилизация венозного кровотока головного мозга коррелировала со статистически достоверным ($r = 0,77$, $p < 0,05$) уменьшением размера III желудочка мозга.

Быструю нормализацию венозно-ликворных показателей наблюдали в группе больных, которые, кроме стандартной медикаментозной терапии, получали ДГ, что сопровождалось положительной динамикой состояния больных с регрессом большинства упомянутых клинических при-

знаков. Отмечено положительное влияние ДГ на венозную гемодинамику в виде нормализации кровотока по базальной вене Розенталя и в прямом синусе, перехода ретроградного кровотока в антеградный по вене Галена. В процессе лечения увеличивалось количество больных с отчетливой пульсацией церебрального участка ретинальной вены (табл. 2).

В течение операции оценивали ретроградное давление (РАД) по внутренней сонной артерии, измеренное прямым методом. Оно составляло в среднем ($51,1 \pm 17,9$) мм рт. ст. Церебральное перфузионное давление (ЦПД) определяли по формуле: $ЦПД = РАД - ВД$ (яремная вена). Оно составляло в среднем ($39,9 \pm 18,0$) мм рт. ст. Критический показатель — $1/2$ системного АД. Следовательно, чем меньше ВД, тем выше вероятность выполнения операции без использования внутреннего шунта, что значительно упрощает операцию, уменьшает ее длительность и риск послеоперационных осложнений.

Отмечена позитивная динамика по данным транскраниальной доплерографии (ТКД): увеличилась линейная систолическая скорость в бассейне сонных и позвоночных артерий, выровнялись гемодинамические асимметрии, нормализовался индекс пульсации.

Клинический эффект в послеоперационный период в виде уменьшения головной боли больные отмечают при приеме ДГ как минимум в течение 7 дней до операции, хотя лучшие результаты отмечены при приеме препарата на протяжении месяца до операции (табл. 3).

Т а б л и ц а 2
Эффективность регуляции церебральной гемодинамики препаратом «Нормовен»

Линейная скорость кровотока, см/с	Без ДГ	Прием ДГ	Коэффициент изменения	Р
Вена Розенталя	$17,8 \pm 4,3$	$18,3 \pm 2,7$	1,15	0,043
Глазничная вена	$24,8 \pm 3,7$	$23,9 \pm 3,1$	1,03	0,0621
Прямой синус	$35,7 \pm 7,0$	$24,8 \pm 3,7$	1,5	0,021

Нормальность распределения данных проверена при помощи критерия Шапиро—Уилка, распределение данных отличается от нормальных при уровне значимости $p < 0,05$. Для сравнения обеих групп применяли непараметрический критерий Манна—Уитни. Сравнение центральных тенденций двух независимых выборок. Критерий Манна—Уитни. Двусторонняя критическая область. Центральные тенденции отличаются на уровне значимости $p < 0,05$. Сравнение формулы распределения двух выборок. Критерий χ^2 . Распределения отличаются на уровне значимости $p < 0,05$ (кроме вены Галена).

Т а б л и ц а 3
Динамика интенсивности головной боли в послеоперационный период

Группа	ВАШ		LDQ		Индекс НГТ	
	До лечения	После лечения	До лечения	После лечения	До лечения	После лечения
Основная (n = 30)	$6,2 \pm 0,77$	$1,8 \pm 0,27$	$11,6 \pm 1,24$	$4,8 \pm 0,88$	$57,6 \pm 2,61$	$36,7 \pm 2,12$
Сравнения (n = 30)	$6,2 \pm 0,81$	$4,8 \pm 0,68$	$11,3 \pm 1,32$	$10,8 \pm 1,21$	$53,8 \pm 2,48$	$45,3 \pm 2,56$

Величины непараметрических критериев статистически значимы по всем шкалам.

ВИВОДИ

Улучшение венозного оттока от мозга — это важный гемодинамический резерв улучшения результатов выполнения каротидной эндартерэктомии.

Применение препарата «Нормовен» способствует улучшению венозного оттока из полости черепа

за счет снижения венозной и ликворной составляющих у больных с синдромом доброкачественной внутричерепной гипертензии при выполнении каротидной эндартерэктомии.

Целесообразно включать венотоники в комплекс лечения пациентов с синдромом церебральной гиперперфузии.

Література

1. Бабенков Н.В. Нарушения венозного кровообращения мозга: патогенез, клиника, течение, диагностика // Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова.— М., 1984.— Т. 84, вып. 2.— С. 281—288.
2. Бердичевский М.Я. Венозная дисциркуляторная патология головного мозга.— М., 1989.— 224 с.
3. Коркушко О.В., Лишневская В.Ю. Терапевтические возможности лечения хронической венозной недостаточности // Здоров'я України.— К., 2004.— № 9.— С. 3.
4. Холоденко М.И. Расстройства венозного кровообращения в мозгу.— М.: Изд-во мед. лит-ры, 1963.— 226 с.
5. Allen R. Intracranial pressure: a review of clinical problems, measurement techniques and monitoring methods // J. Med. Eng. Technol.— 1986.— Vol. 10.— P. 299—320.
6. Kaufmann G.E., Clark K. Continuous-simultaneous monitoring of the ventricular and cervical subarachnoidal cerebrospinal fluid pressures to indicate development of cerebral or tonsillar herniation // J. Neurosurg.— 1970.— Vol. 33.— P. 145—150.
7. Marmarou A., Anderson R.L., Ward J.D. Impact of ICP instability and hypotension on outcome in patients with severe head injury // J. Neurosurg.— 1991.— Vol. 75 (suppl.)— P. S59—S66.

Ю.В. Родін, Д.Ш. Дюба, Н.В. Яснопольська, Р.Ю. Юсупов

КОРЕКЦІЯ СИНДРОМУ ДОБРОЯКІСНОЇ ВНУТРІШНЬОЧЕРЕПНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ПРИ ВИКОНАННІ КАРОТИДНОЇ ЕНДАРТЕРЕКТОМІЇ ШЛЯХОМ ФАРМАКОЛОГІЧНОГО ПОЛІПШЕННЯ ВЕНОЗНОГО ВІДТОКУ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ СИНДРОМУ ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ГІПЕРПЕРФУЗІЇ

Мета роботи — вивчення венозного та лікворного компонентів внутрішньочерепного тиску (ВТ) у пацієнтів із синдромом доброякісної внутрішньочерепної гіпертензії (СДВГ) при виконанні каротидної ендартеректомії; оцінка корекції ВТ шляхом фармакологічного поліпшення венозного відтоку для профілактики синдрому церебральної гіперперфузії (СЦГП).

Матеріали і методи. На підставі клінічно та інструментально підтвердженого СДВГ до дослідження було залучено 60 пацієнтів віком від 40 до 65 років (середній вік — 55 років), які перебували на лікуванні в судинному відділенні ДУ «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака НАМН України». Венозний відтік з порожнини черепа досліджували за допомогою сонографії в двовимірному і доплерівському режимах, що дало змогу оцінити морфологічні зміни в судинах, функціональні параметри кровотоку. Фармакологічну корекцію венозного тонуусу у хворих з ознаками підвищення ВТ проводили комбінованим препаратом «Нормовен» (діосмін з гесперидином, Київський вітамінний завод) у дозі 500 мг двічі на добу з інтервалом 12 год протягом 14 днів. Хворих розподілили на дві групи: контрольну — 30 пацієнтів, які не отримували венотонічних препаратів у доопераційний період, і основну — 30 пацієнтів, які протягом 1 міс до операції отримували ДГ.

Результати та обговорення. Швидку нормалізацію венозно-лікворних показників спостерігали в групі хворих, які, крім стандартної медикаментозної терапії, отримували ДГ.

Висновки. Застосування венотоніків сприяє поліпшенню венозного відтоку з порожнини черепа за рахунок зниження венозної та лікворної складових у хворих із СДВГ при виконанні каротидної ендартеректомії. Венотоники доцільно включати у комплекс лікування пацієнтів із СЦГП.

Ключові слова: внутрішньочерепний тиск, синдром доброякісної внутрішньочерепної гіпертензії, каротидна ендартеректомія, діосмін з гесперидином.

Yu.V. Rodin, D.Sh. Diuba, N.V. Yasnopolskaya, R. Yu. Yusupov

BENIGN INTRACRANIAL HYPERTENSION SYNDROME CORRECTION
DURING CAROTID ENDARTERECTOMY
WITH VENOUS DRAINAGE PHARMACOLOGICAL IMPROVEMENT
TO PREVENT HYPERPERFUSION CEREBRAL SYNDROME

The aim – the study venous and liquor components of intracranial pressure (IP) in patients with the benign intracranial hypertension syndrome (BICHHS) during carotid endarterectomy performance, to evaluate IP pharmacological correction by venous drainage improving to prevent cerebral hyperperfusion syndrome (CHPS).

Materials and methods. On the basis of clinically and instrumentally confirmed BICHHS 60 patients aged 40 to 65 years (mean age – 55 years) were involved in the study who were treated in the vascular unit. Venous outflow from the cranial cavity examined by sonography in two-dimensional and Doppler modes, allowing to evaluate the morphological changes in blood vessels, functional blood flow parameters. Pharmacological correction of venous tone in patients with IP signs conducted with combined medication *Normoven* (diosmin with hesperidin (DH), *Kyiv Vitamin Plant*) at a dose of 500 mg twice a day every 12 hours for 14 days. Patients were divided into two groups: control – 30 patients who did not receive drugs in the preoperative period and the basic group – 30 patients treated with DH within 1 month before surgery.

Results and discussion. Rapid normalization of venous-liquor parameters were observed in the group of patients who, in addition to standard medical therapy, used DH.

Conclusions. Venotonics application improves venous outflow from the cranial cavity by reducing venous and liquor constituents in patients with BICHHS during carotid endarterectomy. It is appropriate to include venotonics in the complex treatment of patients with CHPS.

Key words: intracranial pressure, benign intracranial hypertension syndrome, carotid endarterectomy, diosmin with hesperidin.