


Строки, умови, фази розвитку рослин	Шкідливі об'єкти	Заходи і засоби їх виконання	Критерії необхідності заходів
Осінньо-зимовий період (листопад — лютий) 	Мишоподібні гризуни, зайці	Розкладання в норі отруєних принад: препарату Шторм, 0,005% воскові брикети (1 брикет на нору) та біологічного препарату вологий зерновий Бактороденцид (1,5—2,0 кг/га). Примітка: для захисту рослин у полях розсадника від зайців всю територію (по периметру) необхідно огорожувати дротяною сіткою	За чисельності понад 20 колоній на 1 га і відсутності зеленої маси рослин

Для тих, хто готується вирощувати цибулю

ІНТЕНСИВНА ТЕХНОЛОГІЯ

вирощування цибулі ріпчастої на зберігання для степової зони України

Основний обробіток ґрунту: дискування попереднику (ячмінь), зяблева оранка, перша весняна культивация по зрілому ґрунту, друга — перед сівбою.

Строки висіву: початок — середина березня (в період сівби ярих зернових).

Використовували пневматичну сівалку точного висіву «GASPARDO». Посів трирядний, відстань між колесами 1,65 м, 4 двострічкових рядки (8 рядків) в гряді.

І.В. ВЕРІЖНИКОВА,
кандидат сільськогосподарських наук,
E-mail: zahystros@mail.ru

РОМАН БЕРЕЖНЯК,
технічний експерт компанії Vejo

Прикотування кільчасто-шпоровими котками вздовж посіву.

Густота посіву — 1 млн шт./га, відстань між рослинами 5,25 см.

Гібрид Манас цибулі типу Дай-

тона, компанії Vejo, вегетаційний період 110—115 днів.

Краплинне зрошення — впродовж всього періоду вегетації. Крапельна стрічка (John Deere) — 12,5 км/га, 6250 ефективних погонних метрів. Норма зрошення за весь період вегетації — до 4000 м³/га, за один полив — 50—60 м³/га, приблизно 2 години тривалість одного сеансу поливу (блоку). При фертигації добриво додавати за 35—20 хвилин до закінчення поливу.

Система захисту і живлення цибулі пізньої для зберігання за інтенсивною технологією вирощування (Одеська обл.)

№	Календарні строки заходу	Фаза розвитку цибулі	Мета заходу, шкідливі об'єкти	Заходи	Агрохімікат та норма витрати	Примітки
1	Березень — квітень	Насіння, сімба на глибину 2—3 см	Личинки дротяників, несправжньо-дротяників	Внесення гранульованого інсектициду в рядки	Регент (5—10 кг/га) або Форс (5 кг/га)	Сходи з'являються на 14—20-й день
2	-/-	-/-	Основні добрива	Внесення під час сівби	Нітроамофоска (виробництва Yara International ASA, Норвегія) (200—300 кг/га)	Внесення під час сівби
3	Середина — наприкінці квітня	Сходи, 1 справжній, прямий листок	Комплекс однорічних дводольних бур'янів	Обприскування вибіркоким гербіцидом	Гоал (30 мл/га)	Контактний гербіцид
4	Через 5—6 днів після попередньої гербіцидної обробки	1—2 справжніх листки	Комплекс однорічних дводольних бур'янів	Обприскування вибіркоким гербіцидом	Гоал (40 мл/га)	-/-
5	Через 5—6 днів після гербіциду	2 справжніх листки	Комплекс однорічних дводольних бур'янів	Обприскування вибіркоким гербіцидом	Гоал (50 мл/га)	Можуть з'явитися ознаки пошкодження гербіцидом
6	Через 2 дні після гербіцидної обробки	2—3 справжніх листки	Стимуляція рослин, вихід зі стресу	Обприскування розчином мікроелементів	Нано-Мінераліс (наноактиватор, 30 мл/га), карбамід (4—5 кг/га)	-
7	Через 5—6 днів після попередньої обробки гербіцидом	3 справжніх листки цибулі	Комплекс однорічних дводольних бур'янів	Обприскування вибіркоким гербіцидом	Гоал (60—70 мл/га)	-