






<p>Квітень, під час «розликування бруньок» (фаза «зеленого конуса»)</p>		<p>Садові довгоносики (сірий бруньковий, яблуневий квіткоїд), трубокверти (букарка, казарка), попелиці, яблунева медяниця, листовітки</p> <p>+ парша, філостиктоз (бура плямистість)</p> <p>+ кліщі плодів</p> <p>Примітка: в разі сильного заселення насаджень щитками, особливо каліфорнійською щитковою</p>	<p>Обприскування дерев сумішами препаратів: інсектицидами, одним із: Конфідор, 200 SL, РК (0,25 л/га), Капіско, 480 SC, КС (0,25 л/га), Актара 240 SC, к.с. (0,14—0,15 л/га), Актара 25 WG, в.г. (0,14 кг/га), Альфагард 100, к.е. (0,15 л/га), Балазо 100, KE (0,4—0,5 л/га), Бі-38 Новий, к.е. (2,0 л/га), Данадим Стабільний, к.е. (2,0 л/га), Дантоп 50, ВГ (0,07 кг/га), Децис Профі 25 WG, ВГ (0,1 кг/га), Децис Ф-Люкс 25 EC, KE (0,5—1,0 л/га), Дурсбан, 480 к.е. (2 л/га), Енжіо 247 SC, к.с. (0,18 л/га), Золон, 35 к.е. (2—4 л/га), Ламдекс, СК (0,4 л/га), Моспілан, ВП (0,15—0,2 кг/га), Нурел Д, к.е. (1—1,5 л/га), Пірінекс-480, KE (2,0 л/га), Пірінекс Супер 420, к.е. (1,25—1,5 л/га), Сумітон, к.е. (1,6—3,0 л/га), Талстар 10%, KE (0,4—0,6 л/га), Фастак, KE (0,25 л/га)</p> <p>+ фунгіцидами на основі міді, одним із: Косайд 2000, ВГ (2,0 кг/га); Чемп, ВГ (2,0 кг/га); Чемпіон, ЗП (2,0 кг/га); Чемп Ультра DP, ВГ (2,0 кг/га); Медан Екстра 350 SC, к.с. (2,0 л/га); Кауртіл ДФ, ВГ (3,0 кг/га); Бордо Ізагро 20, з.п. (5 кг/га) або Купроксат, КС (5,0 л/га)</p> <p>+ акарицидом Аполло, к.с. (0,4—0,6 л/га)</p> <p>+ інсектицидом Адмірал, к.е. (0,6—0,8 л/га)</p>	<p>Суміш інсектицидів та акарицидів застосовують за досягнення шкідниками ЕПШ: (3—5 жуків брунькоїда на 100 см гілок; 8—10 жуків казарки на дерево; 30—40 жуків букарки на дерево; 5—8 личинок медяниці/розетки; 5—10 личинок зеленої яблуневої попелиці/розетки; 5—10 личинок червоногогалової попелиці/листок; 2—7 личинок червоного плодового кліща/листок; 10—15 пошкоджених листків шовкопрядами із 100 оглянутих; 4—5 гусениць листовійок на 2 м гілок.</p> <p>Примітка: а) обприскувати в денну пору з нормою витрати робочого розчину 800—1000 л/га; б) фосфорорганічні препарати та піретроїди використовувати за температури навколишнього повітря 15—25°C</p>
<p>Квітень (фази «відокремлення пуп'янків» — «рожевий пуп'янок»)</p>		<p>Садові трубокверти (букарка, казарка) та довгоносики (сірий бруньковий, яблуневий квіткоїд), яблунева медяниця, яблуневий плодовий трач, цикадові та листогризучі види (розована листовійка, горностаєва міль, білан жилкуватий і непарний шовкопряд, листоїд), білан жилкуватий і непарний шовкопряд, літосмінувачі молі, золототуз, зимовий п'ядун, п'ядун-обдирало плодовий, інші)</p> <p>+ парша, бура плямистість листя (філостиктоз), плодова гниль, борошниста роса</p> <p>+ кліщі плодів</p> <p>Примітка: в разі настання приморозків та за підмерзання деревини у 2012 р.</p>	<p>+ фунгіцидами на основі міді, одним із: Косайд 2000, ВГ (2,0 кг/га); Чемп, ВГ (2,0 кг/га); Чемпіон, ЗП (2,0 кг/га); Чемп Ультра DP, ВГ (2,0 кг/га); Медан Екстра 350 SC, к.с. (2,0 л/га); Кауртіл ДФ, ВГ (3,0 кг/га); Бордо Ізагро 20, з.п. (5 кг/га) або Купроксат, КС (5,0 л/га)</p> <p>+ фунгіцидами на основі сірки, одним із: Кумулус ДФ, в.г. (6 кг/га), Товіт Джет 80 WG, в.г. (8 кг/га) або фунгіцидами, що діють при низьких температурах навколишнього повітря, одним із: Скала 400 SC, КС (0,75—1,2 л/га), Хорус 75 WG, ВГ (0,2—0,25 кг/га), Терсел, в.г. (2,0—2,5 кг/га)</p> <p>+ акарицидами, одним із: Ніссоран, ЗП (0,3—0,6 кг/га), Енвідор SC, КС (0,4—0,6 л/га), Демітан 200, КС (0,6 л/га), Вертимек 018 EC, KE (1,0—1,5 л/га)</p> <p>+ регулятором росту рослин Атонік Плюс, ВР (0,2 л/га)</p>	
<p>Фаза «цвітіння» дерев (початок травня)</p>		<p>Бронзівки (у т.ч. оленка волохата) та інші шкідники (садові трубокверти та довгоносики, яблунева медяниця, яблуневий плодовий трач, цикадові та листогризучі види (розована листовійка, горностаєва міль, білан жилкуватий і непарний шовкопряд, мінуучі молі, золототуз, зимовий п'ядун, п'ядун-обдирало плодовий) при досягненні їх ЕПШ</p> <p>+ парша, бура плямистість листя (філостиктоз), борошниста роса, хвороби зберігання (плодова гниль, альтернаріоз, фузаріозна гниль та антракноз)</p> <p>Примітка: проти бур'янів вносити гербіцид способом спрямованого обприскування за їх висоти 10—15 см (залежно від видового складу)</p>	<p>Використовують фунгіциди за тривалих опадів (впродовж 10—15 днів) і відносно вологості повітря понад 80%. Інсектициди застосовують при досягненні шкідниками ЕПШ (викладено вище).</p> <p>Обприскування дерев сумішами препаратів: інсектицидами, одним із: Капіско, 480 SC, КС (0,25—0,3 л/га), Моспілан, ВП (0,2 кг/га), Маврік, ВЕ (0,4 л/га)</p> <p>+ фунгіцидами: Скор 250 EC, к.е. (0,2 л/га) або Оріус 250, в.е. (0,5—0,6 л/га) з додаванням Топаз 100 EC, к.е. (0,3—0,4 л/га). За перших ознак прояву ураження насаджень бактеріальним опіком (і ще двічі впродовж вегетації) використовують біологічний бактерицид та фунгіцид лікувальної дії Казумін 2Л, РК (3,0—4,0 л/га).</p> <p>Одним із: Агіл 100, KE (0,6—1,2 л/га), Басти 150 SL, РК (2,5—3,0 л/га), Гліфоган 480, в.р. (2,0—8,0 л/га), Гліфос 360, в.р. (3,0—10,0 л/га), Гліфос Супер, в.р. (1,6—6,4 л/га), Голан 2E, KE (4,0—5,0 л/га), Домініатор 360, РК (2,0—8,0 л/га), Домініатор Мега, в.р. (1,5—6,0 л/га), Зумер, к.с. (2,0—3,0 л/га), Зенкор Ліквід SC, КС (0,7—1,0 л/га), Клінік Макс, в.р.к. (1,5—4,0 л/га), Люмакс 537,5 SE, с.е. (3,5—4,0 л/га), Раундап Макс, в.р. (3,2—6,0 л/га), Ураган Форте 500 SL, РК (2,0—4,0 л/га), Шорун 100, к.е. (0,6—1,2 л/га)</p>	