


від Яновського Ю.П. для вашого яблуневого саду

<p>Відразу після закінчення цвітіння насаджень</p>		<p>Парша, буре плямистість листя (філоستیктоз), борошниста роса, плодова гниль</p>	<p>Обприскування дерев препаратами з групи фунгіцидів: контактних проти парші, борошністості, плямистісті, філоستیктозу, плодової гнилі — Малвін, ВГ (1,8—2,5 кг/га), Мерпан 80, ВГ (1,9—2,5 кг/га), Акіра, КС (2,5—3,0 л/га), Антракол 70 WP, з.п. (1,5 кг/га), Вентол 350 SC, КС (2,0 л/га), Делан, в.г. (0,5—1,0 кг/га), Дтан М-45, ЗП (2,0—3,0 кг/га), Мерпан 50, з.п. (3 кг/га), Полірам ДФ, в.г. (2,5 кг/га), Пенкоцеб, ЗП (2,0 кг/га); проти борошнистості роси — з додаванням препаратів Сапроль, к.е. (1,0—1,5 л/га), Топаз 100 ЕС, к.е. (0,3—0,4 л/га) чи препаратів на основі сірки — Кумулос ДФ, в.г. (6 кг/га) або Тівіт Джет 80 WG, в.г. (8 кг/га); проти комплексу збудників цих хвороб — контактно-системних Шавіт Ф 72, ВГ (2,0 кг/га), Топсін-М, ЗП (1,0—2,0 кг/га), Сакура, КС (2,5—3,0 л/га), Малахіт, КС (1,25—1,5 л/га), Хорус 75 WG, ВГ (0,2—0,25 кг/га), Топсін-М 500, КС (1,4—1,6 л/га), препаратів мезостемно-системної дії — Натіво 75 WG, ВГ (0,3—0,35 кг/га), Белліс, ВГ (0,8 кг/га), Флінт Стар 52 SC, КС (0,4—0,5 л/га); трансламлярної дії — Строби, в.г. (0,2 кг/га), Флінт 500 WG, ВГ (0,15 кг/га); трансімлітарно-контактної дії — Терсел, в.г. (2,0—2,5 кг/га), Ардегт, КС (0,2 л/га), Луна Експіренс 400 SC, КС (0,50—0,75 л/га).</p>	<p>—</p>
<p>Регуляція росту: вкорочення пагонів та утворення меншої кількості неплодоносних пагонів, поліпшення утворення зав'язі в проміслових насадженнях яблуні, підвищення їх врожайності</p>	<p>Яблунева та східна плодожерки і покоління, листомінуючі молі, кліщі, попелиці, розанова цикадка, горбатка-буйвол, зелена цикадка, червиця в'длива, листовійки</p>	<p>Регаліс, ВГ (дворазове застосування); обробка, (1,25 кг/га) — початок росту однорічних пагонів, 2—5 см завдовжки), II обробка (1,25 кг/га) — «друга хвиля приросту однорічних пагонів» (через 3—6 тижнів після попередньої обробки)</p>	<p>У разі відлову феромонною пасткою не менше 5 метеликів яблуневої плодожерки за 7 днів спостережень; 20% пошкодження листкової поверхні листогризучими видами; 10—15 личинок цикадок/листок; 5—10 личинок попелиць/листок; 8—10 личинок кліщів/листок</p>	
<p>Утворення «зав'язі — змикання чашолистків у плодів» (травень — початок червня) та за показниками феромонних пасток</p>	<p>Яблунева та східна плодожерки і покоління, листомінуючі молі, кліщі, попелиці, розанова цикадка, горбатка-буйвол, зелена цикадка, червиця в'длива, листовійки</p>	<p>Обприскування насаджень: проти лускокрилих видів (на початку масової яйцекладки особинами шкідників) препаратами — Коратен 20, КС (0,15—0,175 л/га), Волам Флексі 300 SC, КС (0,3—0,5 л/га), Дімілін, з.п. (0,6 кг/га), Люфокс 105 ЕС, к.е. (1,0 л/га), Номолт, к.с. (0,5—0,7 л/га), Рімон 10, к.е. (0,6 л/га), Адмірал, к.е. (0,6—0,8 л/га); проти гусениць цих видів і попелиць та цикадок — Каліпсо 480 SC, КС (0,25 л/га), Балазо 100, КЕ (0,4—0,5 л/га), Моспілан, ВП (0,15—0,2 кг/га), Талстар 10%, КЕ (0,4—0,6 л/га), Маврік, ВЕ (0,2—0,6 л/га), Цезар, к.е. (0,5 л/га). Проти кров'яної попелиці в цей період вегетації та пізніше в проміслових багаторічних насадженнях (з додаванням ад'юванта Сильвет Голд, 0,25 л/га) слід застосовувати: 1. ФОС (фосфорорганічні сполуки): Бі-58 Новий, к.е. (2,0 л/га); Дурсбан 480, к.е. (2,0 л/га); Пірінекс 480, КЕ (2,0 л/га); Пірінекс Сулер 420, к.е. (1,5 л/га); Сумітлон, к.е. (3,0 л/га). 2. Піретроїди: Балазо 100, КЕ (0,5 л/га); Маврік, ВЕ (0,6 л/га); Цезар, к.е. (0,5 л/га); Талстар 10%, КЕ (0,6 л/га). 3. Неонікотиноїди: Актара 240 SC, к.с. (0,15 л/га); Актара 25WG, в.г. (0,14 кг/га); Дантол 50, ВГ (0,07 кг/га); Каліпсо 480 SC, КС (0,3 л/га); Конфідор 200 SL, РК (0,25 л/га); Моспілан, ВП (0,2 л/га); Нуптрід 200, КС (0,25 л/га), Колігнор 200 SL, РК (0,25 л/га).</p>	<p>Аплауд, з.п. (2,0—2,4 кг/га), Адмірал, к.е. (0,6—0,8 л/га) чи Моспілан, ВП (0,4—0,5 кг/га)</p>	
<p>Через 15—20 днів після попереднього обприскування, але не раніше втрати токсичності пестицидами після попереднього обприскування</p>	<p>Яблунева і східна плодожерки і покоління та інші листовійки, молі, кліщі, попелиці, щитівки, парша, філоستیктоз, плодова гниль, борошниста роса, бур'яни</p>	<p>Один з вище згаданих фунгіцидів чи їх сумішей (враховуючи тривалість їх дії, але не раніше втрати їх токсичності після попереднього обприскування). Див. в табл. «Відразу після закінчення цвітіння насаджень»</p>	<p>—</p>	

Захист інших культур у цей період вегетації викладено у книзі «Інтегрований захист плодових культур» Яновський Ю.П., Кравець Г.С., Крикунов І.В. та ін., 2015 р. (для придбання книги телефонуйте: 050-167-11-54)