



КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

УДК: 617.557–007.43–006

ПАХОВАЯ ГРЫЖА С УЩЕМЛЕНИЕМ МАТКИ, ПРАВОГО ЯИЧНИКА И МАТОЧНОЙ ТРУБЫ

Ю. Г. Кадышев

10—я городская клиническая больница, г. Одесса

INGUINAL HERNIA STRANGULATION OF UTERUS, RIGHT OVARIUM AND FALLOPIAN TUBE

Yu. G. Kadyshev

The 10—th Municipal Clinical Hospital, Odessa

Ущемленная грыжа является частым острым заболеванием, требующим экстренного оперативного лечения [1]. Приводим описание редкого наблюдения ущемленной паховой грыжи.

Больная К., 75 лет, госпитализирована с диагнозом: ущемленная правосторонняя паховая грыжа. Со слов больной, 12 часов тому, после подъема тяжести возникли боль и грыжевое выпячивание в правой паховой области. Были тошнота, однократно рвота. Длительность существования паховой грыжи 5 лет.

При осмотре состояние больной средней тяжести. Язык сухой, обложен белым налетом. Пульс 90 в мин, удовлетворительных свойств. АД 18,7/10,7 кПа (140/80 мм рт. ст.). В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Живот мягкий, болезненный в правой паховой области. Симптомов раздражения брюшины нет. В правой паховой области имеется грыжевое выпячивание диаметром 6 см, плотное на ощупь, болезненное. Содержимое грыжевого мешка в брюшную полость не вправляется. Кашлевой толчок не проводится.

Пациентка осмотрена хирургом, терапевтом, гинекологом, патологические изменения не выявлены. Проведены: ЭКГ, рентгенография грудной клетки и брюшной полости, общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ печеночных проб, коагулограмма, определены

группа крови, Rh—фактор. После кратковременной предоперационной подготовки больная оперирована.

Проведена спинномозговая анестезия.

После обработки операционного поля йодобаксом трижды и спиртом над грыжевым выпячиванием произведен разрез длиной до 8 см. Тупо — остро выделен и вскрыт грыжевой мешок. Выделилось до 100 мл грыжевой воды светло—желтой окраски, без запаха. Ущемлены матка, правый яичник и правая маточная труба. Рассечено ущемляющее кольцо. Ущемленные органы жизнеспособны, погружены в брюшную полость. Грыжевой мешок прошит у шейки, перевязан и отсечен. Осуществлена пластика по Бассини.

Течение послеоперационного периода без осложнений. Проведена антибактериальная терапия (сульбактамс). Рана зажила первичным натяжением. Пациентка выписана в удовлетворительном состоянии. Осмотрена через 1 мес, здорова.

Заключительный диагноз: правосторонняя паховая грыжа с ущемлением матки, правого яичника и правой маточной трубы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Неотложная хирургия: руководство для хирургов общей практики / В. Х. Грасиас, П. М. Рейли, М. Г. Маккенни, Д. С. Велмэхос. — М.: Медицина, 2010. — 306 с.

