

## ЕСПА-ЛІПОН<sup>®</sup> ІН'ЄКЦІЇ 600, ЕСПА-ЛІПОН<sup>®</sup> ТАБЛЕТКИ 600

### Інформація для медичних та фармацевтичних працівників

Р.П. № UA/4179/01/02, UA/4179/02/02.

**Склад:** 1 ампула препарату містить відповідно 755 мг етилендіамінової солі тіоктової кислоти та 600 мг тіоктової кислоти.

**Заявник:** Еспарма ГмбХ, Німеччина.

**Виробник:** Хамельн Фармасьютикалз ГмбХ, Німеччина. Фарма Вернігероде ГмбХ, Німеччина.

**Фармакотерапевтична група:** засоби, що впливають на травну систему і метаболічні процеси.

**Показання до застосування:** порушення чутливості при діабетичній полінейропатії.

**Протипоказання:** підвищена чутливість до одного з компонентів препарату та інші.

**Побічні ефекти:** можлива гіпоглікемія внаслідок покращення утилізації глюкози. При швидкій внутріш-

ньовенній ін'єкції можливі: відчуття тяжкості у голові, головний біль, підвищення внутрішньочерепного тиску, припливи, утруднене дихання, тромбоцитопатія, гіпокоагуляція, тромбоз, іноді — нудота, блювання. У більшості випадків усі вказані прояви минають самостійно. У пацієнтів із підвищеною чутливістю до тіоктової кислоти можливі алергічні реакції. При застосуванні таблеток: дуже рідко — нудота, блювання, біль у животі, діарея; зниження рівня цукру в крові, алергічні реакції, такі як шкірні висипання, кропив'янка, свербіж та інші.

**Повна інформація про лікарський засіб міститься в інструкції для медичного застосування.**

**Представництво в Україні:** 02002, м. Київ, вул. Р. Окіпної, 117. info@esparma.com.ua