

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ МЕЛОКСИКАМ-РАТІОФАРМ® (MELOXICAM-RATIOPHARM®)

Склад: діюча речовина: мелоксикам;
1 ампула (1,5 мл) містить мелоксикаму
15 мг.

Лікарська форма. Розчин для ін'єкцій.

Фармакотерапевтична група. Нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби. Оксиками. Код АТС M01A C06.

Показання.

Початкове та симптоматичне короткотривале лікування:

- ревматоїдного артрити;
- болю при остеоартритах (артрози, дегенеративні захворювання суглобів);
- анкілозивного спондиліту.

Протипоказання.

Гіперчутливість до компонентів препарату або до препаратів з подібною дією, наприклад інші нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП), включаючи ацетилсаліцилову кислоту. Протипоказаний пацієнтам, у яких після застосування ацетилсаліцилової кислоти або інших НПЗП спостерігаються ознаки астми, носові поліпи, ангіоневротичні набряки або кропив'янка, та пацієнтам, які приймають антикоагулянти, через можливе виникнення внутрішньом'язової гематоми. Активна форма або нещодавня поява виразки травного тракту/перфорації.

Побічні реакції.

Порушення з боку системи крові та лімфатичної системи.

Часто: анемія.

Нечасто: зміни картини крові — зменшення тромбоцитів (тромбоцитопенія), зменшення

лейкоцитів до повного їх зникнення (лейкоцитопенія, агранулоцитоз).

Порушення з боку імунної системи.

Рідко: анафілактичний шок, анафілактичні/анафілактоїдні реакції та інші алергічні реакції негайного типу.

Передозування.

Симптоми гострого передозування НПЗП часто супроводжуються апатією, сонливістю, нудотою, блюванням та болем у шлунку, що, як правило, усуваються підтримуючими заходами. Також можуть виникати шлунково-кишкові кровотечі. Гостре отруєння може призвести до підвищення артеріального тиску, гострої ниркової недостатності, порушень функції печінки, пригнічення дихання, коми, судом, серцево-судинного колапсу та зупинки серця.

Повідомлялося про анафілактоїдні реакції під час прийому терапевтичних доз НПЗП, також вони можуть виникати і при передозуванні.

Після передозування НПЗП пацієнтам необхідно пройти курс симптоматичного та підтримуючого лікування відповідно до ступеня тяжкості передозування та інтоксикації. Під час клінічних досліджень було виявлено, що триразовий прийом 4 г холестеріаміну перорально прискорює виведення мелоксикаму.

Упаковка. 5 ампул по 1,5 мл у пластиковому контейнері в картонній коробці.

Виробник. Хелп С.А.

Місцезнаходження. Педіні Іоаннінон, Іоанніна, 45501, Греція. □