

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА НЕЙРОРУБИН™-ФОРТЕ ЛАКТАБ (NEURORUBINE™-FORTE LACTAB)

Состав лекарственного средства:

действующие вещества: 1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит тиамин нитрата (витамин В₁) 200 мг, пиридоксина гидрохлорида (витамин В₆) 50 мг, цианокобаламина (витамин В₁₂) 1 мг.

Лекарственная форма. Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Таблетки круглой двояковыпуклой формы, розового цвета, покрытые пленочной оболочкой, с оттиском «ТР» с одной стороны.

Название и местонахождение производителя.

Мефа ЛЛС, Дорнахерштрассе 114, СН-4147 Эш-Базель, Швейцария.

Фармакотерапевтическая группа. Препараты витамина В₁ в комбинации с витамином В₆ и/или В₁₂. Код АТС А11D В.

Показания к применению.

Сопутствующая терапия при невротических болях:

- невралгия;
- невротические боли при острых или хронических невритах и полиневритах;
- токсические поражения нервной ткани при алкоголизме, диабетической полинейропатии, интоксикации лекарственными препаратами.

Противопоказания.

Известная гиперчувствительность к витаминам В₁, В₆ и В₁₂.

Витамин В₁ противопоказано применять при аллергических заболеваниях.

Витамин В₆ противопоказано применять при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения.

Витамин В₁₂ противопоказан при эритремии, эритроцитозе, тромбозам, псориазе, потому что у больных псориазом может развиваться так называемая «реакция вспышки» на витамин В₁₂, которая проявляется ухудшением симптомов заболевания.

Побочные эффекты.

Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, анафилактический шок, анафилаксия. Аллергические реакции встречаются достаточно редко.

Со стороны эндокринной системы: ингибируется выделение пролактина.

Со стороны нервной системы: ощущение беспокойства, нервное возбуждение, головная боль.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, коллапс.

Со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения: цианоз, отек легких.

Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, диарея, боль в животе, повышение кислотности желудочного сока.

Со стороны печени и желчного пузыря: при применении в высоких дозах повышение уровня глутаминощавелевоуксусной трансаминазы (SGOT) в сыворотке крови.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: кожные высыпания, ощущение зуда, крапивница.

Другие расстройства: потливость, ощущение слабости, головокружение, недомогание.

Упаковка.

По 10 таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в блистере, по 2 блистера в картонной коробке.

Категория отпуска. Без рецепта. □