УДК 616.348.002.44:616.345-072.1-053

Ю.М. Степанов,
О.В. Сімонова

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕНДОСКОПІЧНОЇ КАРТИНИ ТОВСТОЇ КИШКИ У ХВОРИХ НА НЕСПЕЦИФІЧНИЙ ВИРАЗКОВИЙ КОЛІТ ЗАЛЕЖНО ВІД ГЕНДЕРНИХ І ВІКОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»,
пр. Слобожанський, 96, Дніпро, 49074, Україна

Мета роботи – вивчення ендоскопічної картини слизової оболонки (СО) товстої кишки (ТК) у хворих на неспецифічний виразковий коліт (НВК) залежно від гендерних і вікових особливостей.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Ендоскопічне дослідження ТК проведено в 26 хворих на НВК, з них 14 жінок і 12 чоловіків, 19 – молодого (18-44 роки) і 7 – середнього віку (45-59 років).

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

При ендоскопічному дослідженні у всіх хворих виявлено типові ознаки захворювання у фазі загострення з різним ступенем активності (еритема, стертість судинного рисунка, геморагії, ерозії, виразки, псевдополіпи, контактна кровоточивість). Практично в половини пацієнтів (57,7%) виявлено ураження лівих відділів ТК, субтотальне й тотальне ураження спостерігалось у 30,8% хворих, ураження тільки прямої кишки – в 11,5%. При аналізі ендоскопічних ознак залежно від статі було виявлено, що частота лівобічного й тотального ураження НВК у жінок і чоловіків була практично однаковою, у той час, як частота виразкового проктиту мала тенденцію до збільшення в жінок ($p>0,05$). Частота основних ендоскопічних ознак виразкового коліту, таких як гіперемія, набряк, зернистий рельєф СО, стертість судинного рисунка, наявність геморагій, дефектів (ерозій, виразок), суттєво не відрізнялась, але псевдополіпи в чоловіків було виявлено втричі частіше, ніж у жінок ($p>0,05$). Незважаючи на те, що частота кровоточивості СО ТК суттєво не відрізнялась, у жінок мала місце тенденція до збільшення частоти максимального ступеня цієї ознаки ($p>0,05$), у той час, як у чоловіків суттєво вищою була частота мінімального ступеня кровоточивості ($p<0,05$). Базуючись на цих даних, у жінок переважала частота вираженої ендоскопічної активності НВК ($p>0,05$), у чоловіків – помірний ступінь ($p<0,05$). Вивчення ендоскопічної картини хворих на НВК залежно від віку не виявило суттєвих розбіжностей.

ПІДСУМОК

Таким чином, у хворих на НВК жіночої статі виявлено тенденцію до збільшення частоти максимального ступеня кровоточивості СО ТК, що призвело і до збільшення частоти вираженої активності НВК, у хворих чоловічої статі мала місце тенденція до збільшення частоти псевдополіпів; суттєвих розбіжностей частоти ендоскопічних ознак залежно від віку не виявлено.