

УДК 595.34 (262.5)

ВЕСЛОНОГИЕ РАКИ (CRUSTACEA:COPEPODA) НИЗОВЬЯ РУСЛА РЕКИ ЧЕРНАЯ И ЭСТУАРНОЙ ЗОНЫ СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ БУХТЫ

Шмелева А.А., Щербань С.А., Щербатенко Л.С.

Веслоногие раки (Crustacea:Copepoda) низовья русла реки Черная и эстuarной зоны Севастопольской бухты.- А.А. Шмелева, С.А. Щербань, Л.С. Щербатенко - Представлены результаты сезонных исследований таксономического состава веслоногих раков (Copepoda), проведенных в 2005-2007гг. в низовье русла реки Черная, впадающей в Севастопольскую бухту и ее эстuarной зоне. Обнаружено 46 таксономических форм, из которых 19 чужеродных средиземноморского происхождения. Наибольшее количество морских поли- и эвригалинных видов (25 таксономических форм) отмечено в диапазоне солености 5.8 – 19,0%, 5 – в диапазоне солености 3.0 – 3.9%. Обсуждаются возможные причины нахождения чужеродных видов веслоногих раков в русле реки Черная и ее эстuarной зоне.

Ключевые слова: веслоногие раки, средиземноморские чужеродные виды, русло реки Черная, эстуарий реки Черная, Севастопольская бухта, Черное море.

Адресс: Институт биологии южных морей НАН Украины, Севастополь 99011, пр. Нахимова, 2, Украина, e-mail: shcherbans@mail.ru

Copepod species in the lower reach of river Chernaya and estuarine zone of Sevastopol Bay.- A.A. Shmeleva, S.A. Shcherban, L.S. Shcherbatenko - Results of the Copepoda taxonomical composition seasonal studies, carried out in 2005-2007 in the lower reach of river Chernaya and her estuarine zone, which falls into the Sevastopol Bay have been represented. 46 taxonomical forms, including 19 alien forms of Mediterranean origin were discovered. The greatest number of marine poly- and euhaline species (25 taxonomical forms) were registered at the salinity range of 5,8 – 19,0% and 5 at the range of 3,0 – 3,9%. Possible reasons of appearance of alien Mediterranean origin in river estuarine of Sevastopol Bay are under consideration.

Key words: copepod species, alien forms of Mediterranean origin, lower reach, estuarine of river Chernaya, Sevastopol Bay, Black Sea.

Address: Institute of Biology of the Southern Seas, Nakhimov ave. 2, 99011 Sevastopol, Ukraine; e-mail: shcherbans@mail.ru

Вступление

Исследования веслоногих ракообразных приустьевых акваторий и речных дельт имеют огромное значение, поскольку эти зоны нередко становятся инкубатором молоди многих видов беспозвоночных и рыб, местом их нагула и нереста. Вынос органического вещества с речными водами обогащает эстуарную зону биогенными элементами и способствует интенсивному развитию фитопланктона. С другой стороны, именно эта зона подвергается наиболее активному воздействию человека, приводящему к обеднению разнообразия и даже катастрофическому разрушению сложившихся фаунистических сообществ, в результате чего освободившиеся экологические ниши заполняются вселенцами. Таким образом, приустьевые акватории и речные дельты, т. е. граница “река–море” могут являться одной из “горячих точек”

для интродукции чужеродных видов, поэтому изучение разнообразия планктонных беспозвоночных в этих зонах крайне важно.

Исследования фауны приустьевой зоны реки Черной начаты в первой половине ХХ в. Обнаружены мшанки, гидроиды, несколько видов веслоногих раков, а также новая для Черного моря циклопоидная копепода *Oithona similes* Claus, 1866 [8]. После огромного временного перерыва комплексные фаунистические исследования беспозвоночных были возобновлены в 2004-2007 гг. [5,13]. Получены характеристики видового состава голо-, меропланктона и бентопланкtonных животных: амфипод, равноногих раков и мизид [13].

В настоящей статье представлены результаты исследований таксономического состава копепод, найденных в акваториальной зоне Севасто-

польской бухте и в опресненных участках низовья русла реки Черная, впадающей в бухту.

Материал и методы

Река Черная является вершиной Севастопольской бухты. Длина реки 41 км, площадь водосбора 436 км² [9]. При площасти Севастопольской бухты 7.96 км² величина удельного водосбора составляет 55 км², что проявляется в опреснении верховья бухты, выносе с речным стоком аллохтонных органических и минеральных веществ, в том числе биогенных. Как и другие реки Западного Крыма, река Черная относится к типу рек с паводковым режимом. Основная часть стока (до 80%) приходится на зимний и весенний периоды.

Пробы зоопланктона собирали в разные сезоны 2005–2007 гг. на двух станциях, расположенных по руслу реки Черная на расстоянии 400 м (станция 1) и 900 м (станция 2) от места впадения в Севастопольскую бухту в диапазоне солености 3,0–15,5‰. (рис. 1). Облавливали слой воды 0–8 м. Станция 2 мелководная, в отличие от станции 1 (обловленный слой до 1,5 м). Пробы в эстuarной зоне бухты брались в одной точке, расположенной в 500 м от станции 1, при солености 9,2–19,0‰ (станция 3). Для более точного учета поверхностного распределения копепод и копеподидных стадий с поверхности исследуемого участка брались горизонтальные ловы. Материал отбирали сетью “Малая Джеди” с диаметром входного отверстия 36 см и фильтрующим конусом из газа № 49 (диаметр ячей капронового сита 135 мкм). Выловленный зоопланктон фиксировали раствором формалина до конечной концентрации 4% и обрабатывали в лабораторных условиях по стандартной методике с использованием штемпель-пипетки и бинокулярного микроскопа МБС-1. Учитывали все возрастные стадии веслоногих раков. Объем материала, сроки отбора проб и основные гидрологические характеристики приведены в таблице 1.

Результаты

За период исследования в приустьевой зоне р. Черная идентифицировано 46 таксономических форм веслоногих раков, из которых 19 чужеродных средиземноморского происхождения [19]. Отмечено большое количество (25 видов) морских поли- и эвригалинных форм веслоногих раков, не свойственных опресненным водам (табл. 2). Эти виды встречались в основном на станции 1 и были случайными, т.е. отмечены в единичных экземплярах в разные сезоны года. Динамика наиболее часто встречаемых видов ($\geq 20\%$ случаев обнаружения) и массовых ($\geq 80\%$ случаев обнаружения), найденных в диапазоне солености 5,8–15,5 ‰, представлена в таблице 3. К

массовым видам можно отнести 3 вида таксона Cyclopoida: *Oithona nana* Giesbr., 1892, *Oithona brevicornis* Giesbr., 1891, *Cyclopina* sp.; 8 видов таксона Calanoida, из которых *Acartia tonsa* Dana, 1849, *Acartia mollicula* Shmel., 2008, *Acartia clausi* Giesbr., 1889, и *Acartia lamasii* Shmel., Selif., 2005 встречались повсеместно при солености от 5,8 до 15,5 ‰, и 1 таксон Poecilostomatoida (*Saphirella* sp.). Последний вид оказался обычным в большинстве проб, взятых не только по руслу реки, но и в ее эстuarной части и Севастопольской бухте [7;13]. На уровне субдоминант развивались *Centropages spinosus* Kricz, 1873, виды рода *Paracalanus*, *O. decipiens* Farran, 1913, среди которых циклопоидная копепода *O. decipiens* отмечена в заметных количествах только в весенний период. Наибольшее количество таксономических форм веслоногих раков (35) обнаружено на ст. 1. В воде с очень низкой соленостью 2,9 – 3,9 ‰ (ст. 2) было найдено только 6 таксономических форм копепод – *Acartia tonsa*, *A. lamasii*, *A. sp. nov. 1*, *Paracalanus* sp., виды рода *Oithona* и единичные экземпляры *Saphirella* sp. Огромное количество мелких форм рода *Oithona* отмечено осенью при температуре воды 9,8°C в зоне наибольшего распреснения (3,0 ‰) в верхнем русле реки (ст. 2). Здесь отсутствовали морские полигалинные виды рода *Paracalanus* – *P. indicus* Wolfenden, 1905, *P. quasimodo* Bowman, 1971 и *P. parvus* Claus, 1863.

Обсуждение

Итак, в результате мониторинговых исследований эстuarной части бухты установлено 35 видов копепод (диапазон солености от 9,2 до 19‰), по руслу реки – 46 (диапазон солености 5,8 – 15,5‰); из них 21 вид можно отнести к доминантным. По данным Загородней Ю.С. [3] в прибрежных водах Крыма несколько ранее было найдено всего 24 вида. По данным других авторов, в акватории Севастопольской бухты по состоянию на 2009 год, за весь предыдущий период исследований видового состава копепод, отмечен 131 вид, значительная часть из которых средиземноморского происхождения [12;14]. Основное число видов, найденных здесь, относится к категории единичных и редковстречаемых (50,9% и 38,2%), рис. 2 А. Однако, как следует из результатов данной работы, эстuarная зона характеризуется наличием гораздо меньшего количества видов (35), среди которых преобладают частовстречаемые и редкие виды (51,4% и 31,6%), рис. 2 Б. По данным этих же авторов, в период с 2004 по 2007 гг., из 35 видов – 18 являлись доминирующими (массовые плюс частовстречаемые). В их состав входили как круглогодичные, так и тепло- и холодолюбивые формы.

Таблица 1. Местоположение, сроки и гидрологические параметры района отбора проб**Tabl. 1.** Characteristics of sampling station

Станции	Дата взятия пробы	Количество видов	Температура воды, С°	Соленость, %
3	28.01.05	20	6.7	12.2
3	19.02.05	29	7.1	13.3
3	03.03.05	6	6.2	13.5
3	28.03.05	14	7.0	16.8
3	06.04.05	10	7.8	15.0
3	14.04.05	12	9.2	15.6
3	14.06.05	30	21.4	17.0
1	28.06.05	6	20.1	—
3	28.06.05	16	20.2	—
1	18.07.05	8	24.0	10.1
2	18.07.05	5	16.0	3.6
3	18.07.05	18	24.0	10.1
1	28.07.05	6	17.4	15.5
1	30.08.05	9	24.2	8.5
2	30.08.05	6	21.5	3.2
3	30.08.05	28	24.0	10.1
1	22.09.05	9	22.0	12.5
3	27.09.05	18	25.1	19.0
1	05.10.05	8	17.1	9.5
3	05.10.05	16	24	17.4
1	04.11.05	10	15.0	5.8
3	04.11.05	35	15.0	13.9
3	07.11.05	10	7.7	18.5
2	13.11.05	7	14.0	3.9
3	13.11.05	17	14	10.0
1	27.11.05	3	10.5	10.0
2	27.11.05	6	9.8	3.0
3	27.11.05	9	—	10.0
3	14.12.05	7	9	13.2
1	16.12.05	9	8.1	6.6
3	28.01.05	10	0	18.3
3	20.02.05	13	4	18.5
1	25.02.06	10	4.3	7.2
1	20.03.06	9	4.0	5.9
3	20.03.06	12	—	15.1
3	02.04.06	8	6.8	13.0
3	11.04.06	9	7.3	13.1
3	30.04.06	4	11.0	—
1	27.05.06	9	16.0	7.6
2	27.05.06	0	12.3	3.1
3	27.05.06	12	14.0	14.0
1	13.08.06	5	24.0	10.1
1	17.09.06	11	20.2	—
1	06.10.06	7	18.3	—
1	22.10.06	11	17.0	5.8
1	12.11.06	6	—	—
1	09.01.07	9	—	—
1	29.04.07	7	15.0	13.9

Примечание: 1,2, 3 – станции; « – » – отсутствие данных




Рис. 1. Карта-схема станций отбора проб в районе исследования

Fig. 1. Map of sampling station in investigation region

Таблица 2. Случайные виды веслоногих раков русла реки Черная

Tabl. 2. Rare copepod species of lower reach of Chernaya river.

Таксон	Пол (кол-во)	Размер, мм
CALANOIDA		
Acartiidae		
<i>Acartia ioannae</i> Shmel., 2008	♀ (1)	0.92
<i>Acartia discaudata</i> Steuer, 1929	♀ (1)	0.90
<i>Acartia</i> sp. nov. 1	♀ (1)	1.15 тонкая, с торакальными шипами
<i>Acartia</i> sp. nov. 2	♀ (1)	1.05 с торакальными шипами
<i>Acartia</i> sp. nov. 3	♀ (1)	1.17 с малыми шипами
Heterorhabdidae		
<i>Lucicutia flavigornis</i> Claus, 1863	♀ (1) ♂ (2)	1.62; 1.37
Paracalanidae		
<i>Acrocalanus</i> sp.	♀ (1)	1.30
<i>Calocalanus tenuis</i> Farran, 1926	♀ (1)	1.20
<i>Calocalanus pavoninus</i> Farran, 1936	(1)	0.80
<i>Paracalanus</i> sp.	♀ (1) ♂ (1)	1.17; 0.98
Ctenocalanidae		
<i>Ctenocalanus vanus</i> Giesbr., 1888	(1)	0.95
<i>Ctenocalanus</i> sp.	♀ (1)	1.05
Centropagidae		
<i>Centropages furcatus</i> Dana, 1849	♀ (1) ♂ (1)	1.5; 1.30
CYCLOPOIDA		
Corycaeidae		
<i>Corycaes clausi</i> Dahl., 1894	♀ (2)	1.30
<i>Corycaes</i> sp.	♂ (1)	1.30
<i>Farranula</i> sp.	♀ (1)	0.90
Oithonidae		
<i>Oithona vivida</i> Farran, 1913	♀ (1)	0.80
<i>Oithona tenuis</i> Rosendorn	♀ (1)	0.95
Oncaeidae		
<i>Oncaeaa dentipes</i> Giesbr., 1891	♀ (1)	0.60
<i>Oncaeaa media</i> Giesbr., 1892	♀ (2)	0.62
<i>Oncaeaa vodjanitskii</i> Shmel. et Delalo, 1965	(1)	
<i>Oncaeaa</i> sp. nov. 1	♂ (1)	0.87
<i>Oncaeaa</i> sp. nov. 2	♂ (2)	0.42
HARPACTICOIDA		
Ectinosomatidae		
<i>Microsetella rosea</i> Dana, 1847	(1)2	0.80
<i>Microsetella norvegica</i> Boeck, 1864	(2)2	0.60

Таблица 3. Динамика сезонной встречаемости доминирующих видов веслоногих раков на станциях по руслу реки Черная и эстuarной зоне бухты

Tabl. 3. The dynamic of season of dominant copepod species on stations of lower reach of river Chernaya and her estuarine zone

Таксон	зима	весна	лето	осень
CALANOIDA				
Acartiidae				
Acartia tonsa Dana,1849	+	+	+	+
A. mollicula Shmel.,2008	+	+	+	+
A. clausi Giesbr.,1889	+	+	+	+
A. eremeevi Pavl., Shmel.,2008	-	-	+	+
A. hasanii Shmel., Selif.,2005	+	-	-	+
A. lamasii Shmel., Selif.,2005	+	+	+	+
Calanidae				
Calanus euxinus Fleminger,1991	+	-	-	+
Pseudocalanidae				
Pseudocalanus elongatus Boeck,1865	+	+	-	+
Paracalanidae				
Paracalanus parvus Claus,1863	+	+	-	+
P. indicus Wolfenden,1905	+	+	-	+
P. quasimodo Bowman,1971	+	+	-	+
Centropagidae				
Centropages kroyeri Giesbr.,1892	-	+	+	+
C. spinosus Kricz,1873	-	+	+	+
CYCLOPOIDA				
Cyclopinidae				
Cyclopina sp.	+	+	+	+
C. gracilis Claus,1863	+	+	+	-
Oithonidae				
Oithona nana Giesbr. ,1892	+	+	+	+
O. similis Claus,1866	+	+	-	+
O. decipiens Farran,1973	-	+	-	-
O. brevicornis Giesbr.,1891	+	+	+	+
Oithona sp.	-	-	-	+
Ectinosomatidae				
Saphirella sp.	+	+	+	+

Примечание Вид: «+» - присутствует, «-» - отсутствует




Рис. 2. Соотношение видового разнообразия Сорерода в изучаемых районах: А- акватория Севастопольской бухты, 131 вид, Б- в эстуарной зоне Севастопольской бухты,35 видов, С- в низовье русла реки Черная, 46 видов

Fig.2. Ratio of copepod species diversity: A – in Sevastopol Bay,131 sp., B- in estuarine zone, 35 sp., C-in of lower reach of Chernay river,46 sp.

М- массовые , Ч- частовстречаемые, Р- редкие, Е – единичные
M- abundant, Ч- frequently encountered, P- rare, E- solitary

Все они, как оказалось, типичные и для низовья русла реки, где видовой состав веслоногих раков оказался гораздо богаче и включал, в общей сложности, 46 таксономических форм. Высокий процент здесь составляли единичные таксономические формы – 35,6% и частовстречаемые – 44,4%. В количественном отношении – это 25 видов (рис. 2 С). К доминирующему видам данного района можно отнести 21 вид (табл. 3).

Веслоногие раки регулярно проникают с нижнебосфорским течением из Мраморного моря в Черное. До недавнего времени из 425 таксономических форм копепод, известных для Средиземного моря [6] в Черном море встречалось немногим более 60 и их распространение было ограничено прибосфорским районом. В 1960–1997 гг. в прибосфорском районе обнаружено 60 видов средиземноморских Copepoda [16]. В последние десятилетия отмечается увеличение числа находок чужеродных средиземноморских видов не только в прибосфорском районе, но и в прибрежных водах Крыма и Кавказа [1;3;4;7;10]. Значительное количество средиземноморских видов на судоходных путях и в районах крупных портовых городов Крыма и Кавказа, вероятнее всего, можно объяснить их переносом в эти регионы с балластными водами коммерческих судов [11]. В 1999 г. в северо-восточной части (район Геленджика обнаружены 4 вида тропических средиземноморских Copepoda – *Euchaeta marina* Prestandrea, 1833, *Scolecithrix danae* Lubbock, 1856, *Rhincalanus nasutus* Giesbr., 1888 [1]; в 2001 г. в экспедиции НИС «Кногг» в западной части Черного моря – 35 таксономические формы [17]; 2004–2005 гг. в Новороссийской бухте – 36 [10]. В прибрежных водах Крыма отмечены чужеродные Cyclopoida *Oithona brevicornis* Giesbr., *O. plumifera* Baird, *O. setigera* Dana, Calanoida *Clausocalanus arcuicornis* Dana 1849, *Scolecetrix* sp.; в районе острова Змеиный – *Rhincalanus* sp., *Oncaea minuta* Giesbr., 1892 [4]; в океаниуме Севастопольской бухты – *Calocalanus* sp., виды семейства Oncaidae *Oncaea dentipes* Giesbr., 1891, *O. mediterranea* Claus, 1863, *O. subtilis* Giesbr., 1892, *O. venusta* venella Farran, 1929 [7]. В сводке [12] приводится 104 таксономические формы чужеродных Copepoda, включая 100 средиземноморских, обнаруженных в Черном море различными исследователями за период 1960–2004 гг. Из этого списка 36 % находок приходится на прибосфорский район, 7 % – Крым, по 28 и 29 % – на северо-восточную часть и западную части. В последние годы в связи с повышением температуры воды Черного моря и интенсификацией судоходства чужеродные виды копепод все чаще и чаще отмечаются в черноморских водах. Однако только 1 вид –

циклоидная копепода *Oithona brevicornis* Giesbr. дал колоссальную вспышку численности в неритической зоне Крыма и Кавказа. О появлении *O. brevicornis* в Севастопольской бухте стало известно в 2001 г. [2]. Осенью 2006–2007 гг. его численность достигла 40–50 тыс. экз./м³ – максимальных значений плотности копепод за последние 40 лет [15]. Два года спустя вид распространился вдоль побережья Крыма. В Новороссийской бухте *O. brevicornis* отмечена в 2003 г. [18]. В 2004–2005 гг. наблюдалась вспышка численности вида в Новороссийском и Туапсинском портах. С конца августа до декабря 2010 г. вид всецело доминировал в зоопланктоне северо-восточного шельфа, составляя 80–85% суммарного количества. Его максимальная плотность, отмеченная в бухтах и портах достигала 22–30 тыс. экз./м³. В августе вид проник в Азовское море. В свете сказанного, находка единичных экземпляров циклопид (*Oncaea dentipes* Giesbr., *Oncaea media* Giesbr., 1892, *Oithona vivida* Farran, 1913, *Corycaes clausi* Dahl, 1894, каланид (*Calocalanus tenuis* Farran, 1926, *Calocalanus pavoninus* Farran, 1936, *Ctenocalanus vanus* Giesbr., 1888, *Centropages furcatus* Dana, 1849, *Acartia discudata* Giesbr., 1929), а также 3-х неизвестных ранее видов рода *Acartia* sp. и 2-х *Oncaea* sp. и гарпактицыды *Microsetella rosea* Dana, 1947 в низовье реки Черной представляет исключительный интерес. Пока трудно сказать каким образом в большинстве своем поли- и эвригалинные морские виды могли оказаться в хорошей сохранности в солоноватоводных речных водах. Основными факторами, определяющими изменение видового разнообразия копепод в Черном море по сравнению со Средиземным морем, являются: соленостный градиент и разные физиологические способности организмов к его преодолению. Обнаруженные нами организмы имеют разную галопатию. Значительная часть стеногалинных видов не способна преодолеть градиент понижения солености и погибает. Только эвригалинные виды могут успешно преодолевать изменение осмотического давления и ионной концентрации. При попадании такого нового вида в новую среду обитания, с оптимальными для него условиями существования, может произойти экологический «взрыв численности», как это мы наблюдали в случае с *O. brevicornis*. Именно за счет подобных групп будет идти обогащение фауны веслоногих раков Черного моря, а способность процессу «мединтерранизации» может непреднамеренная интродукция с балластными водами судов.

Заключение

За период исследования в приустьевой зоне р.Черная идентифицировано 46. Массовыми круглогодичными видами данного района являлись *Acartia tonsa*, *Acartia clausi*, *Acartia mollicula*, *Acartia lamasii* и *Cyclopina* sp. Среди других копепод чаще встречались *Centropages spinosus*, *Paracalanus* sp.,sp. *Oithona nana*, *Oithona brevicornis*. Подавляющее большинство видов

руслы реки и эстuarной зоны бухты найдены в диапазоне солености 5,8-19‰. Все они являются типичными как для района эстуария реки, так и для Севастопольской бухты. Видовой состав 2-х основных подотрядов копепод отличался большим разнообразием, что позволяет характеризовать мезозоопланктонное сообщество данных экосистем как благополучное.

1. Виноградов М.Е., Востоков С.В., Арашкевич Е.Г., Дриц А.В., Мусаева Э.И., Анохина Л.Л., Шушкина Э.А. Особенности биологии гребневиков-вселенцев и их роль в экосистеме Черного моря // Виды-вселенцы в европейских морях России. Апатиты: КНЦ, 2000. С. 91–113.
2. Загородня Ю.А. *Oithona brevicornis* в Севастопольской бухте – случайность или новый вселенец в Черное море? // Экология моря. 2002. Вып. 61. С. 43.
3. Загородня Ю.А., Павловская Т.В., Морякова В.К. Современное состояние зоопланктона у берегов Крыма // Современное состояние биоразнообразия прибрежных вод Крыма (черноморский сектор). Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2003а. С. 49–83.
4. Загородня Ю. А., Колесникова Е.А. К проблеме проникновения чужеродных видов копепод в Черное море // Эволюция морских экосистем под влиянием вселенцев и искусственной смертности фауны. Тезисы докладов. Ростов на Дону. 2003б. С. 80–81.
5. Иванова Т.А., Щербань С.А., Шмелева А.А. Мониторинговые исследования зоопланктона (группа Сорепода) Севастопольской бухты в районе впадения р. Черной // Экология: проблемы, решения – молодежное видение. 2005. Вып.2. С.79–80.
6. Ковалев А.В., Шмелева А.А. Фауна веслоногих раков (Сорепода) Средиземного моря // Экология моря. 1982. Вып. 8. С.82–87.
7. Мурина В.В., Шмелева А.А., Лисицкая Е.В. Годичный мониторинг меро- голопланктона в океаниуме Севастопольской бухты // Гидробиол. журн. 2002. Т. 38, № 3. С. 3–11.
8. Никитин В.Н. Севастопольская биологическая станция // Природа. 1925. № 7. С. 195–202.
9. Павлова Е.В., Овсяный Е.И., Гордина А.Д., Романов А.С., Кемп Р.Б. Современное состояние и тенденции изменения экосистемы Севастопольской бухты // Акватория и берега Севастополя: экосистемные процессы и услуги обществу. Севастополь: Аквавита, 1999. С. 70–94.
10. Селифонова Ж.П., Шмелева А.А. Изучение фауны веслоногих раков Новороссийской бухты Черного моря и Азовского моря. // Гидробиол. журн. 2007. Т. 43, № 5. С. 27–35.
11. Селифонова Ж.П. Морские бионивазии в водах Новороссийского порта Черного моря // Биол. моря. 2009. Т. 35, № 3. С. 212–219.
12. Селифонова Ж.П., Шмелева А.А. О медiterrанизации фауны веслоногих раков (Сорепода) Черного моря // Бюллетень МОИП. Отд. биол. 2010. Т. 115, № 1. С. 58–62.
13. Шмелева А.А., Мурина В.В., Гринцов В.А., Щербань С.А., Гарлицкая А.А. Беспозвоночные эстуария реки Черная (Севастополь, Черное море) // Бюллетень МОИП. Отд. биол. 2008. Т. 13. Вып. 5. С. 31–36.
14. Шмелева А.А., Павлова Е.В., Щербань С.А. Основные этапы исследований Сорепода (Crustacea) в Черном море: обзор // Карадаг-2009. Сб. научных трудов, посв. 95-летию Карадагской научной станции и 30-летию Карадагского природного заповедника Национальной академии наук Украины. Севастополь-2009. С. 313–326.
15. Gubanova A., Altukhov D. Establishment of *Oithona brevicornis* Giesbr., 1882 (Copepoda: Cyclopoida) in the Black Sea // Aquatic Invasions. 2007. Vol. 2, no. 4. P. 407–410.
16. Kovalev A., Besiktere S., Zagorodnyaya J., Kideys A. Mediterraneanization of the Black Sea zooplankton is continuing // Ecosystem modeling as a Management Tool for the Black Sea . – Dordrecht\$ Boston, London, 1998. Vol. 1. P. 199–207.
17. Selifonova J.P., A.A. Shmeleva, Ah.E. Kideys. Study of Copepod Species from the Western Sea in the Cruse z/y "Knorr" during May-June 2008 // Acta zool.bulg. 2008. Vol. 60 (3). P. 305–309.
18. Selifonova Zh.P. *Oithona brevicornis* Giesbrecht (Copepoda: Cyclopoida), Invader into the Black Sea and in the Sea of Azov // Russian Journal of Biological Invasions. 2011. Vol. 2, No. 2–3. P. 227–232.
19. Vives F., Shmeleva A. Crustacea. Copepoda Marinos 1. Calanoida // Fauna Iberica. Madrid (MNCN CSIC), 2007. Vol. 29. 1152 p.

Отримано: 11 березня 2013 р.

Прийнято до друку: 12 грудня 2013 р.