

Антибіотики для перорального застосування від компанії "AVISO"



Мукотріл

Показання до застосування

Препарат МУКОТРИЛ розчин застосовують як відхаркувальний засіб при гострих і хронічних бронхітах різної етіології, гострих і хронічних бронхопневмоніях і пневмоніях, також лихоманки, захворювань у великої рогатої худоби з високим ризиком розвитку BRD, пов'язаних з *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* і *Histophilus Somni*.

1 мл препарату містить:

- діючі речовини – енрофлоксацин (100 мг); бромгексин гідрохлорид (10 мг);
- допоміжні речовини – Твін-80, лимонна кислота, пропіленгліколь, дистильована вода.

Препарат МУКОТРИЛ розчин – поєднує в собі дію двох інгредієнтів – Енрофлоксацин та Бромгексин. Бромгексин не впливає на антимікробний спектр енрофлоксацину. Таким чином, поєднання енрофлоксацину і бромгексину має широкий спектр антимікробної активності з бактерицидною дією проти грамнегативних і грампозитивних бактерій. Енрофлоксацин і бромгексин діють синергічно проти інфекцій, цей ефект може бути віднесено до того, що бромгексин зріджує товстий слиз і підсилює проходження енрофлоксацину в трахеобронхіальний секрет.

Дози і спосіб уведення тваринам різного віку

Перорально з питною водою або молоком:

- **птиця (кури, курчата, індики)** – 500 мл на 1 т питної води на добу;
- телята, ягнята, кози – 1 мл препарату на 40 кг маси тіла тварини на добу;
- свині – 1 мл препарату на 20 кг маси тіла тварини на добу;
- курс лікування – 3–5 днів. Щодня необхідно готувати свіжий розчин з препаратом.

Період виведення (каренція)

Забій тварин та птиці на м'ясо дозволяється через 5 днів після останнього застосування препарату. Отримане до зазначеного терміну м'ясо утилізують або згодовують непродуктивним тваринам, залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини.



Супер Нео Т.Р.Т

СУПЕР НЕО Т.Р.Т – це препарат, який поєднує в собі антибіотики широкого спектру дії з полівітамінами та гарантує швидку і надійну дію проти численних бактеріальних захворювань і харчових дефіцитів у свійської птиці та худоби. Широкий спектр активності проти різних грампозитивних і грамнегативних бактерій, спірохет, рикетсій і хламідій. Бактерицидна активність неоміцину в низькій концентрації щодо певних грампозитивних і грамнегативних кишкових патогенів. Антимікробна активність окситетрацикліна відбувається як у сироватці крові, так і в шлунково-кишковому тракті, в той час як активність неоміцину концентрується лише в шлунково-кишковому тракті.

Препарат використовується для профілактики і лікування інфекцій від грамнегативних і грампозитивних бактерій, мікоплазми і деяких великих вірусів. Продукт стимулює несучість, прискорює ріст, покращує засвоєння корму і використовується в якості вітамінної добавки в періоди хвороб і стресу. Шлунково-кишківі інфекції, інфекції дихальних і сечових шляхів у телят, кіз, овець, свійської птиці та свиней, спричинені чутливими до окситетрацикліну і неоміцину мікроорганізмами, такими як бордетели, бактерія *Campylobacter*, хламідії, кишкова паличка, гемоглобінофільні бактерії, клебсієла, мікоплазма, бактерія *Pasteurella*, рикетсії, сальмонела, стафілококи і стрептококи.

СУПЕР НЕО Т.Р.Т містить вісім вітамінів.

Вид тварин

- Телята, ягнята, свині, свійська птиця.
- Дози і спосіб уведення тваринам різного віку пероральним шляхом у дозі:
- **свійська птиця** – 500-1000 г на 1 тону питної води;
- **телята** – 20 г на тварину щодня в питній воді або молоці протягом перших 7 днів життя;
- ягнята – 3 г на тварину щодня в питній воді або молоці;
- свині – 100-400 г на 1 тону питної води;
- курс лікування – 5-7 днів.

Період виведення (каренція)

Забій тварин та птиці на м'ясо дозволяється через 7 днів після останнього застосування препарату. Яйця – через 1 добу після останнього застосування препарату. Отримане до зазначеного терміну м'ясо утилізують або згодовують непродуктивним тваринам, залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини.