

УДК 616-002.77+616-08

Ступенчатая терапия лекарственным препаратом Мовалис® (мелоксикам) при ревматических заболеваниях

От боли в суставах и позвоночнике страдают миллионы людей. Боль чаще всего имеет хронический характер. Для улучшения качества жизни пациента возникает необходимость проведения непрерывной, иногда многолетней терапии. Для лекарственных препаратов, предназначенных для терапии хронического воспалительного процесса, предъявляются особые требования. Помимо выраженного, продолжительного противовоспалительного и анальгезирующего действия необходима высокая безопасность, отсутствие негативного влияния препарата на хрящевую ткань (Курята А.В. и соавт., 2014; Chichasova N.V., 2015).

Цель лечения — уменьшить выраженность боли, облегчить состояние больного и замедлить прогрессирование необратимых изменений в суставах.

Высокая безопасность длительного применения мелоксикама (препарат Мовалис®) показана в рандомизированных клинических исследованиях. Одним из его преимуществ является на-

личие нескольких лекарственных форм. Сначала с помощью инъекций быстро и эффективно купируется острая боль при хронических заболеваниях, таких как остеоартрит и боль в нижней части спины. Затем терапия может быть продолжена в удобной для пациента таблетированной лекарственной форме. Наличие инъекционной и пероральной лекарственных форм препарата Мовалис® позволяет применять ступенчатую терапию.

Ступенчатую терапию препаратом Мовалис® можно проводить в два этапа. В течение первых 3 дней препарат применяют по 15 мг 1 раз в сутки в форме внутримышечных инъекций. Начиная с 4-го и в течение последующих 20 дней пациенты могут продолжать лечение таблетированной лекарственной формой по 15 мг 1 раз в сутки.

На рис. 1 представлены результаты ступенчатой терапии препаратом Мовалис® у пациентов с патологией суставов. Во многоцентровом рандомизированном исследовании с участием 670 пациентов (384 (57,3%) с остеоартрозом, 286 (42,7%) — с ревматоидным артритом) всем больным назначали Мовалис® по 15 мг 1 раз в сутки: 3 дня внутримышечно с последующим




Рис. 1. Динамика клинических симптомов у пациентов с остеоартрозом и ревматоидным артритом при ступенчатой терапии препаратом Мовалис® (мелоксикам)

* $p < 0,001$ для положительной динамики всех симптомов в течение этапов лечения.




Рис. 2. Эффект ступенчатой терапии препаратом Мовалис® (мелоксикам) у пациентов с остеоартрозом и ревматоидным артритом

ЖИТТЯ У РУСИ

МОВАЛІС®
МЕЛОКСИКАМ

Мовалис® (мелоксикам) — це лікарський засіб, який належить до класу селективних інгібіторів циклооксигенази (COX-2). Він ефективно знімає біль, запалення та знижує температуру тіла. Мовалис® показав високу ефективність при лікуванні гострої та хронічної больової синдрому, пов'язаного з ревматоїдним артритом, остеоартрозом, анкілозуючим спонділоартритом, остеохондрозом та більом у нижній частині спини. Мовалис® також показав високу ефективність при лікуванні гострої та хронічної больової синдрому, пов'язаного з ревматоїдним артритом, остеоартрозом, анкілозуючим спонділоартритом, остеохондрозом та більом у нижній частині спини. Мовалис® також показав високу ефективність при лікуванні гострої та хронічної больової синдрому, пов'язаного з ревматоїдним артритом, остеоартрозом, анкілозуючим спонділоартритом, остеохондрозом та більом у нижній частині спини.

Boehringer Ingelheim

переходом на прием внутрь в течение до 20 дней. Анализ эффективности ступенчатой терапии проводили с учетом оценки боли в покое и при движении, нарушений функциональной активности и выраженности воспаления. У большинства пациентов анальгезирующий эффект препарата Мовалис® отмечался уже через 1 ч после первой инъекции, увеличиваясь в течение первых трех дней, продолжая нарастать при переходе на таблетированную лекарственную форму. Мелоксикам (Мовалис®) обеспечивал быстрое и эффективное уменьшение выраженности боли и воспаления при остеоартрозе и ревматоидном артрите. Как следует из рис. 2, по завершении полного курса ступенчатой терапии врачи оценили эффект лечения как «очень хороший» и «хороший» у 93,7 и 84,4% пациентов с остеоартрозом и ревматоидным

артритом соответственно. Это свидетельствует о высокой эффективности ступенчатой терапии препаратом Мовалис®. При этом частота побочных эффектов была низкой (Цветкова Е.С., 2004).

Список использованной литературы

- Курята А.В., Лысунец Т.К., Зайченко А.В., Черкасова А.В. (2014) Боль и проблема безопасности НПВС. Герда, Днепропетровск, 84 с.
- Цветкова Е.С. (2004) Эффективность и переносимость ступенчатой терапии мелоксикамом (мелоксикамом) при ревматических заболеваниях. Тер. арх., 12: 78–80.
- Chichasova N.V. (2015) Therapy for locomotor apparatus diseases: efficiency and safety. Sovr. Revmatol., 9(2): 83–90.

□

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ

(один или несколько правильных вариантов ответов на каждый вопрос)

1. Какие требования предъявляют к лекарственным препаратам, предназначенным для терапии хронического воспалительного процесса, сопровождающегося болью в суставах и позвоночнике?

- выраженный, продолжительный противовоспалительный и анальгезирующий эффект
- высокая безопасность
- отсутствие негативного влияния препарата на хрящевую ткань
- все вышеперечисленные

2. Какова цель лечения при боли в суставах и позвоночнике (выберите наиболее полный ответ)?

- быстро и эффективно купировать боль в покое и при движении
- улучшить качество жизни пациента
- уменьшить выраженность боли, облегчить состояние больного, замедлить прогрессирование необратимых изменений в суставах

3. Каковы преимущества применения препарата Мовалис® (мелоксикам)?

- высокая безопасность длительного применения, показанная в рандомизированных клинических исследованиях

- наличие инъекционной и пероральной лекарственных форм, позволяющих применять ступенчатую терапию

4. Как рекомендовано проводить ступенчатую терапию препаратом Мовалис® (мелоксикам)?

- в течение первых 3 дней — по 15 мг 1 раз в сутки в форме внутримышечных инъекций, начиная с 4-го и в течение последующих 20 дней — продолжать лечение таблетированной лекарственной формой по 15 мг 1 раз в сутки
- в течение первых 5 дней — по 15 мг 1 раз в сутки в форме внутримышечных инъекций, начиная с 6-го и в течение последующих 15 дней — продолжать лечение таблетированной лекарственной формой по 15 мг 1 раз в сутки
- в течение первых 3 дней — перорально по 15 мг 1 раз в сутки, при отсутствии эффекта — по 15 мг 1 раз в сутки в форме внутримышечных инъекций в течение 3 дней

5. У большинства пациентов анальгезирующий эффект препарата Мовалис® (мелоксикам) отмечается:

- через 1 ч после первой инъекции, увеличиваясь в течение первых трех дней и продолжая нарастать при переходе на таблетированную лекарственную форму
- через 1 ч после третьей инъекции, продолжая нарастать при переходе на таблетированную лекарственную форму
- после окончания курса лечения

Для получения сертификата ответьте на тестовые вопросы в режиме on-line на сайте журнала www.umj.com.ua или отправьте ксерокопию страниц с ответами вместе с контактной информацией по адресу: 01001, Киев-1, а/я «В»-82, ООО «МОРИОН»

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

ФИО _____

Почтовый адрес: индекс _____

область _____

район _____

город _____

улица _____

дом _____

квартира _____

Телефон _____

E-mail _____