

АНАЛІЗ ВИПАДКІВ АЛКОГОЛЬНОГО ОТРУЄННЯ ЗА ДАНИМИ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ**Камоцький Б.В., *Недоступ М.Ф.****Луганське обласне бюро судово-медичної експертизи; *Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка*

Вступ. Проблема алкогольної інтоксикації - одна з найбільш важливих проблем судової медицини. Актуальність її визначається тим, що алкогольне сп'яніння часто є чинником, що провокує наступ раптової смерті, само по собі може стати причиною смерті, дуже часто супроводжує самогубства, нещасні випадки у побуті та на виробництві, різні злочини, що вчиняються проти особистості. До теперішнього часу в світовій літературі досить повно висвітлені питання впливу алкоголю на організм людини. Однак проблему експертизи алкогольної інтоксикації ще й досі не можна вважати вирішеною, особливо щодо судово-медичного дослідження трупа [1,2,3].

Мета та матеріал дослідження. Були проаналізовані висновки судово-медичних експертиз, узятих з Луганського обласного бюро судово-медичної експертизи за період з 2009 по 2011 роки. У ході дослідження проведено порівняння кількісного, вікового та статевого складу осіб, у яких була виявлена алкогольна інтоксикація.

Результати досліджень. В результаті проведеного аналізу було встановлено, що з загальної кількості аутопсій, проведених протягом трьох років (4232), у 1067 випадках виявлено алкоголь (25,21%). Причому у 2009 році таких випадків було 409 (28,78%) з 1421 проведених аутопсій, у 2010 році – 331 (23,81%) з 1390 аутопсій, а в 2011 році на 1421 аутопсій прийшлося 53 (23,01%) випадки.

У 2009 році частка осіб, загиблих унаслідок насильницької смерті, яким було встановлено алкогольна інтоксикація як супутній діагноз, склала 36,68% (179 осіб). Переважну кількість осіб, у яких була зафіксована алкогольна інтоксикація, склали чоловіки (147 осіб – 82,12%) і, значно меншу – жінки (32 особи – 17,88%).

Слід зазначити, що з загальної кількості осіб у 36 (24,49%) було встановлено легкий ступінь алкогольної інтоксикації, у 43 осіб (29,29%) – середній, а у 68 (46,26%) – тяжкий ступінь алкогольного сп'яніння.

В аналізі вікового складу досліджуваних осіб з алкогольною інтоксикацією звертає на себе увагу переважання їх кількості у найбільш зрілому й працездатному віці від 21 до 40 років (63 випадки – 35,20%) та від 41 до 60 років (79 випадків – 44,13%).

У той же час, кількість осіб, які померли внаслідок ненасильницької смерті, яким була встановлена алкогольна інтоксикація як супу-

тній діагноз, склала 19,21% (166 випадків). За статевою ознакою значно переважав відсоток чоловіків – 76,51% (127 випадків).

Легкий ступінь алкогольного сп'яніння був виявлений у 45,78% (76 випадків), середній – у 25,90% (43 особи), а тяжкий – 28,31% (47 осіб).

За віковим складом найбільша кількість випадків алкогольної інтоксикації виявлена у віковій групі від 41 до 60 років (96 осіб – 57,83%) та віковій групі старше 60 років (56 осіб – 33,73%).

У 2009 році кількість осіб, загиблих внаслідок гострого алкогольного отруєння, склала 64 випадки (4,73%), а у загальній структурі отруєнь цей показник дорівнював – 61,54%.

У 2010 році кількість осіб, загиблих унаслідок насильницької смерті, яким було встановлено алкогольне сп'яніння як супутній діагноз, склала 31,46% (151 осіб). Що стосується гендерного аспекту, то переважну кількість осіб, у яких була зафіксована алкогольна інтоксикація, склали чоловіки (129 осіб – 85,43%). У жінок цей показник дорівнював 14,57% (22 особи).

Необхідно зазначити, що з загальної кількості осіб у 27 (17,88%) був встановлений легкий ступінь алкогольної інтоксикації, у 45 осіб (29,80%) – середній, а у 79 (52,32%) – тяжкий ступінь алкогольного сп'яніння.

Під час розгляду вікового складу осіб з алкогольною інтоксикацією звертає на себе увагу переважання їх кількості у вікових групах від 21 до 40 років (64 випадки – 42,38%) та від 41 до 60 років (61 випадків – 40,40%).

У той же час, кількість осіб, які померли внаслідок ненасильницької смерті, яким був встановлений діагноз алкогольної інтоксикації в якості супутнього діагнозу, склала 14,91% (122 випадків). За статевою ознакою значно переважав відсоток чоловіків – 79,51% (97 випадків).

Легкий ступінь алкогольного сп'яніння був виявлений у 43,44% (53 випадків), середній – у 19,67% (24 особи), а тяжкий – 36,89% (45 осіб).

За віковим складом найбільша кількість випадків алкогольної інтоксикації виявлена у віковій групі від 41 до 60 років (69 осіб – 56,56%) та віковій групі старше 60 років (33 осіб – 27,05%).

У 2010 році кількість осіб, загиблих внаслідок алкогольного отруєння, склала 58 випадки (4,47%), а у загальній структурі отруєнь

цей показник дорівнював – 61,70%.

У 2011 році частка осіб, загиблих унаслідок насильницької смерті, яким була встановлена алкогольна інтоксикація як супутній діагноз, склала 31,31% (139 осіб). Що стосується гендерного аспекту, то переважну кількість осіб, у яких була зафіксована алкогольна інтоксикація, склали чоловіки (120 осіб – 86,33%) і, значно меншу – жінки (19 особи – 13,67%).

Слід зазначити, що з загальної кількості осіб у 37 (26,62%) було встановлено легкий ступінь алкогольної інтоксикації, у 49 осіб (35,25%) – середній, а у 53 (38,13%) – тяжкий ступінь алкогольного сп'яніння.

Аналіз вікового складу досліджуваних осіб з алкогольною інтоксикацією звертає на себе увагу переважанням їх кількості у найбільш зрілому й працездатному віці від 21 до 40 років (51 випадки – 36,69%) та від 41 до 60 років (63 випадки – 45,32%).

У той же час, частка осіб, померлих внаслідок ненасильницької смерті, яким було встановлено алкогольне сп'яніння в якості супутнього діагнозу, склала 15,27% (135 випадків). За статеву ознакою значно переважає відсоток чоловіків – 79,26% (107 випадків).

Легкий ступінь алкогольного сп'яніння був виявлений у 42,22% (57 випадків), середній – у 31,11% (42 особи), а тяжкий – 26,67% (36 осіб).

За віковим складом найбільша кількість випадків алкогольної інтоксикації виявлена у віковій групі від 41 до 60 років (65 осіб – 48,15%) та віковій групі старше 60 років (46 осіб – 34,07%).

У 2011 році кількість осіб, загиблих внаслідок гострого алкогольного отруєння, склала 53 випадки (3,99%), а у загальній структурі отруєнь цей показник дорівнював – 56,38%.

Висновки: Таким чином, проведений аналіз підтвердив наявність значної частки алкогольних отруєнь у загальній кількості аутопсій з їх поступовим зменшенням. Визначена переважна кількість випадків алкогольного отруєння серед осіб чоловічої статі. Виявлена тенденція до зниження випадків алкогольної інтоксикації в категорії насильницької смерті, а також у загальній структурі отруєнь. У категорії насильницької смерті найбільша кількість випадків припадала на тяжкий ступінь алкогольного сп'яніння, тоді як у категорії ненасильницької смерті переважала кількість осіб з легким ступенем алкогольного сп'яніння.

ЛІТЕРАТУРА:

1. **Зороастров О.М.** Экспертиза острой смертельной алкогольной интоксикации при исследовании трупа / О.М. Зороастров. - Тюмень: Изд-во Тюменского государственного университета. - 2003. - 74 с.
2. **Капустин А.В.** Судебно-медицинская диагностика острых смертельных отравлений алкоголем (пособие для врачей судебно-медицинских экспер-

тов) / А.В. Капустин, О.А. Панфиленко, В.Г. Серебрякова. - М.: РИЦСМЭ, 2005. - 21 с.

3. **Шадымов А.Б.** Насильственная и ненасильственная смерть на фоне алкогольной интоксикации / А.Б. Шадымов, М.А. Казымов, Л.Г. Воронкова, П.Н. Ширнин, А.Ю. Юрченко, И.Н. Желтов // Судебная медицина и право. – 2011. - № 4. – С.16-20.

Камоцький Б.В., Недоступ М.Ф. Аналіз випадків алкогольного отруєння за даними судово-медичної експертизи // Український медичний альманах. – 2013. – Том 16, № 1. – С. 136-137.

Проведений аналіз підтвердив наявність значної частки алкогольних отруєнь у загальній кількості аутопсій з їх поступовим зменшенням. Визначена переважна кількість випадків алкогольного отруєння серед осіб чоловічої статі. Виявлена тенденція до зниження випадків алкогольної інтоксикації в категорії насильницької смерті, а також у загальній структурі отруєнь.

Ключові слова: аналіз, алкогольне отруєння, судово-медична експертиза

Камоцький Б.В., Недоступ М. Ф. Анализ случаев алкогольного отравления по данным судебно-медицинской экспертизы // Украинский медицинский альманах. – 2013. – Том 16, № 1. – С. 136-137.

Проведенный анализ подтвердил наличие значительной части алкогольных отравлений в общем количестве аутопсий с их постепенным уменьшением. Определенное подавляющее количество случаев алкогольного отравления среди лиц мужского пола. Выявленная тенденция к снижению случаев алкогольной интоксикации в категории насильственной смерти, а также в общей структуре отравлений.

Ключевые слова: анализ, алкогольное отравление, судебно-медицинская экспертиза

Kamotsky B.V., Nedostup N. F. An analysis of cases of alcoholic poisoning is from data of medico-legal examination // Украинский медицинский альманах. – 2013. – Том 16, № 1. – С. 136-137.

The conducted analysis confirmed the presence of considerable part of the alcoholic poisonings in the general amount of autopsies with their gradual diminishing. The determined repressing amount of cases of the alcoholic poisoning among the persons of sex of men. The educed tendency is to the decline of cases of alcoholic intoxication in the category of violent death, and also in the general structure of poisonings.

Key words: analysis, alcoholic poisoning, medico-legal examination

Надійшла 11.12.2012 р.
Рецензент: проф. А.М.Петруня