

Н.М. Шуба
Т.Д. Воронова
А.С. Крилова
А.В. Пилипенко
Т.С. Хамбір

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Київ

Ключові слова: остеоартроз, гіперурикемія, суглобовий синдром.

КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ОСТЕОАРТРОЗУ У ПОЄДНАННІ З ГІПЕРУРИКЕМІЄЮ

У статті наведено сучасні дані літератури про поєднання остеоартрозу та гіперурикемії. Проаналізовано тривалість захворювання, стадію ураження за рентгенологічними ознаками, клінічні особливості суглобового синдрому у хворих на остеоартроз та гіперурикемію. Досліджено роль запального компонента у розвитку поєднаної патології. Враховуючи отримані дані, можна зробити висновок, що слід планувати диференційований підхід до лікування пацієнтів з остеоартрозом та гіперурикемією.

Остеоартроз (ОА) — найчастіше захворювання суглобів у багатьох популяціях земної кулі, яке зазвичай проявляється у осіб віком старше 40 років та вважається найбільш поширеним інвалідизуючим захворюванням суглобів у світі. Більше того, його поширеність і превалювання зростають, що пояснюється старінням населення, збільшенням тривалості життя та зміною його способу, що веде до подальшого збільшення кількості пацієнтів з ОА (Bijlsma J.W. et al., 2011).

На ОА переважно хворіють люди похилого віку, які мають супутню патологію — ішемічну хворобу серця, ураження центральної нервової системи, печінки, метаболічний синдром (Шуба Н.М. та співавт., 2012).

Тому на сьогодні розглядається взаємозв'язок ОА з іншою супутньою патологією та його залежність від віку, статі, ожиріння та гіперурикемії (подагри). Гіперурикемія значно підвищує ризик виникнення та ускладнює перебіг такої патології, як кардіоваскулярні, цереброваскулярні події, цукрового діабету, ожиріння, а найбільше — артеріальної гіпертензії.

Гіперурикемія може формувати клінічно маніфестну подагру. Дослідженню взаємозв'язку подагри та ОА присвячено багато робіт. Результати великих контрольованих досліджень свідчать, що суглоби пацієнтів, які мали гострі напади подагри, мають більш виражені клінічні та рентгенологічні ознаки ОА, ніж ураження суглобів у осіб без гострих нападів подагри (Roddy E. et al., 2007). Це стосується першого плюснефалангового суглоба, суглобів середнього відділу стопи, колінного суглоба та дистальних міжфалангових суглобів. Крайове наростання кристалів моноурату натрію спостерігалось на фрагментах суглобового хряща (Pascual E. et al., 1998.) Нещодавнє дослідження 7855 екземплярів постсекційного матеріалу таранної кістки виявило сильну кореляцію між розміщенням відкладень кристалів моноурату натрію і кальцію пірофосфату та ділянками пошкодження в суглобовому хрящі (Muehleman C. et al., 2008). Пошкодження хряща зазвичай локалізувалися в місцях біомеханічного стресу, таких як артикулярна поверхня голівки

великогомілкової чи малоомілкової кістки або там, де таранна кістка була протиставлена переднім остеофітам великогомілкової кістки.

Характерний для ОА кістковий набряк, який клінічно виявляється і корелює з рентгенологічною стадією ОА, крепітацією і обмеженням рухів у суглобі, може також виникати як результат вторинного пошкодження суглобів внаслідок подагри (Roddy E. et al., 2007).

Цілком можливо, що асоціація між подагрою і генералізованим ОА може бути пояснена спільними факторами ризику старіння і ожиріння (Roddy E., Doherty M., 2012) (рис. 1).




Рис. 1. Можливі причинні пояснення асоціації між подагрою і ОА. ПА – подагра

Як видно (див. рис. 1), спостерігається взаємозв'язок між подагрою та ОА як «замкнене коло», які посилюють один одного, а також посилюються старінням і ожирінням.

Як ОА, так і подагра мають подібні патогенетичні механізми розвитку, пов'язані з вивільненням прозапальних цитокінів, які призводять до запалення. Рівень сечової кислоти в синовіальній рідині корелює з інтерлейкіном (IL)-1 β . Солі моноурату натрію стимулюють інфламасоми та каспазу-1 у моноцитах та синовіальних мононуклеарних клітинах, з активацією IL-1 β (Martinon F. et al., 2006). Утворення IL-1 β та фактора некрозу пухлини (TNF)- α підвищує приплив нейтрофільних гранулоцитів у суглоб та розвиток запалення (Cronstein B.N., Terkeltaub R., 2006; Martinon F. et al., 2006).

Проте, незважаючи на результати проведених досліджень, проблема поєднання ОА та гіперурикемії залишається недостатньо вивченою.

Тісний зв'язок між тяжкістю ОА і рівнем сечової кислоти в синовіальній рідині продемонстровано

у пацієнтів із гонартрозом і відсутністю в анамнезі подагри, вказуючи, що цей зв'язок може бути використаний як біомаркер тяжкості та прогресування ОА (Denoble A.E. et al., 2011).

Враховуючи вищезазначене, на базі терапевтичного відділення Клінічної міської лікарні № 7 м. Києва виконано роботу з вивчення клінічних особливостей перебігу ОА в поєднанні з гіперурикемією.

ОБ'ЄКТ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

У дослідження включено 91 пацієнта з ОА (78 жінок та 13 чоловіків) віком від 35 до 80 років. Учасників залежно від рівня сечової кислоти у сироватці крові розподілили на дві групи. 1-шу групу становили 36 осіб, які мали ОА без гіперурикемії, середній вік яких становив $59,31 \pm 1,70$ року, 2-гу групу — 55 осіб, які мали ОА та гіперурикемію (рівень сечової кислоти у сироватці крові >360 мкмоль/л), середній вік яких становив $60,45 \pm 1,39$ року. Загальна характеристика обстежених хворих — у табл. 1.

Таблиця 1
Характеристика обстежених хворих

Показник	Група	
	1-ша	2-га
Кількість хворих	36	55
Середній вік, років	$59,31 \pm 1,70$	$60,45 \pm 1,39$
Стать:		
- чоловіки	2	11
- жінки	34	44
Маса тіла, кг	$82 \pm 2,69$	$90,76 \pm 2,21$
Індекс маси тіла (ІМТ)	$30,28 \pm 1,03$	$33,21 \pm 0,81$
Тривалість ОА, років	$8,30 \pm 0,83$	$9,06 \pm 0,85$
Сечова кислота, мкмоль/л	$290 \pm 7,65$	$478,67 \pm 14,23$

Обидві групи були зіставні за загальноклінічними показниками (табл. 2).

Таблиця 2
Загальноклінічні показники

Показник	Група	
	1-ша	2-га
Білірубін, мкмоль/л	$17,05 \pm 0,68$	$15,45 \pm 0,59$
Креатинін, мкмоль/л	$90,74 \pm 3,00$	$95,60 \pm 3,07$
Аланінамінотрансфераза (АлАТ)	$0,14 \pm 0,03$	$0,12 \pm 0,01$
Аспаратамінотрансфераза (АсАТ)	$0,11 \pm 0,01$	$0,12 \pm 0,01$
Холестерин, ммоль/л	$5,20 \pm 0,20$	$5,30 \pm 0,20$
Глюкоза, ммоль/л	$5,38 \pm 0,33$	$5,42 \pm 0,14$

Діагноз ОА встановлювали за критеріями EULAR.

Наявність гіперурикемії вважали у тому разі, коли рівень сечової кислоти у сироватці крові був >360 мкмоль/л.

Усім хворим проводили традиційні клінічні методи дослідження, що включали збір сімейного та індивідуального анамнезу.

ІМТ розраховували за формулою:

$$ІМТ = \frac{\text{маса тіла (кг)}}{\text{зріст}^2 (\text{м}^2)}$$

Вираженість суглобового синдрому оцінювали за такими параметрами: індекс WOMAC (за ВАШ), індекс Лекена.

Усім пацієнтам на початку спостереження проводили рентгенологічне дослідження колінних су-

глобів у прямій (передньозадній) і боковій проекціях. Рентгенологічну стадію ОА визначали за класифікацією J.H. Kellgren та J.S. Lawrence (1957).

З метою діагностики сечокам'яної хвороби чи іншої ниркової патології проводили ультразвукове дослідження органів позаочеревинного простору.

Усім хворим виконували загальноклінічні обстеження: загальний аналіз крові та сечі, глюкоза крові (ммоль/л), біохімічний аналіз крові з визначенням білірубину (мкмоль/л), АлАТ, АсАТ, креатиніну (мкмоль/л), сечовини (ммоль/л).

Для визначення С-реактивного протеїну (СРП) використовували набір реагентів, який призначається для кількісного визначення СРП у сироватці крові. Рівень СРП визначали ≤ 5 мг/л — як низький, >5 мг/л — підвищений. Визначення швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ) проводили за методом Панченка. Концентрацію сечової кислоти у крові визначали за допомогою набору реактивів «Філіст-Діагностика», Україна. Імунологічні дослідження включали кількісне визначення в сироватці крові рівня ІЛ-1 β («Bender MedSystems GmbH», Австрія), TNF- α («Orgenium», Фінляндія), IGF-1 («DRG», Німеччина), NO — імуоферментним методом. Облік реакції проводили на імуоферментному аналізаторі Lab-line — 100 («WestMedica», Австрія).

Для статистичної обробки даних застосовували програмно-математичний комплекс для персонального комп'ютера «Microsoft Excel 2007» (Microsoft) та комп'ютерні програми для статистичного аналізу та оброблення даних «Биостатистика», «STATISTICA® 6.0» («StatSoftInc.», США), «SPSS Statistics 20» («IBM», США).

ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Як видно із загальної характеристики учасників дослідження, тривалість захворювання на ОА була вищою у пацієнтів із гіперурикемією. У 1-й та 2-й групах переважали пацієнти із тривалістю захворювання 8–15 років (табл. 3). У 2-й групі відзначали більшу частку (14%) пацієнтів із тривалістю захворювання понад 16 років. Крім того, у 2-й групі 24% становили пацієнти із тривалістю захворювання до 3 років, що свідчить про більш ранній розвиток ОА за наявності гіперурикемії.

Таблиця 3
Розподіл пацієнтів за давністю захворювання

Давність захворювання, років	Група			
	1-ша		2-га	
	п	%	п	%
≤ 3	6	17	13	24
4–7	11	31	10	18
8–15	16	44	24	44
≥ 16	3	8	8	14

Аналізуючи тяжкість ураження за рентгенологічними ознаками, можна відзначити, що у пацієнтів обох груп виявили ОА переважно II стадії за класифікацією J.H. Kellgren та J.S. Lawrence (75 та 72% відповідно). Проте слід зазначити, що у 1-й групі у 8% діагностовано ОА I стадії, в той час як у 2-й групі ця стадія була відсутньою. Крім того, у 2-й групі була

більша частка ОА ІІІ рентгенологічної стадії (28%) порівняно з 1-ю групою (17%) (табл. 4).

Таблиця 4

Розподіл хворих на ОА та ОА і гіперурикемію за рентгенологічною стадією

Рентгенологічна стадія хвороби	Пацієнти			
	ОА (1-ша група)		ОА і гіперурикемія (2-га група)	
	п	%	п	%
I	3	8	—	—
II	27	75	40	72
III	6	17	15	28
Усього	36	100	55	100

Результати детального аналізу характеру ураження опорно-рухового апарату свідчать про майже однакову частоту олігоартритичного ураження в обох групах (67 та 55% відповідно). У хворих із гіперурикемією виявлено частіше виникнення поліартриту (45%) порівняно з пацієнтами без гіперурикемії (22%). Моноартрит спостерігався у незначній частки (11%) учасників 1-ї групи, в той час у 2-й групі моноартриту зовсім не виявлено (рис. 2).




Рис. 2. Прояви моноартриту, олігоартриту, поліартриту в обстежених групах

При дослідженні артрологічного статусу за індексами Лекена та WOMAC больовий синдром був практично однаковий в обох групах (табл. 5). Ранкова скутість за індексом WOMAC у 1-й групі становила $102,39 \pm 6,75$ мм, в той час у пацієнтів 2-ї групи була дещо вищою — $110,76 \pm 5,44$ мм, але статистично недостовірною. У хворих на ОА з гіперурикемією були статистично достовірно вищі показники болю за ВАШ та обмеження повсякденної активності за індексом WOMAC.

Таблиця 5

Динаміка показників артрологічного статусу у пацієнтів

Показник	ОА (1-ша група)	ОА і гіперурикемія (2-га група)
	ВАШ, мм	$47,22 \pm 1,36$
Індекс Лекена, балів	$11,78 \pm 0,76$	$11,82 \pm 0,47$
WOMAC, мм:		
- біль	$231,97 \pm 18,67$	$230,65 \pm 11,75$
- скутість	$102,39 \pm 6,75$	$110,76 \pm 5,44$
- функціональна активність	$628,79 \pm 35,79$	$781,52 \pm 36,44^*$

*Достовірність відмінностей $p < 0,05$.

У 1-й групі рівень ШОЕ не перевищував норми та становив $14,03 \pm 1,44$ мм/год, а у 2-й групі — був вищим, ніж у 1-й — $18,25 \pm 1,70$ мм/год — та перевищував норму.

СРП у 2-й групі був значно вищим (статистично достовірно — $p < 0,05$) — $11,85 \pm 1,74$ мг/л, порівняно з 1-ю групою ($6,3 \pm 2,0$ мг/л). Результати можуть свідчити про наявність більш вираженого запального процесу у пацієнтів із ОА та гіперурикемією.

При дослідженні прозапальних цитокінів виявлено підвищений рівень TNF- α та IL-1 в обох групах. У пацієнтів із ОА та гіперурикемією ці показники були дещо вищі, хоча і статистично недостовірно. Так, у 1-й групі — TNF- α $23,56 \pm 2,64$ нг/мл та IL-1 — $20,36 \pm 1,56$ пг/мл, у 2-й — $32,86 \pm 5,13$ та $22,73 \pm 3,88$ пг/мл відповідно.

Рівень NO не відрізнявся в обох групах і становив $3,49 \pm 0,39$ мкмоль/л у 1-й групі та $3,26 \pm 0,52$ мкмоль/л — у другій.

Ще одним із важливих цитокінів, що бере участь у метаболізмі хряща, є IGF-1. IGF-1 сприяє проліферації та диференціюванню хондроцитів і гальмує апоптоз. Нами визначено, що рівень IGF-1 був нижчим за норму в обох групах. Проте більш значне його зниження спостерігалося у 2-й групі ($44,78 \pm 3,91$ нг/мл) порівняно з 1-ю ($68,68 \pm 5,44$ нг/мл) ($p < 0,05$), що можна пояснити більш вираженим зниженням процесів регенерації у пацієнтів із гіперурикемією.

Внаслідок проведеного аналізу отриманих даних, викладених вище, можна зробити такі висновки:

1. У пацієнтів з ОА та гіперурикемією тривалість захворювання на ОА була більшою.

2. Хворі на ОА з гіперурикемією мали більш ранній початок ОА та більш виражену рентгенологічну стадію, порівняно з пацієнтами з ОА без гіперурикемії.

3. Для пацієнтів із ОА з гіперурикемією більш характерний поліартрит та відсутність моноартриту.

4. Дані клінічного обстеження свідчать, що пацієнти з ОА та гіперурикемією відрізнялися більш тяжким перебігом ОА, а саме вираженістю болю за ВАШ та обмеженістю функціональної активності за індексом WOMAC.

5. Пацієнти з ОА та гіперурикемією характеризувалися наявністю більш вираженого запального процесу (за даними СРП) та зниження процесів регенерації (за даними IGF-1).

Отже, враховуючи отримані дані, слід планувати диференційований підхід до лікування пацієнтів з ОА та гіперурикемією.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Шуба Н.М., Воронова Т.Д., Тарасенко Т.М. та ін. (2012) Нові аспекти патогенезу остеоартрозу та шляхи корекції. Укр. ревматол. журн., 1(47): 51–58.
- Bijlsma J.W., Berenbaum F., Lafeber F.P. (2011) Osteoarthritis: an update with relevance for clinical practice. Lancet, 377: 2115–2126.
- Cronstein B.N., Terkeltaub R. (2006) The inflammatory process of gout and its treatment. Arthritis Res. Ther., 8(Suppl. 1): S3.

Denoble A.E., Huffman K.M., Stabler T.V. et al. (2011) Uric acid is a danger signal of increasing risk for osteoarthritis through inflammasome activation. *Proc. Natl. Acad. Sci USA*, 108: 2088–2093.

Kellgren J.H., Lawrence J.S. (1957) Radiological assessment of osteoarthritis. *Ann. Rheum. Dis.*, 16: 494–501.

Martinon F., Pétrilli V., Mayor A. et al. (2006) Gout-associated uric acid crystals activate the NALP3 inflammasome. *Nature*, 440: 237–241.

Muehleman C., Li J., Aigner T. et al. (2008) Association between crystals and cartilage degeneration in the ankle. *J. Rheumatol.*, 35: 1108–1117.

Pascual E., Ordonez S. (1998) Orderly arrayed deposit of urate crystals in gout suggest epitaxial formation. *Ann. Rheum. Dis.*, 57: 255.

Roddy E., Zhang W., Doherty M. (2007) Are joints affected by gout also affected by osteoarthritis? *Ann. Rheum. Dis.*, 66: 1374–1377.

Roddy E., Doherty M. (2012) Gout and osteoarthritis: A pathogenetic link? *Joint Bone Spine*, 79: 425–427.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТЕОАРТРОЗА В СОЧЕТАНИИ С ГИПЕРУРИКЕМИЕЙ

Н.М. Шуба, Т.Д. Воронова, А.С. Крылова, А.В. Пилипенко, Т.С. Хамбир

Резюме. В статье представлены современные данные литературы о сочетании остеоартроза и гиперурикемии. Проанализировано длительность заболевания, стадию поражения по рентгенологическим признакам, клинические особенности суставного синдрома у больных остеоартрозом и гиперурикемией. Исследована роль воспалительного компонента в развитии сочетанной патологии. С учетом полученных данных можно сделать вывод, что следует планировать

дифференцированный подход к лечению пациентов с остеоартрозом и гиперурикемией.

Ключевые слова: остеоартроз, гиперурикемия, суставной синдром.

CLINICAL FEATURES OF OSTEOARTHRITIS IN COMBINATION WITH HYPERURICEMIA

N.M. Shuba, T.D. Voronova, A.S. Krylova, A.V. Pilipenko, T.S. Khambir

Summary. This article presents the current data in the literature about the combination of osteoarthritis and hyperuricemia. The duration of the disease, the severity of radiological signs, the clinical features of the articular syndrome have been analyzed in patients with osteoarthritis and hyperuricemia. The role of inflammatory component in the development of comorbidity was studied. Taking into account received data, we can conclude that it is necessary to plan a differentiated approach to the treatment of patients with osteoarthritis and hyperuricemia.

Key words: osteoarthritis, hyperuricemia, articular syndrome.

Адреса для листування:

Шуба Неоніла Михайлівна
04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9
Національна медична академія
післядипломної освіти
ім. П.Л. Шупика

РЕФЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ

Применение нового препарата способствует полному устранению симптомов псориаза

Подготовила Анна Антонюк

Псориаз — идиопатическое хроническое неинфекционное заболевание, в основном поражающее кожу. Ключевую роль в патогенезе заболевания играет аутоиммунная реакция организма, сопровождаемая хроническим воспалением и гиперпролиферацией лимфоцитов, макрофагов и кератиноцитов, а также чрезмерным ангиогенезом.

Специалисты Университета Манчестера (University of Manchester), Великобритания, опубликовали на страницах журнала «The Lancet» результаты исследования, свидетельствующие об эффективности нового препарата иксекизумаба у пациентов с псориазом. Его применение на протяжении 12 нед помогло достичь полного исчезновения псориазных бляшек у 40% пациентов и значительно уменьшить выраженность симптоматики заболевания у 90%, что стало подтверждением ранее полученных данных клинических испытаний.

В текущем исследовании участвовали 2500 лиц с псориазом. Половина из них применяли иксекизумаб по 80 мг каждые 2 нед/4 нед после стартовой дозы 160 мг, остальные — плацебо либо этанерцепт (блокатор рецепторов фактора некроза опухоли- α , который также применяют для лечения при указанном заболевании). Уже на 4-й неделе после начала клини-

ческого испытания у половины пациентов 1-й группы отмечали уменьшение выраженности симптомов заболевания до уровня PASI (Psoriasis Area Severity Index) 75, на 12-й неделе — снижение интенсивности заболевания у 90% пациентов, применявших иксекизумаб каждые 2 нед, и 77% — каждые 4 нед.

Иксекизумаб — препарат, который по своей сути является моноклональным антителом, специфичным к интерлейкину-17A, играющим важную роль в развитии аутоиммунных заболеваний. Этот цитокин в большом количестве идентифицируют в выделениях, полученных из псориазных бляшек.

Ученых приятно удивили результаты исследования, поскольку первоначальной целью терапии было лишь уменьшение выраженности симптомов болезни. При этом применение иксекизумаба способствовало полному устранению проявлений патологии у части пациентов. Это позволило значительно улучшить качество их жизни, помочь им чувствовать себя более уверенно из-за устранения самой бляшки и уменьшения зуда — еще одного симптома заболевания, приносящего огромный дискомфорт больному.

Griffiths Ch.E., Reich K., Lebwohl M. et al. (2015) Comparison of ixekizumab with etanercept or placebo in moderate-to-severe psoriasis (UNCOVER-2 and UNCOVER-3): results from two phase 3 randomised trials. *The Lancet*, 10 June [Epub ahead of print].

Manchester University (2015) New drug can clear all psoriasis symptoms. *ScienceDaily*, 10 June (<http://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150610131558.htm>).