

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОСЛОЖНЕНИЯХ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

В.И. Бачурин, О.А. Никифоров, Ю.С. Коломоец, С.П. Сторижко

Запорожский государственный медицинский университет

Одной из сложных проблем урологии является развитие инфекционно-воспалительных осложнений в раннем послеоперационном периоде при заболевании простаты.

Цель исследования: улучшить профилактику инфекционно-воспалительных осложнений в раннем послеоперационном периоде у больных с заболеваниями предстательной железы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалом является результат обследования 187 пациентов, прооперированных по поводу ДГПЖ. Все больные были разделены на две группы. I группа больных состояла из 135 человек, которым в раннем послеоперационном периоде проводилась традиционная терапия. II группа состояла из 52 пациентов, которым в дополнении к традиционной терапии

применялись свечи «Дистрептаза» per rectum по 1 св. 2 раза в день, начиная со 2-го дня послеоперационного лечения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В I группе больных, из 135 человек, в раннем послеоперационном периоде инфекционно-воспалительные процессы и дизурия наблюдались у 22 пациентов (16,3%). Во II группе больных, из 52 человек, в раннем послеоперационном периоде эти явления наблюдались у 3 пациентов (5,8%).

ВЫВОДЫ

Применение свечей «Дистрептаза» в раннем послеоперационном периоде снижает риск развития инфекционно-воспалительных осложнений.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПРОСТАТИТА У БОЛЬНЫХ С ЭКСКРЕТОРНО-ТОКСИЧЕСКИМ БЕСПЛОДИЕМ

В.И. Бачурин, О.А. Никифоров, Г.В. Бачурин

Запорожский государственный медицинский университет

Проблема хронического простатита в настоящее время приобрела особую актуальность по ряду экологических, социальных и экоморальных причин, существенно увеличивших заболеваемость. Важность проблемы связана также с тем, что воспаление предстательной железы может значительно нарушать ее функции, обеспечивающие мужскую фертильность, что в конечном итоге приводит к ухудшению демографических показателей. Хронический простатит в настоящее время остается весьма распространенным с необычным течением и трудно под-

дающимся лечению заболеванием, частота которого достигает 30–50%. Он поражает сексуально активных мужчин молодого возраста и нередко осложняется нарушением репродуктивной функции. Большинство урологов полагают, что повышение частоты хронических простатитов, протекающих особенно латентно, и их осложнений в виде бесплодия, связано с выявлением микробных возбудителей, передающихся половым путем, являющихся урогенитальными скрытыми инфекциями. Многообразие субъективных и объективных симптомов, связанных с воспа-