

ОРТОДОНТІЯ

УДК: 616.314-089.23-053.2-06:616.314.17-073.75

Ю.В. Ткаченко

НЕКОТОРЫЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ РИСКА ПАРОДОНТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕСЪЕМНОЙ ТЕХНИКОЙ

Харьковский национальный медицинский университет

Среди стоматологических заболеваний зубочелюстные аномалии являются одними из самых распространённых [6]. Их частота повышается по мере формирования зубочелюстной системы [5] и к постоянному прикусу требует применения несъёмной ортодонтической техники (НОТ). Такая тенденция особенно неблагоприятна на фоне роста заболеваний пародонта у детей и подростков в Украине [3]. Следует отметить, что высокая скорость деструктивных процессов в тканях пародонта (ТП) и низкая эффективность традиционных методов лечения могут быть определены не только неадекватной реакцией местной микрофлоры на используемые антибиотики [1, 8], травматическими воздействиями, в том числе при ортодонтических перемещениях [4], но и изначально несовершенной структурой пародонтального комплекса [7].

Целью исследования явилось повышение эффективности диагностики риска пародонтальных осложнений при ортодонтическом лечении несъёмной техникой путём выявления рентгенологических предикторов.

Методы исследования.

Было проведено обследование ортопантограмм (ОПТГ) 33 пациентов от 13 до 20 лет обоих полов, т.е. в период формирующегося и сформированного постоянного прикуса (Ф.Я. Хорошилкина, 1983). ОПТГ были распределены на 2 группы. ОПТГ получены с помощью панорамного рентгеновского аппарата «Cranex D Serp» («Soredex», Финляндия) - анодное напряжение 57-85 кВ, анодный ток 10 мА, длительность экспонирования 17,6 сек.

В первую группу ("здоровый пародонт") включили ОПТГ 15 пациентов с зубочелюстными аномалиями без рентгенологических изменений в тканях пародонта. Вторую группу ("пародонтит") составили 18 пациентов, имеющих Rō-логические изменения, характерные для I степени развития пародонтита (генерализованная горизонтальная убыль костной ткани, резорбция вершечек межальвеолярных перегородок, с участками вертикальной резорбции в области отдельных зубов).

Предметом изучения явилось состояние губчатой и компактной костной ткани челюстей и РОХ правых зубов верхней и нижней челюстей: высота коронки 16, 14, 11, 41, 44 и 46 зубов, длина, ширина и форма их корней, соотношение высоты коронки и длины корня (ранее установлено, что параметры правых и левых зубов имеют статистически недостоверные отличия [2]). Кроме этого, у нижнего первого постоянного моляра определяли кривизну корней, их конвергенцию. В 16 зубе длина корня определялась у нёбного корня, в 46 – дистального.

Результаты статистического исследования обрабатывали с помощью пакета прикладных программ («Statistica 5,0») при использовании статистических критериев Стьюдента и Фишера для проверки гипотезы о различии между средними значениями и дисперсиями для двух выборок.

Результаты исследования.

В результате исследования ОПТГ получены следующие данные: РОХ у мужчин и женщин имеют отличия (табл. 1, 2).

Таблиця 1
Рентген - одонтометрические характеристики зубов в 1 группе

Зубы	11		41		14		44		16		46	
	m	f	m	f	m	f	m	f	m	f	m	f
Высота коронки	11.5 ± 0.67	10.4 3 ± 0.65	8.17 ± 0.61	8.43 ± 0.94	9.83 ± 0.89	8.71 ± 0.9	9.00 ± 0.67	8.57 ± 0.78	10.67 ± 0.44	10.42 ± 0.9	10.1 7 ± 1.17	9.14 ± 1.06
Длина корня	19.5 ± 1.3	18.4 4 ± 2.2	17.6 7 ± 1.1	17.1 4 ± 1.55	16.4 ± 1.83	17.8 5 ± 1.63	18.67 ± 1.17	17.5 7 ± 2.08	20.33 ± 1.22	18.00 ± 0.86	17.1 7 ± 1.44	17.13 ± 2.08
Ширина корня	6,3 ± 0.67	5.57 ± 0.94	4.67 ± 2	4.57 ± 1.06	5.83 ± 0.56	5.14 ± 0.73	6.33 ± 0.44	5.43 ± 0.94	6.63 ± 0.28	5.86 ± 0.98	5.33 ± 0.48	4.57 ± 0.49

Это связано с антропометрическими особенностями строения тела. Показатели высоты коронки зубов у здоровых лиц и лиц с заболеваниями пародонта практически не отличались (между

ними не выявлена статистическая разница, $p > 0,05$). Длина корней зубов у лиц 1 группы была больше, чем аналогичный показатель во 2 группе ($p < 0,05$).

Таблиця 2
Рентген - одонтометрические характеристики зубов во 2 группе

Зубы	11		41		14		44		16		46	
	m	f	m	f	m	f	m	f	m	f	m	f
Высота коронки	11.8 ± 0.64	10.67 ± 0,6	8.6 ± 0.5	7.78 ± 0.91	9.4 ± 1.28	9.0 ± 1.11	8.8 ± 1.84	8.89 ± 0.81	10 ± 1.6	9.89 ± 0.62	10.4 ± 0.88	9.45 ± 0.81
Длина корня	17.2 ± 1.44	16.1 ± 1.88	15.4 ± 1.68	14.33 ± 1.26	15.6 ± 1.68	16.44 ± 1.95	17.0 ± 1.2	16.3 3 ± 2.37	18.4 ± 2.08	17.0 1 ± 1.19	15.9 ± 1.92	15.5 2 ± 1.8
Ширина корня	5.64 ± 0.88	4.98 ± 1.89	3.64 ± 0.72	3.8 ± 1.34	5.4 ± 1.12	4.83 ± 1.07	6.1 ± 1.12	5.11 ± 1.01	5.8 ± 0.96	5.81 ± 1.23	5.2 ± 0.64	4.61 ± 0.65

При сравнении ширина корня у обследуемых лиц достоверно отличалась лишь в 41 зубе, она

была меньше как у мужчин, так и у женщин 2 группы ($p < 0,05$).

Таблиця 3
Соотношение средних выборочных показателей длины корня и высоты коронки некоторых зубов в 1 и 2 группах

Зуб	11		41		14		44		16		46		
	m	f	m	f	m	f	m	f	m	f	m	f	
Среднее выборочное	1 группа		2 группа		1 группа		2 группа		1 группа		2 группа		
	1.66± 0.25	1.77± 0.27	2.11± 0.25	2.11± 0.21	1.65± 0.17	2.06± 0.35	2.02± 0.52	2.1± 0.34	1.91± 0.19	1.76± 0.14	1.64± 0.4	1.96± 0.29	
1 группа		2 группа		1 группа		2 группа		1 группа		2 группа		1 группа	
1.5± 0.3	1.61± 0.15	1.7± 0.44	1.69 ±0.2	1.81± 0.51	1.95± 0.22	1.94± 0.86	2± 0.16	1.99± 0.33	1.96± 0.19	1.64± 0.42	1.81± 0.15		

Таблиця 4
Соотношение средних выборочных показателей ширины и длины корня некоторых зубов в 1 и 2 группах

Зуб	11		41		14		44		16		46		
	m	f	m	f	m	f	m	f	m	f	m	f	
Среднее выборочное	1 группа		2 группа		1 группа		2 группа		1 группа		2 группа		
	0.33 ± 0.06	0.31 ± 0.05	0.28 ± 0.08	0.27 ± 0.04	0.38 ± 0.15	0.29 ± 0.04	0.35 ± 0.03	0.32 ± 0.04	0.34 ± 0.06	0.33 ± 0.04	0.31 ± 0.08	0.27 ± 0.05	
1 группа		2 группа		1 группа		2 группа		1 группа		2 группа		1 группа	
0.32 ± 0.16	0.31 ± 0.03	0.23 ± 0.1	0.21 ± 0.07	0.4 ± 0.14	0.34 ± 0.04	0.4 ± 0.13	0.35 ± 0.04	0.33 ± 0.06	0.33 ± 0.05	0.3 ± 0.11	0.27 ± 0.02		

Наиболее показательным является не столько высота коронки, длина и ширина корня, сколько соотношение этих показателей: длины корня и

высоты коронки, а также ширины и длины корня (табл. 3, 4).




Рис. 1. Рентген-однотометрические показатели, исследуемые на ОПТГ пациентов 1 группы: а) конвергирующие корни первых нижних моляров; б) конусовидные корни нижних резцов; в) мелкопетлистый рисунок губчатой костной ткани



Рис. 2. Вид полости рта пациентки 1 группы до и после ортодонтического лечения: состояние тканей пародонта без изменений

В результате статистического анализа было установлено, что нижний центральный резец является типичным для определения показателей соотношения высоты коронки и длины корня, а также длины корня и ширины корня (рис. 1, 2).

Помимо размеров зубов была установлена разница в форме корней однокорневых зубов, форме корней и степени их изогнутости многокорневых зубов (в частности первого постоянного моляра нижней челюсти).

Во 2 группе преобладают узкие и короткие корни игольчатой формы, в то время как у лиц 1 группы – конусовидные. В 92,31% случаев игольчатой корень зубов у пациентов 2-й группы встречается в 41 зубе, в 61,54% - в 11, 14, 44 и 16 зубах и 53,84% - в 46 зубах.

Фактор малой изогнутости корней касался в первую очередь 16 зуба, их кривизна была незна-

чительна и присутствовала слабая степень конвергенции.

При анализе качественного показателя «состояние губчатой костной ткани» установлено, что в первой группе 97,58 % имеют мелкопетлистый рисунок, а во второй такое же подавляющее большинство (91,76 %) имеют крупнопетлистый рисунок.

Динамическими наблюдениями было установлено, что на фоне одинакового владения навыками гигиены полости рта и использования основных и дополнительных предметов и средств гигиены у пациентов 1 группы ортодонтическое лечение протекало без пародонтальных осложнений (рис. 3).

У пациентов 2 группы отмечалось отягощение уже имеющегося заболевания пародонта (рис. 4).




Рис. 3. Рентген-однотометрические показатели, исследуемые на ОПТГ пациентов 2 группы: а) прямые корни первых нижних моляров; б) узкие игольчатые корни нижних резцов; в) крупнопетлистый рисунок губчатой костной ткани



Рис. 4. Вид полости рта пациента 2 группы: на этапе ортодонтического лечения НОТ на нижней челюсти заметно прогрессирование рецессий в области 12, 13 и 43, 42 зубов

Выводы

1. При анализе ОПТГ в комплексе планирования ортодонтического лечения следует обращать внимание на форму корней нижних резцов, соотношение длины корня к их ширине и высоте коронок, кривизну корней первых моляров нижней челюсти, а также форму рисунка губчатого вещества челюстной кости.

2. В качестве предиктора риска пародонтальных осложнений ортодонтического лечения несъемной техникой может использоваться игловидная форма корней нижних резцов, так как у лиц с рентгенологически здоровым пародонтом преобладает конусовидная.

3. У лиц с заболеваниями пародонта корни первых постоянных моляров нижней челюсти практически прямые и не имеют конвергенции.

4. У людей с заболеваниями пародонта преобладал крупнопетлистый рисунок губчатой костной ткани, а у здоровых людей - мелкопетлистый.

Литература

1. Барер Г.М. Системы локальной доставки лекарств в лечении пародонтита: обзор литературы / Г.М. Барер, О.В. Соловьева, О.О. Янушевич // Пародонтология. - 2002. - № 3. - С. 23-28.
2. Денисова Е.Г. Взаимосвязь состояния тканей пародонта и некоторых рентген-одонтометрических характеристик постоянных зубов / Е.Г. Денисова, Ю.В. Ткаченко // Современная стоматология. - 2008. - № 3. - С. 48 - 51.
3. Деньга О.В. Профилактика осложнений основных стоматологических заболеваний и коррекция кост-

ного метаболизма при лечении зубочелюстных аномалий / О.В. Деньга // Матеріали Всеукр. конф. [«Сучасні методи лікування зубо-щелепних аномалій. Профілактика основних стоматологічних захворювань при ортодонтичному лікуванні»]: (Одеса, 29-30 бер. 2011 р.) / М-во охор. здор., Одес. держ. мед. ун-т, 2011. - С. 45 - 49.

4. Дрогомирецька М.С. Вибір оптимальної схеми лікувально-діагностичних заходів при патології пародонта в процесі ортодонтичного лікування / М.С. Дрогомирецька // Вісник стоматології. - 2010. - № 1. - С. 55 - 58.
5. Лечебно-профилактические мероприятия при ортодонтическом лечении с использованием несъемной техники: пособие для врачей-ортодонтот / [Арсенина О.И., Сахарова Э.Б., Попова А.В., Кабачек М.В.]. - М., 2002. - 56 с.
6. Олейник Е.А. Распространенность факторов риска развития зубочелюстных аномалий у детей / Е.А.Олейник // Актуальные вопросы стоматологии детского возраста и профилактики стоматологических заболеваний: сб. науч. тр.- СПб., 2007. - С. 52-53.
7. Страке М. Этиопатогенез пародонтальных заболеваний / М. Страке // Новое в стоматологии. - 2001. - №8(9). - С. 58-62.
8. Шишкина И.М. Значение пародонтопатогенной и стрептококковой флоры в развитии хронического катарального гингивита / [И.М. Шишкина, Е.В. Ипполитов, Т.Д. Чиркова, Е.Н. Николаева] // Образование, наука и практика в стоматологии.- 2007. - № 3. - С. 219 - 221.

**Стаття надійшла
5.12.2013 р.**

Резюме

В результате сравнительного анализа ортопантограмм пациентов с рентгенологически «здоровым» пародонтом и пациентов, имеющих рентгенологические признаки пародонтита, установлены следующие предикторы риска пародонтальных осложнений ортодонтического лечения несъемной техникой: игловидная форма корней нижних резцов, отсутствие конвергенции корней первых моляров нижней челюсти (корни практически прямые), а также крупнопетлистый рисунок губчатого слоя челюстной кости.

Ключевые слова: брекетты, предикторы риска, пародонтит, ортопантограмма.

Резюме

За результатами порівняльного аналізу ортопантомограм пацієнтів із рентгенологічно «здоровим» пародонтом і пацієнтів, які мають рентгенологічні ознаки пародонтиту, встановлені відповідні предиктори ризику пародонтальних ускладнень ортодонтичного лікування незнімною технікою: голкоподібна форма коренів нижніх різців, відсутність конвергенції коренів перших молярів нижньої щелепи (корені практично прямі), а також крупнопетлистий рисунок губчастого шару щелепної кістки.

Ключові слова: брекети, предиктори ризику, пародонтит, ортопантомограма.

Summary

The comparative analysis of orthopantomograms in patients with radiologically «healthy» paradontium and patients who have radiological evidence of parodontitis has helped to define the following risk predictors of paradontal complications in orthodontic care using fixed restoration: the specular shape of lower incisor teeth roots, the lack of convergence in lower jaw first molar teeth roots (the roots are almost straight) and also the glomerular shape of the jaw bone spongiosa.

Key words: braces, risk predictors, parodontitis, orthopantomogram.