

як збільшенням розповсюдженості психічної патології, так і удосконаленням її діагностики.

З метою створення загального «портрета вітчизняного пацієнта з психічними розладами в первинній медичній мережі», протягом 2003—2010 рр. за умови інформованої згоди нами проанкетовано та обстежено 2894 пацієнти Центральної поліклініки Дніпровського району м. Києва. Із загальної кількості обстежених у 816 осіб діагностовано психічні та поведінкові розлади, що відповідали діагностичним критеріям МКХ-10 (в основному — депресивні, тривожно-депресивні, фобічні, тривожні та панічні розлади). Таким чином, кількість відібраних хворих склала 28,2 % від загальної кількості вивчених пацієнтів.

Встановлено, що серед пацієнтів первинної медичної мережі, які страждають на порушення психіки, питому вагу складають жінки ($63,1 \pm 4,8\%$ проти $36,9 \pm 4,8\%$ чоловіків), віком від 41 до 60 років ($63,8 \pm 4,8\%$), з середньо-спеціальною або вищою освітою ($80,1 \pm 4,0\%$), одруженні ($46,1 \pm 5,0\%$) або розлучені й самотні ($53,9 \pm 5,0\%$), які проживають у власній квартирі ($67,3 \pm 4,7\%$), які працюють ($44,2 \pm 5,0\%$) або є пенсіонерами за віком ($23,3 \pm 4,2\%$) чи інвалідністю ($21,9 \pm 4,1\%$). Серед загальної вибірки інваліди за соматичним захворюванням складають $47,2 \pm 5,0\%$ осіб, серед яких $33,2 \pm 4,7\%$ пацієнтів — внаслідок аварії на ЧАЕС.

З усіх обстежених $33,8 \pm 4,7\%$ спостерігається у невропатолога, $28,7 \pm 4,5\%$ лікуються у кардіолога, $16,5 \pm 3,7\%$ — у гастроenterолога; інші $21,0 \pm 4,1\%$ пацієнтів отримують терапію, призначену ендокринологом, урологом, офтальмологом, отоларингологом або хірургом.

Таким чином, отримані дані в цілому підтвердили світові тенденції щодо наявності та розповсюдженості психічних розладів серед пацієнтів первинної медичної допомоги.

Вищезазначене потребує взаємодії системи надання психіатричної допомоги з системою загальної медичної допомоги, зокрема, інтеграції окремих форм психіатричної допомоги у заклади первинної медичної мережі, перш за все — в територіальні поліклініки (сімейні амбулаторії).

УДК 616.379-008.64-053.2-08:362.13

ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧСКОЇ ПОМОЩІ В УСЛОВІЯХ САНАТОРНОЇ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА ДЛЯ ДЕТЕЙ, БОЛЬНИХ САХАРНЫМ ДІАБЕТОМ 1 ТИПА

О. А. Демченко

Харківська школа-інтернат для дітей, больних сахарним диабетом, г. Харків

Ключові слова: сахарний диабет, діти, психотерапевтическа помощь

В юном возрасте сахарный диабет (СД) имеет преимущественно тяжелое лабильное течение. Наличие тяжелого хронического заболевания само по себе, частые госпитализации приводят к расстройству адаптации ребенка, повышению уровня тревожности, а иногда других невротических проявлений.

Учитывая определенные медико-экономические стандарты стационарного лечения, длительность которого чаще не превышает 2–3 недель, а векторность решения проблем обращена на восстановление метаболического равновесия и многие проблемы психологического плана остаются не решенными.

Важная роль для адаптации ребенка и подростка, больного СД, принадлежит реабилитационному подходу с учетом возрастных особенностей формирующейся личности и изменений, как социальных факторов (изменение образа жизни), так и физиологических, вызванных наличием тяжелого соматического заболевания.

Нами разработана программа психологической и психотерапевтической помощи детям, больным СД.

Программа включает: психологическое консультирование; психологическую диагностику, направленную на изучение особенностей личности, внутренней картины здоровья, типа межличностных отношений, диагностику паттернов поведения, а также модуль психокоррекции,

предусматривающий индивидуальную, семейную терапию, когнитивно-поведенческую и арт-терапию.

Медико-коррекционные стратегии в отношении всей совокупности дезадаптирующих воздействий направлены на уменьшение или смягчение влияния психотравмирующих факторов, связанных с основным заболеванием, обеспечение и восстановление эмоционального равновесия, а также коррекцию неадекватных форм поведения.

Индивидуальные программы психологической коррекции детей с СД позволяют достичь оптимизации контроля течения заболевания и обеспечить высокое качество жизни в системе «жизнь с диабетом».

УДК 616.379-008.64-053.2:159.992

ПСИХОЛОГІЧЕСКИЙ СКРИНІНГ В ИЗУЧЕНИИ ПСИХІЧЕСКОГО И СОМАТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДІАБЕТОМ 1 ТИПА

О. А. Демченко

Харківська школа-інтернат для дітей, больных сахарным диабетом, г. Харків

Ключевые слова: эмоциональное состояние, тревожность, компенсация СД, психотерапия

Для современной медицины сахарный диабет (СД) является одной из важнейших проблем вследствие его большой распространенности, как среди взрослого, так и среди детского населения. Дети до 18 лет составляют 6—10 % всех больных СД 1 типа. У пациентов, страдающих СД, часто встречаются психологические и психические расстройства, которые не только ухудшают социальную адаптацию больного, но и влияют на уровень компенсации данного заболевания.

Ведущая роль в формировании психосоматических и невротических расстройств принадлежит истощению и срыву компенсаторных механизмов организма под влиянием факторов риска, одним из которых является хроническое эмоциональное напряжение, проявляющееся повышением уровня реактивной и личностной тревожности. В формировании личностных особенностей ребенка в целом, в том числе и повышенной личностной тревожности как свойства личности, главную роль играет ближайшее семейное окружение, т. е. его родители.

Нами проведено исследование 100 детей в возрасте от 6 до 18 лет, больных СД 1 типа. Дизайн исследования включал изучение колебания уровня гликемии в течение суток, показателей гликозилированного гемоглобина, суточной глюкозурии. Психологическую диагностику с помощью теста Спилбергера — Ханина и теста К. К. Яхина и Д. М. Менделевича проводили как у детей, так и у их родителей.

Высокий уровень реактивной тревожности отмечен 24 % детей и 37 % их матерей, а личностной тревожности — у 58 % детей и 47 % матерей. Аналогичные результаты получены по шкале тревоги теста К. К. Яхина и Д. М. Менделевича. По шкале невротической депрессии показатели, соответствующие болезни, определялись у 57,14 % больных и 59 % матерей. Болезненный характер расстройств по шкале «обсессивно-фобические нарушения» регистрировали у 31,43 % детей и 28 % матерей.

Установлено, что высокий уровень тревожности снижал порог чувствительности к стрессу и приводил к нарушениям поведения и адаптации в системе «жизнь с диабетом».

В зависимости от конstellации психологических факторов мы сформировали программу помощи детям и их родителям.

Установлено, что в результате психотерапевтического вмешательства у 70 % детей улучшилось эмоциональное состояние, качество самоконтроля СД, которое проявилось в снижении частоты гипо- и гипергликемии, кетоацидоза, а также резких колебаний уровня гликемии (более 5 ммоль/л в течение 2-х часов).

Таким образом, психотерапия является эффективным методом в достижении компенсации СД.