

Теорема 2. Запропонований вище алгоритм знаходження індексу та відповідного власного вектору матриці суміжності сильно зв'язного сагайдака коректний.

3. Висновки

Побудовано алгоритм знаходження індексу та відповідного власного вектора матриці суміжності сильно зв'язного сагайдака без петель та кратних стрілок. Коректність та збіжність цього алгоритму строго доведено.

1. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы // Наука. – Москва. – 2003. – 630 С. 2. Гантмахер Ф.Р., Теория матриц // Наука. – Москва. – 1966. – 576 С. 3. Дудченко И.В. Сильносвязные колчаны, их индексы и собственные векторы // Київ. – 2007. – С. 28. (Препр./ НАН України. Институт математики). 4. Дудченко И.В. Властивості алгебр Фуджити // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. – Серія фіз.-мат. науки. – 2005. – № 6. – С. 126-130. 5. Дудченко И.В. Алгебри Фуджити // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія фіз.-мат. науки. – 2011. – №1. 6. Дудченко И.В. Алгебри Фуджити // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія фіз.-мат. науки. – 2011. – №2. 7. Харари Ф. Теория графов, пер. с англ., М., 1973. 8 Frobenius G., Uber Matrizen aus nicht-negativen Elementen // Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Phys.-math. Klasse. – Berlin, 1912 – S. 456-477. 9 Frobenius G., Uber Matrizen aus positiven Elementen // Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Phys.-math. Klasse. – Berlin, 1908. – S. 471-476; Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Phys.-math. Klasse. – Berlin, 1909. – S. 514-518. 10 Gabriel P., Unserlegbare Darstellungen 1 // Man. Math., 1972, v.6, p.71-103. 11 Hazewinkel M., Gubareni N., Kirichenko V.V., Algebras, Rings and Modules, V.I, Mathematics and Its Applications // V.575. Kluwer Academic Publishers, 2004, 380 p. 12 Perron O., Jacobischer Kettenbruchalgorithmus // Math. Ann. – 1907. – Bd. 64. – S. 1-76. 13 Perron O., Ueber Matrizen // Math. Ann. – 1907. – Bd. 64. – S. 248-263.

Надійшла до редколегії 17.10.11

УДК 512.534

Т. Жуковська, асп,
e-mail: t.zhukovska@ukr.net

ВІДНОШЕННЯ ҐРІНА НА ДЕЯКИХ НАПІВГРУПАХ ЧАСТКОВИХ ІН'ЕКТИВНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ БУЛЕАНУ

Вивчається будова відношень Ґріна на напівгрупі $IF(B_n)$ стискуючих, напівгрупі $IO(B_n)$ монотонних та напівгрупі $IC(B_n)$ стискуючих монотонних ін'ективних перетворень, впорядкованих, за включенням булеану B_n , множини $N = \{1, 2, \dots, n\}$. Показано, що для напівгруп $IF(B_n)$ і $IC(B_n)$ усі відношення Ґріна збігаються з відношенням рівності.

The structure of Green's relations on the semigroup $IF(B_n)$ of order-decreasing injective transformations, on the semigroup $IO(B_n)$ of order-preserving injective transformations and on the semigroup $IC(B_n)$ of order-decreasing order-preserving injective transformations of ordered by inclusion of boolean B_n of set $N = \{1, 2, \dots, n\}$ is studied. We proved that all Green's relations for semigroups $IF(B_n)$ and $IC(B_n)$ are coinciding with the identity relation.

Вступ

Для кожної частково впорядкованої множини (M, \leq) природно виділяються два типи перетворень цієї множини (у загальному випадку також часткові, тобто визначені на деякій підмножині з M), у певному сенсі узгоджені з даним частковим порядком. Часткове перетворення α множини M називається *стискуючим* (або з *пониженням порядку*) (англ.: order-decreasing), якщо для довільного x із області визначення $dom \alpha$ перетворення α виконується нерівність $\alpha(x) \leq x$, і називається *монотонним* (або із *збереженням порядку*) (англ.: order-preserving), якщо для довільних $x, y \in dom \alpha$ із $x \leq y$ впливає $\alpha(x) \leq \alpha(y)$.

Як монотонні, так і стискуючі часткові перетворення множини (M, \leq) утворюють відносно композиції перетворень напівгрупи, які позначаються відповідно $PO(M, \leq)$ і $PF(M, \leq)$ (або просто $PO(M)$ і $PF(M)$, якщо відомо, про який частковий порядок йдеться). Зрозуміло, що кожна з них є піднапівгрупою напівгрупи $PT(M)$ усіх часткових перетворень множини M . Виділимо ще напівгрупу $PC(M) = PO(M) \cap PF(M)$ всіх *стискуючих часткових перетворень із збереженням порядку*. Зрозуміло, що напівгрупи перетворень множини M , узгоджених із частковим порядком на M , почали вивчатися з найпростішого випадку – коли M є скінченим ланцюгом. Так, напівгрупа O_n монотонних скрізь визначених перетворень n -елементного ланцюга вперше з'явилася ще в [1], а напівгрупа F_n скрізь визначених перетворень такого ланцюга – у книзі [9]. Комбінаторика напівгрупи F_n ґрунтовно вивчена в [7]. Особливо інтенсивно вивчення напівгруп перетворень скінченного ланцюга йшло протягом останніх двадцяти років (див. останню главу книги [5] і наведену там бібліографію). Але для інших часткових порядків такі напівгрупи почали вивчатися лише зовсім недавно (див. [2; 10]).

На перетворення множини M можуть накладатися додаткові обмеження. Зокрема, досить глибоко вивчена напівгрупа IO_n монотонних часткових ін'ективних перетворень n -елементного ланцюга (виділимо тут [4; 7]).

Елементи a і b напівгрупи S називаються *L-еквівалентними*, якщо вони породжують один і той же лівий головний ідеал (тобто aLb тоді й лише тоді, коли $S^1a = S^1b$). Аналогічно, за допомогою рівності $aS^1 = bS^1$, визначається *R-відношення*. Через породжених елементами a і b двосторонніх головних ідеалів визначається *J-відношення* (тобто aJb тоді й лише тоді, коли $S^1aS^1 = S^1bS^1$). Крім того, через H позначається перетин відношень L і R , а через D – найменше з відношень еквівалентності, яке містить кожне з відношень L і R (воно збігається з деморганівським добутком $L \circ R = R \circ L$ відношень L і R).

Ці п'ять відношень – L , R , J , H і D – називаються відношеннями Ґріна на напівгрупі S . Усі вони є відношеннями еквівалентності. Для скінчених напівгруп відношення J і D збігаються. Відношення Ґріна дозволяють визначити на напівгрупі щось на кшталт локальної системи координат, тому вони відіграють велику роль при вивченні бу-

дови напівгруп. Вивченню цих відношень для конкретних напівгруп присвячена величезна література (серед робіт, які безпосередньо стосуються до теми нашої роботи, вкажемо лише [3; 6; 8], де вивчалися відношення Гріна для напівгруп монотонних перетворень скінченного ланцюга).

Нагадаємо, що рангом $rank\alpha$ елемента α напівгрупи перетворень (S, M) називається потужність $|\alpha(M)|$ його образу $\alpha(M)$. Перетворення ми виконуємо зліва направо, тобто $(\varphi\psi)(x) = \psi(\varphi(x))$.

Через B_n позначимо булеан множини $N = \{1, 2, \dots, n\}$ – впорядковану за включенням множину всіх підмножин множини N , а через $IS(B_n)$ – напівгрупу всіх часткових ін'єктивних перетворень множини B_n .

У роботі вивчаються відношення Гріна на трьох напівгрупах перетворень булеану: $IF(B_n) = PF(B_n) \cap IS(B_n)$, $IO(B_n) = PO(B_n) \cap IS(B_n)$ та $IC(B_n) = PC(B_n) \cap IS(B_n)$.

Ми дотримуємося позначень із [5]. Зокрема, через $im\alpha$ позначається образ елемента α , тобто множина його значень.

Напівгрупа $IF(B_n)$

Теорема 1. Усі R -класи напівгрупи $IF(B_n)$ одноелементні.

Доведення. Припустимо, що елементи α і β належать до одного R -класу напівгрупи $IF(B_n)$. Тоді $\alpha \cdot IF(B_n) = \beta \cdot IF(B_n)$, а тому повинні існувати такі елементи γ і γ' , для яких виконуються рівності

$$\beta = \alpha\gamma, \quad \alpha = \beta\gamma'. \quad (1)$$

Зокрема, α і β будуть належати і до одного R -класу напівгрупи $IS(B_n)$, а тому $dom\alpha = dom\beta$. Візьмемо тепер довільний елемент A із $dom\alpha$. Із першої з рівностей (1) випливає, що $\beta(A) = \gamma(\alpha(A))$, а позаяк перетворення γ – стискуюче, то $\beta(A) \subseteq \alpha(A)$. Аналогічно з другої з рівностей (1) випливає, що $\alpha(A) \subseteq \beta(A)$. Тому $\beta(A) = \alpha(A)$. Оскільки елемент $A \in dom\alpha$ – довільний, то $\alpha = \beta$.

Теорема 2. Всі L -класи напівгрупи $IF(B_n)$ одноелементні.

Доведення. Припустимо, що елементи α і β належать до одного L -класу напівгрупи $IF(B_n)$. Аналогічно доведенню попередньої теореми звідси випливає рівність $im\alpha = im\beta$ та існування таких елементів δ і δ' , для яких виконуються рівності

$$\beta = \delta\alpha, \quad \alpha = \delta'\beta. \quad (2)$$

Оскільки елементи напівгрупи $IF(B_n)$ є частковими ін'єкціями, то для довільних $\mu \in IF(B_n)$ та $A' \in im\mu$ однозначно визначено прообраз $\mu^{-1}(A')$. Тоді для кожного $A \in im\alpha$ з першої з рівностей (2) випливає, що $\delta^{-1}(\alpha^{-1}(A)) = \beta^{-1}(A)$ і $\delta^{-1}(\beta^{-1}(A)) = \alpha^{-1}(A)$. Позаяк перетворення δ є стискуючим, то $\beta^{-1}(A) \supseteq \alpha^{-1}(A)$. Аналогічно з другої з рівностей (2) випливає, що $\beta^{-1}(A) \subseteq \alpha^{-1}(A)$. Тому $\beta^{-1}(A) = \alpha^{-1}(A)$. Звідси і з рівності $im\alpha = im\beta$ слідує, що $\alpha = \beta$.

З теорем 1 і 2 безпосередньо випливають такі наслідки:

Наслідок 1. Усі D -класи напівгрупи $IF(B_n)$ є одноелементними.

Наслідок 2. Усі відношення Гріна на напівгрупі $IF(B_n)$ збігаються з відношенням рівності.

Напівгрупа $IO(B_n)$

Теорема 3. Для того, щоб елементи α і β напівгрупи $IO(B_n)$ належали до одного R -класу, необхідно й достатньо, щоб виконувалася рівність $dom\alpha = dom\beta$ і для довільних A_1, A_2 із $dom\alpha$ виконувалася умова:

$$\alpha(A_1) \subset \alpha(A_2) \text{ тоді й лише тоді, коли } \beta(A_1) \subset \beta(A_2). \quad (3)$$

Доведення. Необхідність. Нехай елементи α і β належать до одного R -класу напівгрупи $IO(B_n)$. Тоді повинні існувати такі елементи γ і γ' , для яких виконуються рівності

$$\beta = \alpha\gamma, \quad \alpha = \beta\gamma'. \quad (4)$$

Тому α і β будуть належати і до одного R -класу напівгрупи $IS(B_n)$, звідки випливає рівність $dom\alpha = dom\beta$.

Припустимо тепер, що для елементів $A_1, A_2 \in dom\alpha$ виконується включення $\alpha(A_1) \subset \alpha(A_2)$. Тоді з першої з рівностей (4) та монотонності перетворення γ випливає, що

$$\beta(A_1) = \gamma(\alpha(A_1)) \subset \gamma(\alpha(A_2)) = \beta(A_2).$$

Аналогічно з другої з рівностей (4) та монотонності перетворення γ' випливає, що коли $\beta(A_1) \subset \beta(A_2)$, то $\alpha(A_1) \subset \alpha(A_2)$. Тому $\alpha(A_1) \subset \alpha(A_2)$ тоді й лише тоді, коли $\beta(A_1) \subset \beta(A_2)$.

Достатність. Із рівності $dom\alpha = dom\beta$ та ін'єктивності перетворень α і β випливає, що $|im\alpha| = |im\beta|$. Тому кожне з перетворень

$$\gamma: im\alpha \rightarrow im\beta, \quad \alpha(A) \mapsto \beta(A),$$

та

$$\gamma': im\beta \rightarrow im\alpha, \quad \beta(A) \mapsto \alpha(A),$$

є ін'єктивним. Крім того, з умови (3) випливає, що кожне з цих перетворень є монотонним. Тому γ і γ' належать напівгрупі $IO(B_n)$. Оскільки ці перетворення задовольняють рівності (4), то α і β належать до одного R -класу.

Наслідок 3. Нехай $\alpha \in IO(B_n)$, а φ – довільний автоморфізм іта частково впорядкованої за включенням множини. Тоді $\alpha R \alpha \varphi$.

Зауважимо, що елементи напівгрупи $IO(B_n)$ є частковими ін'єкціями. Тому для довільних $\mu \in IO(B_n)$ та $A \in \text{im} \mu$ однозначно визначено прообраз $\mu^{-1}(A)$.

Теорема 4. Елементи α і β напівгрупи $IO(B_n)$ належать до одного L -класу тоді й лише тоді, коли виконується рівність $\text{im} \alpha = \text{im} \beta$ і для довільних A_1, A_2 із $\text{im} \alpha$ виконується умова:

$$\alpha^{-1}(A_1) \subset \alpha^{-1}(A_2) \text{ тоді й лише тоді, коли } \beta^{-1}(A_1) \subset \beta^{-1}(A_2). \quad (5)$$

Доведення. Необхідність. Нехай елементи α і β належать до одного L -класу. Подібно як у доведенні попередньої теореми звідси випливає рівність $\text{im} \alpha = \text{im} \beta$ та існування таких елементів δ і δ' , для яких виконуються рівності

$$\beta = \delta \alpha, \quad \alpha = \delta' \beta. \quad (6)$$

Нехай $\text{im} \alpha = \{A_1, \dots, A_k\}$. Позначимо $P_i = \alpha^{-1}(A_i)$, $Q_i = \beta^{-1}(A_i)$, $i = 1, \dots, k$. Тоді $\text{dom} \alpha = \{P_1, \dots, P_k\}$, $\text{dom} \beta = \{Q_1, \dots, Q_k\}$.

Із рівностей (6) та ін'єктивності перетворень випливає, що для всіх i

$$\delta(P_i) = Q_i, \quad \delta'(Q_i) = P_i. \quad (7)$$

У свою чергу з рівностей (7) та монотонності перетворень δ і δ' випливає, що $P_i \subset P_j$ тоді і тільки тоді, коли $Q_i \subset Q_j$. Отже, умова (5) виконується.

Достатність. Нехай

$$\text{im} \alpha = \text{im} \beta = \{A_1, \dots, A_k\}, \quad P_i = \alpha^{-1}(A_i), \quad Q_i = \beta^{-1}(A_i), \quad i = 1, \dots, k.$$

Тоді $\text{dom} \alpha = \{P_1, \dots, P_k\}$, $\text{dom} \beta = \{Q_1, \dots, Q_k\}$. Із умови (5) випливає, що кожне з ін'єктивних відображень

$$\delta: \text{dom} \beta \rightarrow \text{dom} \alpha, \quad Q_i \mapsto P_i, \quad i = 1, \dots, k,$$

та

$$\delta': \text{dom} \alpha \rightarrow \text{dom} \beta, \quad P_i \mapsto Q_i, \quad i = 1, \dots, k,$$

є монотонним, а тому належить напівгрупі $IO(B_n)$. Безпосередньо перевіряється, що δ і δ' задовольняють рівності (6). Тому α і β належать до одного R -класу.

Наслідок 4. Нехай $\alpha \in IO(B_n)$, а ψ – довільний автоморфізм $\text{dom} \alpha$ частково впорядкованої за включенням множини. Тоді $\psi \alpha R \alpha$.

Наслідок 5. Елементи α і β напівгрупи $IO(B_n)$ будуть належати до одного H -класу тоді і лише тоді, коли виконуються такі умови:

- 1) $\text{dom} \alpha = \text{dom} \beta$;
- 2) $\text{im} \alpha = \text{im} \beta$;
- 3) $\alpha(A_1) \subset \alpha(A_2) \Leftrightarrow \beta(A_1) \subset \beta(A_2)$ для довільних $A_1, A_2 \in \text{dom} \alpha$;
- 4) $\alpha^{-1}(A'_1) \subset \alpha^{-1}(A'_2) \Leftrightarrow \beta^{-1}(A'_1) \subset \beta^{-1}(A'_2)$ для довільних $A'_1, A'_2 \in \text{im} \alpha$.

Доведення. Це безпосередньо випливає з рівності $H = L \cap R$ та теорем 3 і 4.

Теорема 5. Якщо елементи α і β напівгрупи $IO(B_n)$ належать до одного D -класу, то $\text{dom} \alpha \cong \text{dom} \beta$ і $\text{im} \alpha \cong \text{im} \beta$ як частково впорядковані за включенням множини.

Доведення. Оскільки $D = R \circ L$, то $\alpha D \beta$ тоді й лише тоді, коли існує такий елемент μ , що $\alpha R \mu$ і $\mu L \beta$. Із теорем (3) і (4) тепер випливає, зокрема, що елементи α , β , і μ мають однаковий ранг. Нехай

$$\begin{aligned} \text{dom} \alpha &= \{A_1, \dots, A_k\}, \quad \text{im} \alpha = \{C_1, \dots, C_k\}, \\ \text{dom} \beta &= \{A'_1, \dots, A'_k\}, \quad \text{im} \beta = \{C'_1, \dots, C'_k\}, \\ \text{dom} \mu &= \{A''_1, \dots, A''_k\}, \quad \text{im} \mu = \{C''_1, \dots, C''_k\}, \end{aligned}$$

причому

$$\alpha(A_i) = C_i, \quad \beta(A'_i) = C'_i, \quad \mu(A''_i) = C''_i, \quad i = 1, \dots, k.$$

На підставі теореми (3) можемо покласти $A_i = A''_i$ ($i = 1, \dots, k$) і матимемо, що $C_i \subset C_j$ тоді й лише тоді, коли $C''_i \subset C''_j$. З другого боку на підставі теореми (4) можемо покласти $C'_i = C''_i$ ($i = 1, \dots, k$) і матимемо, що $A'_i \subset A'_j$ тоді й лише тоді, коли $A''_i \subset A''_j$. Таким чином, $A_i \subset A_j$ тоді й лише тоді, коли $A'_i \subset A'_j$, тобто $\text{dom} \alpha$ і $\text{dom} \beta$ ізоморфні як частково впорядковані за включенням множини. Аналогічно $C_i \subset C_j$ тоді й лише тоді, коли $C'_i \subset C'_j$, тобто $\text{im} \alpha$ і $\text{im} \beta$ також ізоморфні.

Зауваження. Умови теореми (5) не є достатніми для належності елементів α і β напівгрупи $IO(B_n)$ до одного D -класу. Справді, для елементів

$$\alpha = \begin{pmatrix} \{1,2\} & 1 & 3 & \emptyset \\ \{1,2,3\} & \{1,2\} & 1 & \emptyset \end{pmatrix} \quad \text{і} \quad \beta = \begin{pmatrix} \{1,2\} & 1 & 3 & \emptyset \\ \{1,2,3\} & 1 & \{1,2\} & \emptyset \end{pmatrix}$$

напівгрупи $IO(B_3)$ маємо навіть $\text{dom} \alpha = \text{dom} \beta$ і $\text{im} \alpha = \text{im} \beta$. Однак легко перевіряється, що ці елементи не належать до одного D -класу.

Напівгрупа $IC(B_n)$

Теорема 6. Усі відношення Гріна на напівгрупі $IC(B_n)$ збігаються з відношенням рівності.

Доведення. Оскільки $IC(B_n)$ є піднапівгрупою $IF(B_n)$, то з рівностей (1) випливає, що кожен R -клас напівгрупи $IC(B_n)$ буде міститися в деякому R -класі напівгрупи $IF(B_n)$. Але тоді з теореми (1) випливає, що на напівгрупі $IC(B_n)$ R -відношення збігається з відношенням рівності. Аналогічно з теореми (2) випливає, що L -відношення також збігається з відношенням рівності. Для решти відношень Гріна твердження теореми випливає з рівностей $H = L \cap R$, $D = L \circ R$ і $J = D$.

Висновки

В роботі розглянуто відношення Гріна на трьох напівгрупах часткових ін'єктивних перетворень булеану: $IF(B_n)$, $IO(B_n)$ та $IC(B_n)$. Показано, що для напівгруп $IF(B_n)$ і $IC(B_n)$ усі відношення Гріна співпадають з відношенням рівності. Для відношень Гріна L , R і H на напівгрупі $IO(B_n)$ знайдено необхідні і достатні умови належності елементів до одного класу та встановлено необхідні умови належності елементів даної напівгрупи до одного D -класу.

1. Айзенштат А.Я. Определяющие соотношения полугруппы эндоморфизмов конечного линейно упорядоченного множества // Сиб. матем. ж. – 1962. – Т. 3, № 4. – С. 161-169. 2. Стронська Г.О. Напівгрупа стискуючих перетворень булеану скінченної множини // Вісник Київського університету. Серія: Фіз.-мат. науки. – 2006. – № 2. – С. 57-62. 3. Fernandes V.H. Semigroups of order-preserving mapping on a finite chain: a new class of divisors // Semigroup Forum. – 1997. – Vol. 54, № 2. – P. 230-236. 4. Fernandes V.H. The monoid of all injective order-preserving partial transformations on a finite chain // Semigroup Forum. – 2001. – № 62. – P. 178-204. 5. Ganyushkin O., Mazorchuk V. Classical Finite Transformation Semigroups. An Introduction. – Algebra and Applications. – London: Springer-Verlag, 2009. – № 9. – XII, 314 p. 6. Ganyushkin O., Mazorchuk V. On the Structure of IO_n // Semigroup Forum. – 2003. – № 66. – P. 455-483. 7. Howie J. Combinatorial and arithmetical aspects of the theory of transformation semigroups // Seminario do Centro de Algebra, University of Lisbon. – 1992. – P. 1-14. 8. Laragji A., Umar A. Combinatorial results for semigroups of order-preserving partial transformations // J. Algebra. – 2004. – Vol. 278, № 1. – P. 342-359. 9. Pin J. Variétés de langages formels. – Paris: Masson, 1984. – 160 p. 10. Stronska A. Nilpotent subsemigroups of a semigroup of order-decreasing transformations of a rooted tree // Algebra and Discrete Mathematics. – 2006. – № 4. – P. 126-140.

Надійшла до редколегії 31.10.11

УДК 512.552

Т. Журавльова, асп.

ТОЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ МОДУЛІВ І ГОМОМОРФІЗМІВ НАД ЧЕРЕПИЧНИМ ПОРЯДКОМ

Побудована точна послідовність модулів над черепичним порядком. Описані ядра цієї послідовності.

The exact sequence of modules over tiled order has been built. Kernels of this sequence are described.

1. Вступ

Нехай A – кільце, M – правий A -модуль. Для довільних A -підмодулів X_1, X_2 модуля M існує коротка точна послідовність $0 \rightarrow X_1 \cap X_2 \rightarrow X_1 \oplus X_2 \rightarrow X_1 + X_2 \rightarrow 0$.

В [4] Jansen W. і Odenthal C. для обчислення глобальної розмірності черепичного порядку використовували коротку точну послідовність з трьома незвідними модулями, а Sakai Y. в [1] отримав точну послідовність $0 \rightarrow X_1 \cap X_2 \cap X_3 \rightarrow (X_1 \cap X_2) \oplus (X_2 \cap X_3) \oplus (X_1 \cap X_3) \rightarrow X_1 \oplus X_2 \oplus X_3 \rightarrow X_1 + X_2 + X_3 \rightarrow 0$ і в окремих випад-

ках знайшов ядро ψ точної послідовності $\bigoplus_{i=1}^m (X_i \cap X_{i-1}) \xrightarrow{\psi} \bigoplus_{i=1}^m X_i \rightarrow \sum_{i=1}^m X_i \rightarrow 0$.

У даній статті ми поширюємо точну послідовність для більшої кількості незвідних модулів над черепичним порядком.

2. Необхідні теоретичні відомості

Означення 1. Модуль M називається дистрибутивним, якщо для довільних його підмодулів K, L, N справедлива рівність $K \cap (L + N) = K \cap L + K \cap N$.

Очевидно, що підмодуль та фактор-модуль дистрибутивного модуля є дистрибутивним. Модуль називається напівдистрибутивним, якщо він є прямою сумою дистрибутивних модулів. Кільце A називається напівдистрибутивним справа (зліва), якщо правий (лівий) регулярний модуль A_A (${}_A A$) є напівдистрибутивним. Напівдистрибутивне справа та зліва кільце називається напівдистрибутивним.

Очевидно, що кожний ланцюговий модуль є дистрибутивним модулем та кожний напівланцюговий модуль є напівдистрибутивним модулем.

Означення 2. Кільце ендоморфізмів нерозкладного проективного модуля над напівдосконалим кільцем називається головним кільцем ендоморфізмів.

Ми будемо писати $SPSD$ -кільце A для напівдосконалого напівдистрибутивного кільця A .

Означення 3. Кільце A називається напівмаксимальним, якщо воно є напівдосконалим напівпервинним нетеровим кільцем таким, що для довільного локального ідемпотента $e \in A$ кільце eAe є дискретно нормованим кільцем (не обов'язково комутативним), тобто всі головні кільця ендоморфізмів кільця A є дискретно нормованими кільцями.

Твердження 1. [2] Напівмаксимальне кільце є прямим добутком скінченного числа первинних напівмаксимальних кілець.

Теорема 1. [2] Наступні умови для напівдосконалого напівпервинного нетероного справа кільця A еквівалентні:

(а) кільце A – напівдистрибутивне;