

ОРТОДОНТИЧНИЙ РОЗДІЛ

УДК 616.314-089.23(048)+616-092

I. В. Ковач, д. мед. н., О. Ю. Біндюгін

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України»

ДЕНСИТОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ДІАГНОСТИЦІ РЕЦІДИВУ ТОРТОАНОМАЛІЇ

В даний час використання рентгенографії в діагностиці патологічних процесів є стандартною частиною будь-якого комплексного дослідження при плануванні та лікуванні в стоматології і є обов'язковим документом при проведенні будь-якого втручання. Однак при стандартній рентгенографії виходить єдине площинне зображення, де всі об'єкти розташовані послідовно та накладаються один на одного, що в підсумку призводить до певного проекційного спотворення, яке безсумнівно позначається на інтерпретації отриманих даних і, як результат, невірного призначення лікування.

Разом з тим, етіологія та патогенез розвитку рецидивів тортоаномалій ще не достатньо вивчені. В зв'язку з чим проведено клінічне обстеження пацієнтів з рецидивами тортоаномалій зубів та відповідні рентгенологічні дослідження з використанням методу конусно-променевої комп'ютерної томографії. Вимірювання щільності кісткової тканини шляхом проведення денситометричних досліджень у випадках діагностики рецидиву сприяли формуванню більш об'єктивної доказової бази для встановлення діагнозу та розробки алгоритму надання кваліфікованої допомоги щодо подолання наслідків повернення зубів у початкове положення та супутньої деструкції кісткової тканини. Використання інновацій сучасної променевої діагностики захворювань щелепно-лицевої ділянки робить працю лікаря більш прогнозованою, що неодмінно позитивно відіб'ється на загальних результатах роботи і буде сприяти підвищенню рівня освіченості лікаря. Впровадження в стоматологічну практику даних КТ сприяє фаховій діагностичі патологічних процесів, що в підсумку відіграє вирішальну зasadничу роль при формуванні напрямків проведення стоматологічних втручань.

Ключові слова: конусно-променева комп'ютерна томографія, тортоаномалії, циркулярна супракрісталічна фібротомія, панорамна томографія, денситометрія.

І. В. Ковач, А. Ю. Біндюгин

Государственное учреждение «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины»

ДЕНСИТОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ РЕЦИДИВА ТОРТОАНОМАЛИИ

В настоящее время использование рентгенографии в диагностике патологических процессов является стандартной частью любого комплексного исследования при планировании и лечении в стоматологии и является обязательным документом при проведении любого вмешательства. Однако при стандартной рентгенографии получается единое плоскостное изображение, где все объекты расположены последовательно и накладываются друг на друга, что в итоге приводит к определенному проекционному искажению, которое, несомненно, сказывается на интерпретации полученных данных и, как результат, неверного назначения лечения.

Вместе с тем, этиология и патогенез развития рецидивов тортоаномалий еще не достаточно изучены. В связи с чем проведено клиническое обследование пациентов с рецидивами тортоаномалий зубов и соответствующие рентгенологические исследования с использованием метода конусно-лучевой компьютерной томографии. Измерение плотности костной ткани путем проведения денситометрических исследований в случаях диагностики рецидива способствовали формированию более объективной доказательной базы для установления диагноза и разработки алгоритма оказания квалифицированной помощи по преодолению последствий возврата зубов в исходное положение и сопутствующей деструкции костной ткани. Использование инноваций в современной лучевой диагностике заболеваний челюстно-лицевой области делает работу врача более прогнозируемой, что непременно положительно отразится на общих результатах работы и будет способствовать повышению уровня образованности врача. Внедрение в стоматологическую практику данных КТ способствует профессиональной диагностике патологических процессов, что в итоге играет решающую основополагающую роль при формировании направлений проведения стоматологических вмешательств.

Ключевые слова: конусно-лучевая компьютерная томография, тортоаномалии, циркулярная супракрісталічна фібротомія, панорамна томографія, денситометрія.

I. V. Kovach, O. Ju. Bindjugin

State institution "Dnipropetrovsk medical Academy of the Ministry of health of Ukraine"

DENSITOMETRIC STUDIES IN THE DIAGNOSIS OF RECURRENCE OF TARTOANOMALIES

ABSTRACT

Currently, the use of radiography in the diagnosis of pathological processes is a standard part of any comprehensive study in the planning and treatment of dentistry and is a mandatory document in any intervention. However, with standard radiography, a single planar image is obtained, where all objects are located consequently and overlap, which ultimately leads to a certain projection

distortion, which undoubtedly affects the interpretation of the data obtained and, as a result, the wrong purpose of treatment.

However, the etiology and pathogenesis of recurrence of tartoanomalies still not well understood.

In connection with which a clinical examination of patients with recurrences of tartoanomalies teeth and related x-ray examinations using the method of cone-beam computed tomography. Measurement of bone density through densitometry studies in cases of relapse diagnosis contributed to the formation of a more objective evidence base for diagnosis and development of an algorithm for providing qualified assistance to overcome the consequences of returning teeth to their original position and concomitant destruction of bone tissue.

The use of innovations in the modern radiation diagnosis of diseases of the maxillofacial area makes the work of the doctor more predictable, which will certainly have a positive impact on the overall results of the work and will help to improve the level of education of the doctor. The introduction into dental practice of CT data contributes to the professional diagnosis of pathological processes, which ultimately plays a crucial fundamental role in the formation of areas of dental interventions.

Key words: cone-beam computed tomography, tartoanomalies, circular supra crystal fibro tomia, panoramic imaging, densitometry.

Відомо, що діагностика і лікування тортоаномалій, які виникають в результаті недостачі місця в зубному ряді для окремих зубів, наявності надкомплектних зубів, звуження зубних рядів та довгострокове і стабільне збереження отриманих результатів є актуальними в сучасній ортодонтії [2, 3, 5]. Після створення місця в зубному ряду для зуба з тортоаномалією та встановлення його у правильному положенні за допомогою знімних і незнімних ортодонтических апаратів відбувається натяжіння зв'язок періодонта, що і є основною причиною рецидув тортоаномалії [1, 2, 4]. Крім того, рецидив після ортодонтичного лікування може відбуватись також внаслідок особливостей оклюзійних співвідношень, генетично обумовленої невідповідності розмірів і форми зубів верхньої та нижньої щелеп, продовження росту щелеп, міофункціональної невідповідності внаслідок перерозподілу тонусу жувальних м'язів після закінчення дії ортодонтичного навантаження [4,5,7-9]. У зв'язку із цим для забезпечення ефективності лікування потрібен тривалий ретенційний період впродовж 1,5-2 років.

На жаль, ускладнення, які спостерігаються після ліквідації ротацій зубів, стають очевидними лише після візуальної суб'єктивної оцінки самим пацієнтом. Саме тому рання діагностика патологічних змін на тканинному рівні, від якості якої безпосередньо залежить рівень призначеної

терапії для ліквідації наслідків рецидуву, є дуже важливою для лікаря-ортодонта [2, 5-8].

В даний час використання рентгенографії в діагностиці патологічних процесів є стандартною частиною будь-якого комплексного дослідження при плануванні та лікуванні в стоматології і є обов'язковим документом при проведенні будь-якого втручання [1, 2, 4-6]. Однак при стандартній рентгенографії виходить єдине площинне зображення, де всі об'єкти розташовані послідовно та накладаються один на одного, що в підсумку призводить до певного проекційного спотворення, яке безсумнівно позначається на інтерпретації отриманих даних і, як результат, невірного призначення лікування [2].

Зміна мислення лікаря при діагностиці захворювань безпосередньо пов'язана з появою комп'ютерної томографії (КТ). На відміну від коносно-проміневої комп'ютерної томографії (КПКТ), при якій повністю сканується тривимірний об'єкт, при дослідженні за допомогою комп'ютера лікар отримує точну копію всієї зони дослідження, що надає ортодонту реальне зображення, а також двомірні зображення у фронтальній, сагітальній і похилій площинах з можливостями подальшого вивчення сканованого об'єкта у всіх площинах і на будь-якій глибині [2, 5, 6].

Однак, незважаючи на великі можливості для проведення адекватної діагностики із застосуванням КТ в ортодонтії, даний метод майже не використовується, що пов'язано в основному з відсутністю певних навичок при роботі з комп'ютерними томограмами і мотивацією для виконання даного дослідження у лікарів-ортодонтів.

Мета нашого дослідження. Вивчення ролі денситометричних досліджень з використанням КТ в ранній діагностиці рецидув тортоаномалії для обґрунтування та вибору методу лікування із застосуванням гіперкорекції без проведення операції циркулярної супракристалічної фібротомії (CSF) та розсічення ясенного сосочка.

Матеріали та методи дослідження. Нами було обстежено 17 пацієнтів з рецидувами тортоаномалій зубів. Для вивчення ступеню тортоаномалії та дефіциту місця при ротації зубів, проведення діагностики рецидув нами було застосовано клінічні й антропометричні методи дослідження. Для діагностики резорбції кісткової тканини в зоні рецидув тортоаномалії, вивчення стану кісткової тканини в умовно «хворій ділянці», положення коренів зубів і порівняння з ненуроженою зоною використовували рентгенологічні методи дослідження, а також проводили порівнювальну характеристику панорамної томографії (ортопантомографії) і КТ. Використовували дані латеральної цефалометрії і аналіз за Бой-

рком за допомогою комп'ютерної програми.

Результати дослідження та їх обговорення. Клінічний випадок. Пацієнта (А.Б.) 1986 р.н. звернулась в стоматологічну клініку з метою виправлення зубів фронтальної ділянок верхньої і нижньої щелеп.

Внутрішньоротове обстеження виявило: 1. Пародонтологічний статус: Хронічний генералізований пародонтит 1 ступеню тяжкості, рентгенологічно виявлено деструкцію компактної пластинки на верхівках міжальвеолярних перегородок (рис. 1).



Рис. 1. ОПТГ на етапі діагностики.

2. Гнатологічний статус: правильні фісурно-буторкові контакти симетрично з правої та лівої сторони - клас 1 за Енглем. Відсутність аномалій в трансверзалній і вертикальній площинах відповідно. На КДМ моделях після проведення біометричних досліджень за Pont, Tonn, Linder and Hart, Снагіною було виявлено незначне симетричне звуження верхнього і нижнього зубних рядів в ділянках молярів і премолярів на 3,5 і 2.9 мм. відповідно. При вимірюванні довжини фронтальної ділянки верхнього і нижнього зубних рядів за Korkhaus виявлено зменшення довжини фронтальних ділянок в/щ і н/щ на 3,1 і 1 мм. Відповідно (табл. 1).

Виявлені ротації 12, 22 зубів легкого ступеню (до 45°) тортоаномалію ротація 43 зубу більш виражена більше 45°.

Була проведена цефалометрія латеральної ТРГ за Байорком з використанням комп'ютерної програми. (В тексті надаються деякі параметри, зважаючи на формат наукової статті).

Таблиця 1

Аналіз ТРГ до лікування

Сагітальне співвідношення щелеп ss-n-sm(ANB)	3.7	N=3	0.7
Прогнатія верхньої щелепи (SNA) s-n-ss	81.1	N=82	0.9
Прогнатія нижньої щелепи (SNB)	77.3	N=79	-1.7
Нахил різців верхньої щелепи ILs/NL	102.0	N=110	-8.0
Нахил різців нижньої щелепи ILi/ML	90.1	N=94	-3.9
Показник WITS Wits	1.1	0	1.1
Вертикальне співвідношення щелеп (Кут основ щелеп) NL/ML	27.1	N=25	2.1
Кут нижньої щелепи M L-ar	118.3	N=126	-7.7
Горизонтальна щілина у фронт. діл. щел. Overjet	3.2	N=3	0.2
Вертикальне перекриття у фронт. діл. щел. Overbite	-0.5	N=2.5	3.0

Аналіз отриманих параметрів засвідчив про відсутність скелетної патології в сагітальній та вертикальній площині, значення кутів **ILs/NL** і **ILi/ML** істотно свідчили про можливість проведення лікування без видалення постійних зубів, з застосуванням техніки міжапроксимальної сепарації паралельно з використанням незнімної апаратури (рис. 2).



Рис. 2. До лікування.

Протокол лікування:
Leveling and elimination of rotations (Вирівнювання)

2015.03.U 0.14 Ni-Ti
 2015.05. U 0.16 Ni-Ti, L 0.14 Ni-Ti
 2015.07.U 0.16/0.22 Ni-Ti ,L 0.16 Ni-Ti
 2015.10.U 0.16/0.22 ss ,L 0.16/0.22 Ni-Ti
 2015.12. L 0.16/0.22 ss

9 місяців

Detailing(деталізація)

2016.02.U 0.18/0.25 ss

2016.03.L 0.18/0.25 ss

2016.06.U 0.19/0.25 ss

Debonding(зняття апарату)

2016.08

6 місяців

Загальна тривалість лікування склала 17 місяців.

По закінченню була проведена повторна **цефалометрія**, що засвідчила відповідні нормальні показники кутів після закінчення активної фази лікування (табл. 2).

Таблиця 2

Аналіз ТРГ після лікування

Сагітальне співвідношення щелеп ss-n-sm(ANB)	3.8	N=3	0.8
Прогнатія верхньої щелепи (SNA)	81.1	N=82	0.9
Прогнатія нижньої щелепи (SNB)	77.3	N=79	-1.7
Нахил різців верхньої щелепи ILs/NL	105.3	N=110	-4.7
Нахил різців нижньої щелепи ILi/ML	94.1	N=94	0.1
Показник WITS Wits	1.1	0	1.1
Вертикальне співвідношення щелеп (Кут основ щелеп) NL/ML	27.1	N=25	2.1
Кут нижньої щелепи M L-ag	118.3	N=126	-7.7
Горизонтальна щілина у фронт. діл. щел. Overjet	3.2	N=3	0.2
Вертикальне перекриття у фронт. діл. щел. Overbite	-0.5	N=2.5	3.0

Ретенція. Ретенцію було забезпечено двома незнімними ретейнерами 3-3 відповідно на верхню і нижню щелепи та були дані рекомендації стосовно носіння знімного ретейнера по типу капа в нічний час. Активна фаза ретенції була розрахована на тривалий час в зв'язку з категоричною відмовою зі сторони пацієнтки на проведення операції супракристалічної циркулярної фібромотії (CSF).

Пацієнка регулярно здійснювала профілактичні гігієнічні процедури, своєчасно відвідувала стоматологічний кабінет з метою підтримування належної гігієни ротової порожнини. Після перших 6 місяців ретенційного періоду візуально спостерігався незначний рецидив тортоаномалії 43 в бік переміщення зубу з гіпервідкоректованої позиції до нормальної. В цей період рентгенологічне обстеження проведено не було, зауваживши на нормальній стан зубів і відсутність скарг з боку пацієнтки. В наступні (через півроку від останнього прийому) відвідування пацієнка поскаржилася на неприємні відчуття в ділянці передніх зубів н/щ і відсутність нормальніх контактів у фронтальній ділянці, але візуально стан тканин пародонту не мав патологічних ознак

(рис. 3).




Рис. 3. ОПТГ в момент закінчення активної фази лікування.

Було проведено пародонтологічне обстеження пацієнтки, в результаті якого виявлено: глибина пародонтальних кишен в проекції 41-43 зубів дорівнює від 1 до 2 мм, таким чином зубояснене прикріплення не порушене, що є гарною передумовою ефективного проведення повторного лікування.

Пацієнці було проведено рентгенологічне обстеження з допомогою панорамної томографії (ортопатомографії) і визначено, що в зоні 41-43 зубів спостерігається поглиблення періодонтальної щілини дистальної поверхні корня 43 зубу.

Але між тим, в очі впадала явна невідповідність між клінічною картиною в ротовій порожнині і рентгенологічним малюнком зони ураження на панорамній томограмі. Тому було прийняте рішення: на початку проведення повторного ортодонтичного лікування на н/щ, після фіксації незнімної апаратури провести комп'ютерну томографію (КТ) за допомогою конусно-проміневого томографу. Використання данної технології дало б можливість якщо не з'ясувати причини рецидуву, то надати матеріал для глибокої морфологічної оцінки стану резорбції кісткової тканини в ураженій ділянці, і наслідків рецидуву.

На сагітальному реформаті (рис.4, 5) КТ спостерігаємо значну деструкцію вестибулярної

поверхні кортикальної кістки в проекції 41,42,43 зубів внаслідок неконтрольованого переміщення вищезазначених зубів: 43 зубу в первісне (тобто тортоаномальне положення), і 41,42 зубів в вестибулярному напрямку. Зважаючи на підвищено рухливість зубів, яка є наслідком травматичної оклюзії і патологічної втрати альвеолярного гребеня, вона активізувала дистрофічно-деструктивні процеси в кістковій тканині пародонта, посилючи остеокластичну резорбцію. Запалення і, як наслідок резорбція кістки сприяє зниженню висоти альвеолярного гребеня, що досить чітко засвідчує вивчення результатів КТ. Товщина вестибулярної поверхні кортикальної кістки істотно знижена (від 0.2 до 1.1 мм.) в ділянках коренів 43,42,41 зубів.



Рис. 4. Зона 42 зуба

Після закінчення повторного лікування на н/щ (2017.8.-2017.11.) на лінгвальну поверхню в ділянці 34-44 зубів було встановлено незнімний ретейнер з скла-волокна, нетипова фіксація ретейнера на перших пре молярах н/щ була зумовлена потребою в більш надійній фіксації зубів фронтальної ділянки н/щ. З огляду на значні процеси резорбції кісткової тканини, виявлені на КТ стало питання в доцільноті проведення операції CSF в проекції кореня 43 зубу, в зв'язку з обґрунтованим ризиком порушення зубоясенного прикріплення і як наслідок втрата 43 зубу. Терміни відвідування лікаря-ортодонта були запропоновані звичайні: раз на півроку паралельно з відвідуванням лікаря-стоматолога для проведення пародонтологічних втручань.

За один рік після дослідження була проведена повторна КТ, яка мала на меті визначити наявність, чи відсутність апозиційного росту в пошкоджений ділянці н/щ. Потреби в порівняльній діагностиці між панорамною томографією і КТ не було, тому вивчались данні тільки КТ н/щ. В



Рис. 5. Зона 43 зуба

проекції фронтальної ділянки 41-43 зубів спостерігається зникнення вогнищ резорбції кісткової тканини вестибулярної поверхні кортикальної пластинки, звуження періодонтальної щілини в проекції кореня 43 зубу внаслідок стабілізації процесу переміщення зубів у зворотному напрямку. Наявність апозиційного росту в ділянці проекцій коренів 42-43 зубів визначається візуально і при дослідженні сагітальних, корональних, 3-Д реформатів та при побудові крос-секційної моделі. Позитивна динаміка підтверджується проведеним вимірюванням оптичної щільності кісткової тканини по шкалі Хаунсфільда за допомогою функції денситометрії, що визначає ступень кальцінації кісткової тканини. Вимірювання були проведені як в процесі лікування так і на другій томограмі після його закінчення.

Отримані результати відображені в цифрах так і вигляді графіка. Результати, які отримані в вигляді цифр дуже відносні, тому особливе значення має графік, який візуально дозволяє оціні-

ти щільність ремодельованої кісткової тканини після завершення ортодонтичного лікування в ретенційному періоді. На рис. 6 представлено сагітальний реформат 43 зубу в процесі лікування. При проведенні денситометрії визначено: товщина вестиб. кортикальної пластинки складає 0.1-0.4 мм. при щільноті кісткової тканини 470 HU.




Рис. 6. Сагітальний реформат рецидиву.

При повторному вимірюванні (рис.7) товщина складає 1.3 мм при щільноті 600 HU, що є свідченням стабілізації деструктивного процесу, початку відновлення трофіки, наявності аппозиційного росту в пошкоджений ділянці. Тобто мова йде про стабілізацію патологічного процесу, що було доведено результатами досліджень.



Рис. 7. Сагітальний реформат стабілізація.

Таким чином, у ортодонтичних пацієнтів з рецидивами поворотів окремих зубів (рецидиви тортоаномалій) на фоні генералізованого пародонтиту, при проведенні діагностики актуальним є той факт, що використання комп'ютерної томографії надає значні переваги перед стандартними методиками рентген-діагностики при розпізнаванні патологічного процесу, завдяки наявності електронних пристрій для вимірювання показників, необхідних для встановлення об'єктивної і неупередженої картини тяжкості патологічних процесів і методів їх вирішення. Завдячуючи проведений КТ відпала необхідність в проведенні операції CSF- циркулярної супракристалічної фібротомії в ділянці 43 зубу.

Висновки. 1. При рентген-діагностиці рецидивів ортодонтичних тортоаномалій доцільно використання комп'ютерних томограм, що сприяє якісному встановленню рівня морфологічних і структурних порушень і надає більш об'ємну і реалістичну картину важкості протікання патологічного процесу.

2. Використання інновацій сучасної променевої діагностики захворювань щелепно-лицевої ділянки робить працю лікаря більш прогнозованою, що неодмінно позитивно відіб'ється на загальних результатах роботи і буде сприяти підвищенню рівня освіченості лікаря.

3. Впровадження в стоматологічну практику даних КТ сприяє фаховій діагностиці патологічних процесів, що в підсумку стає останньою інстанцією в дискусії застосування чи незастосування оперативного втручання.

Список літератури

1. **Фліс П. С.** Оцінка результатів лікування ортодонтичної патології у період змінного прикусу / П. С. Фліс, В.В. Філоненко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Нові технології в стоматології і щелепно-лицевій хірургії». – Харків, – 2006. – С. 26-28.
 2. **Рогацкін Д.В.** Конусно-лучевая компьютерная томография / Рогацкін Д.В. – Львов.: ГалДент 2010. – 235 с.
 3. **Каливраджіян Э. С.** Особенности ортодонтического лечения сагиттальных и трансверзальных аномалий окклюзии в ретенционный период / Э. С. Каливраджіян, С. И. Бурлуцкая, С. Н. Бажанова // Ортодонтія. – 2003. – № 1. – С. 13-17.
 4. **Хорошилкина Ф. Я.** Ортодонтія. Профілактика і ліечение функціональних, морфологіческих і естетических порушень в зубочелюстно-лицевої області / Хорошилкина Ф. Я., Персин Л. С., Окушко-Калашникова В. П. – Кн. IV. – М.: 2005. – 453 с.
 5. **Proffit W.R.** Contemporary Orthodontics / W.R. Proffit, H.W. Fields. – Mosby. – 2018. – 744 с.
 6. **Jacobson A.** Radiographic cephalometry / A. Jacobson, R. Jacobson – Quintessence Publishing, USA, 2006. – 320 с.
 7. **Goldstein A.** The clinical testing of orthodontic results / A. Goldstein // Am J Orthod. – 1965. – P. 723-755.
 8. **Reitan K.** Principles of retention and avoidance of post treatment relapse / K. Reitan // Am J Orthod. – 1969. – № 55, 776-790.
 9. **Bishara S.E.** Stability of intercanine width, overbite and overjet correction / S.E. Bishara, J.M. Chadha // Am J Orthod. – 1973. – № 63. – P. 588-595.
- REFERENCES**
- . Flis P. S., Filonenko V.V. Evaluation of the results of treatment of orthodontic pathology during the period of occlusion. *Materialy Vseukrai'ns'koi'. naukovo-praktychnoi' konferencii' «Novi tehnologii v stomatologii i shheleplno-lycevij hirurgii»*. Harkiv; 2006:26-28.
 2. Rogackin D.V. Konusno-luchevaja kompjuternaja tomografija [Cone-beam computed tomography]. L'vov.: GalDent; 2010:235.
 3. Kalivradzhian Je. S., Burluckaja S. I., Bazhanova S. N. Features of orthodontic treatment of sagittal and transversal occlusion abnormalities in the retention period. *Ortodontija*. 2003;1:13-17.
 4. Horoshilkina F. Ja., Persin L. S., Okushko-Kalashnikova V. P. *Ortodontija. Profilaktika i lechenie*

funkcional'nyh, morfologicheskikh i jesteticheskikh narushenii v zubochejustno-licevoi oblasti [Orthodontics. Prevention and treatment of functional, morphological and aesthetic disorders in the maxillofacial area]. Kn. IV. – Moskva; 2005:453.

5. **Proffit W.R., Fields H.W.** Contemporary Orthodontics. Mosby; 2018:744.

6. **Jacobson A., Jacobson R.** Radiographic cephalometry. Quintessence Publishing, USA; 2006:320.

7. **Goldstein A.** The clinical testing of orthodontic results. Am J Orthod. 1965:723-755.

8. **Reitan K.** Principles of retention and avoidance of post treatment relapse. Am J Orthod. 1969;55:776-790.

9. **Bishara S.E., Chadha J.M.** Stability of intercanine width, overbite and overjet correction. Am J Orthod. 1973;63:588-595.

Надійшла 05.11.18

