

БІОЛОГІЯ

УДК 582.32:581.42/45

Гапон Ю. В.

МОХОВА РОСЛИННІСТЬ МІСТ РОМЕНЬСЬКО-ПОЛТАВСЬКОГО ГЕОБОТАНІЧНОГО ОКРУГУ

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (м. Полтава)

Gyra83@gmail.com

Робота є фрагментом наукової теми «Мохоподібні синантропних, природних та урбанізованих екосистем: бріофлора, синтаксономія», № державної реєстрації 0116U002581.

Вступ. Міські екосистеми, на відміну від природних, характеризуються своєрідним рослинним покривом та складом рослинних угруповань, що пов'язано зі специфікою урбосередовища, яке впливає як на флору, так і на формування рослинності. Це стосується і мохоподібних та обростань, які вони утворюють. У останні роки мохові угруповання, їх склад, рангова приналежність, класифікація та ін., привертають увагу бріологів [2,5,9,11]. Неповні відомості про мохову рослинність урбоекосистем міст Лубни, Полтави, Миргорода є в роботі С.В. Гапон [5], яка наводить для них [4] узагальнені відомості про 8 асоціацій та три безрангові угруповання епіфітної мохової рослинності, які належать до трьох класів, трьох порядків, п'яти союзів. Серед них і обстежувані нами міста Лубни, Миргород, Полтава. У дисертаційній роботі «Мохоподібні Лісостепу України (рослинність та флора)» С.В. Гапон [5] подає також відомості про епігейний та епілітний моховий покрив, який представлений тільки безранговими угрупованнями *Orthotrichum pumilum* – comm., *Bryum argenteum* – comm., *Ceratodon purpureus* – comm. *Tortula aestiva* – comm., *Schistidium apocarpum* – comm. Тобто детально мохова рослинність названих вище міст не вивчена.

Тому **метою** нашої **роботи** є вивчення бріоугруповань міст Роменсько-Полтавського геоботанічного округу, їхнього складу, встановлення їхньої синтаксономічної приналежності.

Об'єкт і методи дослідження. Робота ґрунтуються на оригінальних дослідженнях бріофлори та бріоугруповань урбоекосистем міст обласного підпорядкування Роменсько-Полтавського геоботанічного округу, а саме: Лубен, Миргорода, Пирятин, Полтави (Полтавська обл.), Ромен (Сумська обл.), Прилук (Чернігівська обл.) [8]. Бріофлористичними зборами та геоботанічними дослідженнями були охоплені різні оселища та субстрати як власне міст, так і приміських зон, радіусом до 10 км за загальноприйнятою методикою [10]. Всього було зібрано 1002 гербарних пакетів мохоподібних та виконано 838 геоботанічних описів мохових угруповань.

Описи бріоугруповань здійснювалися згідно відповідних методик [1,6] та з врахуванням власних поправок на особливості вивчення покриву мохових угруповань.

подібних міських екосистем. Назви мохоподібних наведені за «Чеклістом мохоподібних України» [3]. Бріоугруповання класифікувалися за еколо-флористичною класифікацією на основі методу Браун-Бланке. Синтаксономічна схема мохової рослинності побудована з використанням сучасних синтаксономічних схем мохової рослинності [12,13] та використанням наробок С.В. Гапон [7].

Для нових для науки синтаксонів наводимо характеристизуючі таблиці асоціацій.

Результати дослідження та їх обговорення. У результаті наших досліджень встановлено, що моховий покрив міст та їх околиць сформований переважно бріоценозами та бріоагрегаціями, зрідка синузіями. У складі мохових угруповань виявлено 70 видів та три різновидності мохоподібних, які належать до відділу *Marchantiophyta* (п'ять видів з чотирьох родів, чотирьох родин, чотирьох порядків, двох класів), *Bryophyta* (65 видів з 38 родів, 22 родин, дев'яти порядків, двох класів). У межах урбоекосистеми міста покрив мохоподібних розвинений нерівномірно. У адміністративній частині його основу формують епіфітні та епілітні обростання, а в фітоценозах околиць підвищується роль епігейних та епіксильних угруповань. Класифікаційна схема мохової рослинності має наступний вигляд:

**Cl. Ceratodontop-Polytrichetea piliferi
Mohan 1978**

Ord. *Polytrichetalia piliferi* v. Нібшчм. 1975
All. *Ceratodontop-Polytrichion piliferi* Waldh.
ex v. Нібшчм. 1967

Ass. *Racomitrio-Polytrichetum piliferi* v. Нібшчм.
1967

- typicum
- *brachythecietosum albanticis* v.d. Dunk 1972
- *ceratodontetosum purpurei* v.d. Dunk 1972

Ass. *Brachythecietum albanticis* Gams ex Neum.
1971

**Cl. Cladonio digitatae-Lepidozietae reptantis
Jez. & Vondr. 1962**

Ord. *Diplophyllatalia albanticis* Phill. 1963
All. *Dicranellion heteromallae* Phill. 1983

Suball. *Brachythecienion velutini* Marst. 1984

Угруповання *Fissidens bryoides* -- comm.

Ass. *Plagiothecietum cavifolii* Marst. 1984 [5]

Suball. *Pogonatenion urnigeri* (v. Krus. 1945) Phill.
1956

Угруповання *Atrichum undulatum* – comm.

- Ord. *Cladonio digitatae-Lepidozieta reptantis* Jez. & Vondr. 1962
 All. *Nowellion curvifoliae* Phill. 1965
 Ass. *Tetraphido pellucidae-Orthodicranetum stricti* Heb. 1973
 Ord. *Brachythecietalia rutabulo-salebrosi* Marst. 1987
 All. *Bryo capillaris-Brachythecion rutabuli* Lec. 1975
 Ass. *Brachythecio salebrosi-Amblystegietum juratzkani* (Сјцг. ex Marst. 1987) Marst. 1989
 Угруповання *Bryum moravicum-Brachytheciastrum velutinum* – comm. [5]
 Ass. *Hypno cupressiformis-Xylarietum hypoxylis* Phil. 1965
 Ord. *Dicranetalia scoparii* Barkm. 1958
 All. *Dicrano scoparii-Hypnion filiformis* Barkm. 1958
 Ass. *Dicrano scoparii-Hypnetum filiformis* Barkm. 1949
 Угруповання *Platygyrium repens* – comm.
 Угруповання *Hypnum reptile* – comm.
 Ass. *Orthodicrano montani-Hypnetum reptile* Gapon 2010
- Cl. Schistidietea apocarpi Ježek et Vondráček 1962 (Grimmieta anodontis Had. & Vondr. in Jez. & Vondr. 1962)**
 Ord. *Grimmieta anodontis* Sm. & Van. ex Kl. 1948.
 All. *Grimmion tergestinae* Імара ex Klika 1948.
 Ass. *Schistidietum apocarpi* STEF. 1941
Bryum argenteum – comm.,
Ceratodon purpureus – comm.
 Ass. *Tortuletum aestivalis* – J. Hapon 2017
- Cl. Psoretea decipientis Matt. ex Föllm. 1974**
 Ord. *Barbuletalia unguiculatae* v. Нібшм. 1960
 All. *Grimmaldion fragrantis* Ім. & Had. 1944
 Ass. *Astometum crispis* Waldh. 1947
- Cl. Funarietea hygrometricae von Нібшм. 1957**
 Ord. *Funarietalia hygrometricae* von Нібшм. 1957
 All. *Funariion hygrometricae* Hadač in Klika ex Нібшм. 1957
 Ass. *Funarietum hygrometrici* Engel 1949
 - typicum
 - *marCHANTIETOSUM polymorphae* Marst. 1973
 Ass. *Bryetum caespiticii* – J. Hapon 2017
 Угруповання *Barbula unguiculata* – comm.
 All. *Phascion cuspidati* Waldh. ex v. Krus. 1945
 Угруповання *Phascum cuspidatum* – comm.
- Cl. Neckeretea complanatae Marst. 1986**
 Ord. *Neckeretalia complanatae* Jez. et Vondr. 1963
 All. *Neckerion complanatae* Sw. et Had. in Kl. et Had. 1944
 Suball. *Brachythecio populei-Homalienion trichomanoidis* Marst. 1992
 Ass. *Anomodontetum attenuati* (Barkm. 1958) Pec. 1965 [5]
 Ass. *Madotheco platyphyllae-Leskeelletum nervosae* (Gams 1927) Barkm. 1958
 Ass. *Anomodontetum longifolii* Waldh. 1944 [5]
 Угруповання *Homalia trichomanoides* – comm.
 Угруповання *Radula complanata-Pseudeoleskeella nervosa* – comm. [5].

- Cl. Frullanio dilatatae-Leucodontetea sciuroidis**
 Mohan 1978 em. Marst. 1985
 Ord. *Orthotrichetalia* Had. in Kl. et Had. 1944
 All. *Ulotion crispae* Barkm. 1958
 Ass. *Orthotrichetum pallentis* Ochsn. 1928
 Ass. *Orthotrichetum speciosi* Barkm. 1958
 Ass. *Pylaisietum polyantae* Felf. 1941
 Ass. *Pylaisielleto-Leskeelletum nervosae* Baischeva et al. 1993
 All. *Syntrichion laevipilae* Ochner 1928
 Ass. *Orthotrichetum fallacis* v. Krus. 1945
 All. *Leskion polycarpa* Barkm. 1958
 Ass. *Leskeetum polycarpae* Horvat ex Pec. 1965
 - typicum
 - *pylaisielletosum polyanthae* Baish. & all. 1994
- Cl. Pleurochaeto squarrosae-Abietinelletea abietinae Marst. 2002**
 Ord. *Pleurochaeto squarrosae-Abietinelletalia abietinae* Marst. 2002
 All. *Abietinellion abietinae* Clacom. 1951
 Ass. *Abietinelletum abietinae* Stod. 1937
 Угруповання *Tortula ruralis* – comm.
 Угруповання *Homalothecium lutescens* – comm.
- Cl. Hylocomieteа splendentis Marst. 1992**
 Ord. *Hylocomitea splendentis* Gillet ex Vadam 1990
 All. *Pleurozion schreberi* v. Krus. 1945
 Ass. *Pleurozietum schreberi* Wiśn. 1930
 - typicum
 - *dicranietosum polyseti* – Gapon 2010
 All. *Fissidention taxifolii* Marst. 2006
 Угруповання *Oxyrrhynchium hians* – comm.
- Мохові синузії соснових лісів:**
Polytrichum piliferum – syn.
 Мохова рослинність міських екосистем репрезентована епігейними, епіфітними, епіксильними та епілітними броуугрупованнями. Епігейні обростання представлені синтаксонами п'яти класів, 6 порядків, 9 союзів. Угруповання класу *Ceratodon purpurei-Polytrichetea piliferi* Mohan 1978 виявлені в соснових насадженнях у околицях м. Полтави (м-н Дублянщина, с. Вакуленці). Це асоціації *Brachythecietum albicans* Gams ex Neum. 1971, *Racomitrio-Polytrichetum piliferi* v. Нібшм. 1967 з двома субасоціаціями: *brachythecietosum albicans* v.d. Dunk 1972, *ceratodontosum purpurei* v.d. Dunk 1972. Угруповання асоціацій є гелофітними, ксерофітними, зростають на супіщаних ґрунтах, приурочені до маловікових соснових насаджень та соснових насаджень, які зазнають значного антропічного навантаження. Вони характеризуються значною участю рудерального космополітного виду *Ceratodon purpureus* (Hedw.) Brid., а також широко поширеного в міських екосистемах антропофільного виду *Brachythecium salebrosum* (Hoffm. ex F. Weber & Mohr) Schimp. У соснових насадженнях с. Вакуленці виявлена також наземна синузія *Polytrichum piliferum* – syn., яка займає значні площини (від 2-4 м² і більше). Епігейні броуценози класу *Cladonio digitatae-Lepidozieta reptantis* Jez. & Vondr. 1962 представлені в містах безранговими угрупованнями *Fissidens bryoides* – comm. і *Atrichum undulatum* – comm. та асоціацією *Plagiothecietum cavifolii* Marst. 1984. Угруповання *Fissidens bryoides* – comm. при-

БІОЛОГІЯ

урочені до затінених місць із середнім зволоженням, трапляються на вільних від трав'янистого покриву місцях. Угруповання *Atrichum undulatum* – comm. є геліосцифітними мезофітними, приурочені до порушених ґрунтів, трапляються в лісових масивах (м. Полтава, м. Лубни, м. Миргород, м. Пирятин), зрідка на луках (заплава р. Воскли, м. Полтава). Епігейна сцифітна мезофітна асоціація *Plagiothecietum cavifolii* Marst. 1984 виявлена тільки в лісових масивах заказника «Морозівська дача» м. Лубни [5]. Найпоширенішим серед епігейних мохових угруповань як на порушених, так і на задернованих ґрунтах у парках, на газонах та в листяних деревостанах (водоохоронні насадження по берегах річок Сула, Ворскла, Хорол), санітарні насадження по залізниці між ст. Південна і ст. Київська (м. Полтава) є безрангове угруповання *Oxyrrhynchium hians* – comm. класу *Hylocomietea splendentis* Marst. 1992, евритопне за відношенням до світла, ґрунтів, але вимагає умов середнього зволоження. До цього ж класу належить і пошиrena в околичних соснових насадженнях м. Полтави, м. Миргорода асоціація *Pleurozietum schreberi* Wiśn. 1930, її типове угруповання та рідше її ж субасоціація – *dicranietosum polyseti* – Gapon 2010. На ділянках лучних степів (схили по залізниці, Інститутська гора м. Полтава) виявлені світлолюбні ксерофітні угруповання асоціації *Abietinelleum abietinae* Stod. 1937 та безрангових угруповань *Tortula ruralis* – comm., *Homalothecium lutescens* – comm. класу *Pleurochaeto squarrosoe-Abietinellea abietinae* Marst. 2002 та *Astometum crisi Waldh.* 1947 класу *Psoretea decipientis* Matt. ex Follm. 1974. На оброблюваних землях (городах, полях Полтавської сільськогосподарської дослідної станції, **Інститут свинарства та АПВ НААН**, окремих купах піску, глини та ін.), місцях тимчасових вогнищ формуються антропофільні броуугруповання класу *Funarietea hygrometricae* von Nüschmann 1957. У таких оселищах відзначенні асоціація *Funarietum hygrometrici* Engel 1949 та її субасоціація *marchantietosum polymorphae* Marst. 1973, а також безрангові угруповання *Phascum cuspidatum* – comm. та *Barbula unguiculata* – comm. На газонах у місті, а також на еродованих відслоненнях схилів по залізниці були описані вперше для науки угруповання асоціації *Bryetum caespiticii* – J. Hapon 2017. Це ксеромезофітні тіневитривалі епігейні броуугруповання, які займають проміжки між дернинами злаків, або вільні від них місця (**табл. 1**).

Найбагатше представленою в містах є епіфітна мохова рослинність. Вона репрезентована трьома класами, п'ятьма порядками, сімома союзами, тринацяттяма асоціаціями, однією субасоціацією та п'ятьма безранговими угрупованнями. Основу

Таблиця 1.

Асоціація *Bryetum caespiticii* – J. Hapon 2017

Номер опису	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	С О Н С Т
Номер авторського опису	215	217	220	244	245	247	248	370	375	378	575	578	590	692	620	684	
Площа ПД, дм ²	1	1	1	2	1	1	1	2	1	2	2	1	2	2	1	1	
ЗПП, %	55	60	60	65	70	65	70	70	70	80	70	70	60	70	70	70	
Субстрат	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	
Кількість видів у описі		3	4	6	4	3	5	4	4	3	3	3	4	3	4	3	
D.s. ass. Bryetum caespiticii																	
<i>Bryum caespiticium</i>	3	4	3	3	3	4	5	4	5	3	4	3	3	4	3	3	V
D.s. all. Funarietalia hygrometricae																	
<i>Leptobryum pyriforme</i>	1	.	.	2	.	.	2	+	2	.	.	.	II
<i>Phascum cuspidatum</i>	2	.	.	+	2	2	II
<i>Marchantia polymorpha</i>	1	+	I
D.s. ord. Funarietalia hygrometricae, cl. Funarietea hygrometricae																	
<i>Bryum argenteum</i>	.	.	2	3	2	.	.	.	3	.	II
<i>Phascum piliferum</i>	.	.	.	2	2	+	.	.	2	II
<i>Ceratodon purpureus</i>	+	.	+	.	.	.	2	.	1	2	.	II
Інші види																	
<i>Amblystegium serpens</i>	.	2	+	2	.	.	.	2	3	.	+	.	II
<i>Brachythecium salebrosum</i>	.	+	2	.	.	.	+	I
<i>Encalypta vulgaris</i>	.	.	.	+	.	+	.	.	+	I
<i>Bryum ruderale</i>	+	.	+	.	.	.	+	+	+	.	.	II
<i>Pottia truncata</i>	+	.	+	I

Примітка. ПД – пробна ділянка, ЗПП – загальна проективна площа, Г – ґрунт.

Описи виконано: 215, 217, – 14.05.15. Полтавська обл., м. Лубни, парк Молодіжний, на ґрунті. 218, 220 – 14.05.15. Полтавська обл., м. Лубни, дендропарк прикоренева зона тополі. 244, 245 – 15.09.15. Полтавська обл., м. Миргород, лісосмуга, узбіччя вул. Київська. 247, 248 – 15.09.15. Полтавська обл., м. Миргород, вул. Молодіжна, фундамент. 370, 375, 378 – 21.04.14. Полтавська обл., м. Полтава вул. Монастирська, ґрунт. 575, 578, 580, 590 – 27.05.16. Сумська обл., м. Ромни, вул. Щербакова 1, паркове насадження, порушеній ґрунт. 620, 684, 692 – 10.05.16. Чернігівська обл., м. Прилуки, біля залізничної станції, ґрунт.

БІОЛОГІЯ

її становлять усталені угруповання класу *Frullanio dilatatae-Leucodontetea sciroidis* Mohan 1978 em. Marst. 1985, який репрезентований шістьма асоціаціями та двома субасоціаціями. Вони формуються переважно в стовбуровій зоні дерев різних порід. Нами установлено, що в містах Миргород, Лубни, Полтава частіше відмічені ксерофітні угруповання асоціацій *Pylaisietum polyantae* Felf. 1941, *Leskeetum polycarpa* Horvat ex Pec. 1965, а в містах Прилуки та Ромни – ксерофітні, тіневитривалі *Orthotrichetum pallentis* Ochsn. 1928, *Orthotrichetum fallacis* v. Krus. 1945. Крім того, в складі мохової рослинності ще відмічені асоціації *Orthotrichetum speciosi* Barkm. 1958, *Pylaisielleto-Leskeelletum nervosae* Baischeva et al. 1993. У основі стовбурові дерев, на яких відсутня вапняна побілка, відмічені ті невитривалі ксеромезофітні асоціації класу *Cladonio digitatae-Lepidozietae reptantis* Jez. & Vondr. 1962: *Brachythecio salebrosi-Amblystegietum juratzkani* (Sjuz. ex Marst. 1987) Marst. 1989 та безрангові угруповання *Platygyrium repens* – comm., *Hypnum reptile* – comm.

У прикореневій зоні дерев мішаного лісу (*Betulla pendula* L., *Quercus robur* L.) навколо курорту «Миргород» (м. Миргород) відмічені ті невитривалі, ксеромезофітні асоціації *Dicrano scoparii-Hypnion filiformis* Barkm. 1958, *Orthodicranio montani-Hypnetum reptile* Gapon 2010 та *Tetraphido pellucidae-Orthodicranetum stricti* Heb. 1973 (рідкісна для Лісостепу України), які в природних ценозах приурочені до дубово-соснових лісів з участю *Betulla pendula*.

У лісових масивах околиць, які є залишками природних широколистяних лісів, були виявлені тіневитривалі ксеромезофітні асоціації класу *Neckeretea complanatae* Marst. 1986: *Anomodontetum attenuati* (Barkm. 1958) Pec. 1965 [5], *Anomodontetum longifolii* Waldh. 1944 ([5] та власні знахідки для Полтавського міського парку). Нами також було відзначено кілька броценозів асоціації *Madotheco platyphylla-Leskeelletum nervosae* (Gams 1927) Barkm. 1958 (м. Полтава, «Гришкин ліс») та безрангового угруповання *Homalia trichomanoides* – comm. (м. Миргород). Такі угруповання трапляються зрідка, основу ж епіфітної мохової рослинності лісових масивів околиць становлять синтаксони класу *Frullanio dilatatae-Leucodontetea sciroidis* Mohan 1978 em. Marst. 1985, асоціація *Brachythecio salebrosi-Amblystegietum juratzkani* (Sjuz. ex Marst. 1987) Marst. 1989 і безрангові угруповання *Platygyrium repens* – comm., *Hypnum reptile* – comm. класу *Cladonio digitatae-Lepidozietae reptantis* Jez. & Vondr. 1962.

Міські екосистеми характеризуються різноманітністю епілітних субстратів (пішохідні доріжки, фундаменти будинків, шиферні дахи тощо), на яких формуються епілітні броугруповання. Серед них на тротуарних пішохідних доріжках у всіх містах виявлено геліофільна, ксерофітна асоціація *Schistidietum arocarpi* Stef. 1941, яка належить до класу *Grimmietea alpestris* Had. & Vondr. 1962. На фундаментах будинків, опорах огорож, стінах арок описана нова для науки геліофільна, ксерофітна асоціація *Tortuletum*

Таблиця 2.

Асоціація *Tortuletum aestivii* – J. Hapon 2017

Номер опису	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	С О Н С Т
Номер авторського опису	17	37	257	264	374	377	387	388	398	415	424	576	589	494	640	634	
Площа ПД, дм ²	1	2	1	1	2	2	1	2	1	2	2	1	1	2	1	1	
ЗПП, %	65	70	75	70	80	65	75	75	60	60	60	75	60	70	70	70	
Субстрат	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K		
Кількість видів у описі	4	3	3	4	3	2	3	2	3	4	3	4	4	3	3	3	
D.s. ass. <i>Tortuletum aestivii</i> J. Hapon 2017																	
<i>Tortula aestiva</i>	4	4	5	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	V
D.s. <i>Grimmion tergestinæ</i> Smarda ex Klika 1948																	
<i>Tortula muralis</i>	2	+	2	.	.	.	II
<i>Ceratodon purpureus</i>	2	.	.	2	I
D.s. <i>Grimmiatalia anodontis</i> Sm. & Van. ex Kl. 1948, <i>Schistidietea apocarpi</i> Ježek et Vondráček 1962																	
<i>Grimmia pulvinata</i>	.	.	2	2	2	.	.	.	3	.	II	
<i>Syntrichia ruralis</i>	.	.	2	2	2	.	I	
<i>Schistidium apocarpum</i>	+	.	+	.	.	2	2	.		
Інші види																	
<i>Ceratodon purpureus</i>	.	2	+	2	3	.	.	II	
<i>Amblystegium serpens</i>	.	+	.	.	.	2	I	
<i>Brachythecium salebrosum</i>	.	.	+	+	I	
<i>Bryum caespiticium</i>	+	+	.	.	I	

Описи виконано: 17, 37 – 21.08.15. Полтавська обл., м. Лубни, вул.. Кононівська, фундамент будинку. 257, 264, – 15.09.15. Полтавська обл., м. Миргород, фундамент будинку; 374, 377 – 16.08.15. м. Полтава парк інтернаціоналістів, бетонні плити; 387, 388, 398 – 17.08.15. м. Полтава, вул. Балакіна на фундаментах будинків; 415, 424 – 28.08.15. м. Полтава, вул. Монастирська, на асфальті та на фундаментах будинків; 576, 589 – 27.05.16. Сумська обл., м. Ромни, парк імені Т.Г. Шевченка. на старих будинках і залишках фундаменту; 630, 634 – 10.05.16. Чернігівська обл., м. Прилуки, на бетонних колекторах біля ООО «Белкозин».

aestivii – J. Hapon 2017 (табл. 2), а також виявлені бріоценози безрангових угруповань *Orthotrichum pumilum* – comm., *Bryum argenteum* – comm., *Ceratodon purpureus* – comm., *Syntrichia ruralis* – comm. Три останні приурочені як до шиферних дахів, так і пішохідних доріжок.

У зв'язку з тим, що в містах мертві деревини майже не зустрічається (регулярні санітарні рубки та видалення решток), епіксильні бріоугруповання є найменш розвиненими і сконцентровані вони в окічніх насадженнях. На малозруйнованій деревині ще переважають епіфітні бріоценози класу *Frullanio dilatatae-Leucodontetea sciroidis* Mohan 1978 em. Marst. 1985 (*Leskeetum polycarpeae* Horvat ex Pec. 1965, *Pylaisietum polyantae* Felf. 1941, *Orthotrichetum pallentis* Ochsn. 1928, *Orthotrichetum speciosi* Barkm.). Типова мертві деревини (середній рівень руйнування) зайнята бріоценозами класу *Cladonio digitatae-Lepidozietae reptantis* Jez. & Vondr. 1962: *Brachythecio salebrosi-Amblystegietum juratzkani* (Sjuz. ex Marst. 1987) Marst. 1989, безрангові угруповання *Platygyrium repens* – comm., *Nypnium reptile* – comm. Зрідка в околицях м. Прилуки виявлені бріоценози асоціації *Nypno cupressiformis-Xylarietum hydroxili* Phil. 1965.

Висновок. Таким чином, мохова рослинність міських екосистем репрезентована епігейними, епі-

фітними, епілітними та епіксильними бріоугрупованнями, які відносяться до дев'яти класів, 12 порядків, 16 союзів, 23 асоціацій, восьми субасоціацій та 14 безрангових угруповань. Вона має специфічні відмінності від природної. У міських бріоценозах проективне покриття видів значно нижче, ніж в природних. Вони характеризуються меншою кількістю видів на одне угруповання, а також меншою представліністю діагностичних видів вищих синтаксонів. Деякі асоціації характеризуються полісубстратністю. Наприклад, *Leskeetum polycarpeae* Horvat ex Pec. 1965, *Orthotrichetum fallacis* v. Krus. 1945 виявлені як на деревах, так і на кам'янистих субстратах, безрангові угруповання *Bryum argenteum* – comm., *Ceratodon purpureus* – comm. – на дахах та пішохідних доріжках, *Syntrichia ruralis* – comm. на дахах і ґрунті. Це свідчить не тільки про широку евритопність бріофітів, а і їхню екологічну пластичність щодо вибору міських оселищ. Подальші дослідження мохової рослинності міст дозволять виявити закономірності поселення бріофітних угруповань та ступінь їхньої бріоіндикаційної здатності.

Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження мохової рослинності міст дозволять виявити закономірності поселення бріофітних угруповань та ступінь їхньої бріоіндикаційної здатності, особливості їхньої систематичної, біоморфологічної, еколого-ценотичної та географічної структури.

Література

1. Bayisheva E.Z. Briosintaksonomiya: epifitni i epiks'il'nykh spil'noty / E.Z. Bayisheva, A.I. Solomeshch // Byul. Mosk. o-va vyporobnoho. pryydy. Vid. biolohiyi. — 1994. — Vyp. 6. — S. 74-84.
2. Barsukov O.O. Mokhopodibni zelenykh nasadzen' m. Kharkova / O.O. Barsukov, V.YU. Yarots'kiy // Lisivnytstvo y ahrolisomelioratsiya. — 2009. — Vyp. 116. — S. 250-259.
3. Boyko M.F. Cheklis mokhopodibnikh Ukrayiny / M.F. Boyko. — Kherson, Aylant, 2008. — 232 s.
4. Hapon S.V. Epifitnyye briosooobshchestva mis'kykh ekosistem Lisostepu Ukrayiny / S.V. Hapon // Roslynnist' Skhidnoi Yevropy: klasifikatsiya, ekoloziya, okhorona: materialy Mizhnar. nauch. konf., (Bryans'k, 19-21 zhovtnya 2009 roku). — Bryans'k: Vyd-vo «Ladomyr», 2009. — S. 58-62.
5. Hapon S.V. Mokhopodibni Lisostepu Ukrayiny (roslinnist' ta flora) dys. ... d-ra biol. nauk: spets. 03.00.05 «Botanika» / S.V. Hapon. — Kyiv, 2011. — 855 s.
6. Hapon S.V. Metodychnyy aspekt doslidzhennya mokhovoyi roslinnosti / S.V. Hapon // Ukr. botan. zhurn. — 2013. — T. 70, № 3. — S. 392-397.
7. Hapon S.V. Sintaksonomiya mokhovoyi roslinnosti Ukrayiny (Lisostep): monografiya / S.V. Hapon. — Poltava: FOP Kulibaba, 2014. — 88 s.
8. Heobotanichne rayonuvannya Ukrayins'koyi RSR. — K.: Nauk. dumka, 1977. — 303 s.
9. Karpinets' L.I. BrEOFitni uhrupovannya ta yikh renaturalizatsiyna rol' na porodnykh vidvalakh vuhi'l'nikh shakht Chervonohrads'koho hirnichopromislovoho rayonu: avtoref. dys. ... kand. biol. nauk: spets. 03.00.16 «Ekoloziya» / L.I. Karpinets'. — L'viv, 2017 — 21 s.
10. Popova M.M. BrEOFlory m Orla i yoho okolys' / M.M. Popova, S.I. Ob'yedkova, V.I. Radyhina // Flora i roslynnist' Seredn'oyi Rosiyi: m-ly nauk. konf. — Orel: ODU, 1997. — S. 141-142.
11. Rahulina M.YE. Uchast' mokhopodibnikh (Bryophyta) u protsesakh samovidnovlennya tekhnogenno porushenykh ekosistem Volyno-Podillya ta Peredkarpatty: avtoref. dys. ... kand. biol. nauk: spets. 03.00.16 «Ekoloziya» / M.YE. Rahulina. — L'viv, 2015 — 20 s.
12. Marstaller R. Syntaxonomischer Konspekt der Moosgesellschaften Europas und angrenzender Gebiete / R. Marstaller // Haussknechtia Beigef. 13. — Jena, 2006. — 192 p.
13. Vegetation of Europe: Hierarchical floristic classification of vascular plant, bryophyte, lichen, and algal communities. Applied Vegetation Science Mucina et al. — 2016. — 19 (Suppl. 1). — P. 3-264.

УДК 582.32:581.42/45

МОХОВА РОСЛИННІСТЬ МІСТ РОМЕНЬСЬКО-ПОЛТАВСЬКОГО ГЕОБОТАНІЧНОГО ОКРУГУ

Гапон Ю. В.

Резюме. Охарактеризовано результати вивчення бріоценозів міст обласного підпорядкування Роменсько-Полтавського геоботанічного округу (м.м. Лубни, Миргород, Полтава, Прилуки, Ромни), укладено класифікаційну схему мохової рослинності, яка репрезентована епігейними, епіфітними, епілітними та

БІОЛОГІЯ

епіксильними бриоугрупованнями, що відносяться до дев'яти класів, 12 порядків, 16 союзів, 23 асоціацій, восьми субассоціацій та 14 безрангових угруповань. Встановлено її специфіку та відмінності від природної.

Низка асоціацій характеризується полісубстратністю (*Leskeetum polycarpeae* Horvat ex Pec. 1965, *Orthotrichetum fallacis* v. Krus. 1945 та ін., що свідчить не тільки про широку евритопність бриофітів, а і їхню екологічну пластичність щодо вибору міських оселищ. Подальші дослідження мохової рослинності міст дозволять виявити закономірності поселення бриофітних угруповань та ступінь їхньої бриоіндикаційної здатності.

Ключові слова: мохоподібні, бриофлора, мохова рослинність, асоціація, еколо-флористична класифікація.

УДК 582.32: 581.42 / 45

МОХОВАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДОВ РОМЕНСКО-ПОЛТАВСКОГО ГЕОБОТАНИЧЕСКОГО ОКРУГА Гапон Ю. В.

Резюме. Охарактеризованы результаты изучения бриоценозов городов областного подчинения Роменско-Полтавского геоботанического округа (г.г. Лубны, Миргород, Полтава, Прилуки, Ромны), составлена классификационная схема моховой растительности, которая представлена эпигейными, эпифитными, эпилітическими и эпиксильными бриосообществами, относящимися к девяти классам, 12 порядкам, 16 союзам, 23 ассоциациям, восьми субассоциациям и 14 безранговым бриосообществам. Установлено ее специфику и отличия от естественной.

Ряд ассоциаций характеризуется полисубстратностью (*Leskeetum polycarpeae* Horvat ex Pec. 1965, *Orthotrichetum fallacis* v. Krus. 1945 и др.), что свидетельствует не только о широкой эвритопности бриофитов, а и их экологической пластичности по выбору городских местообитаний. Дальнейшие исследования моховой растительности городов позволяют выявить закономерности поселения бриофитных группировок и степень их бриоиндикационной способности.

Ключевые слова: мохообразные, бриофлора, моховая растительность, ассоциация, эколого-флористическая классификация.

UDC 582.32:581.42/45

MOSS VEGETATION OF THE CITIES ROMENSKO-POLTAVSKY OF THE GEOBOTANICAL DISTRICT

Hapon Ju. V.

Abstract. Results of studying briocenosis the cities of regional submission of the Romensko-poltavsky geobotanical district are characterized (the bridge. Lubni, Myrgorod, Poltava, Priluki, Romney), the classification scheme of moss vegetation which is submitted terricolous, epiphytic, epilithic and epixylic briogroups that about nine classes, the 12th orders, the 16th unions, 23 associations, eight subassociations and 13 moss communities belong is concluded.

Its specifics and differences from natural are established.

Terricolous fouling the 6th orders, the 9th unions are presented sintaksony five classes.

The most common among them as disturbed, and covered up greensward soils in parks, on lawns and in deciduous stands is moss communities *Oxyrrhynchium hians* – comm. class *Hylocomietea splendentis* Marst. 1992.

On the lawns of cities, as well as eroded outcrops slopes by rail (Poltava) were first described to Science Association grouping *Bryetum caespiticii* – J. Hapon 2017 .The largest various is epiphytic moss vegetation which is presented by three classes, five orders, seven unions, thirteen associations, one sub associations and five moss communities.

Prevail brazenose class *Frullanio dilatatae-Leucodontetea sciurooidis* Mohan 1978 em. Marst. 1985 (*Leskeetum polycarpeae* Horvat ex Pec. 1965, *Pylaisietum polyantae* Felf. 1941, *Orthotrichetum pallentis* Ochsn. 1928, *Orthotrichetum v fallacis*. Krus. 1945, *Orthotrichetum speciosi* Barkm. 1958, *Pylaisielleto-Leskeelletum nervosae* Baischeva et al. 1993.

Among them, the paving of pedestrian paths in all cities found an association *Schistidietum apocarpi* Stef. 1941, which belongs to the class of *Grimmietea alpestris* Had.

On the foundations of houses, piers, fences, walls, arches described as new to science *gelatina*, *xerophy* Association *Tortuletum aestivii* – J. Hapon 2017, and revealed brazenose of basangova groups *Orthotrichum pumilum* Somme., *Bryum argenteum* – Somme., *Ceratodon purpureus* – Somme., *Syntrichia ruralis* – Somme. The last three are confined to a slate roofs and walkways.

Accela moss vegetation is poorly developed and represented by the Association *Brachythecio salebrosi-Amblystegietum juratzkani* (Sjuz. ex Marst. 1987) Marst. 1989 groups: *Platygyrium repens* – Somme. and *Hypnum reptile* Somme. class *Cladonio digitatae-Lepidozietae reptantis* Jez.

A number of associations characterized by polastrindu (*Leskeetum polycarpeae* Horvat ex Pec. 1965, *Orthotrichetum v fallacis*. Krus. 1945 etc., which reflects not only the wide africomnet of bryophytes and their ecological plasticity on the selection of the city ocelis. Further studies of the moss vegetation of the cities will identify patterns of settlement brovina groups and the degree of their broggiano abilities.

Keywords: mosses, bryoflora, moss vegetation Association, ecological-floristic classification.

Рецензент – проф. Орлова Л. Д.

Стаття надійшла 07.06.2017 року