

УДК 631.453(477.1)

Т. М. Мислива

к.с.-г.н.

Житомирський національний агроекологічний університет
Рецензент – член редколегії «Вісник ЖНАЕУ», д.т.н. І. А. Пількевич

СВИНЕЦЬ І КАДМІЙ У ГРУНТАХ ПРИРОДНИХ І АГРОЛАНДШАФТІВ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ

Встановлено особливості міграції Pb і Cd за профілем основних типів ґрунтів природних і агроландшафтів, визначено коефіцієнти концентрації міцнофіксованих форм полютантів у верхньому 0–20 см горизонті ґрунтового профілю. Встановлено, що пріоритетним забруднювачем ґрунтового покриву є свинець, вміст міцнофіксованих форм якого перевищує фон у 9–15 разів.

Постановка проблеми та аналіз останніх результатів досліджень

Внаслідок прогресуючого посилення антропогенного впливу на довкілля погіршення екологічної ситуації, що пов'язане зі зростанням концентрації полютантів у компонентах природних і штучних екосистем, спостерігається не лише на території великих мегаполісів та промислово розвинених регіонів, а й далеко за їх межами – в аграрних регіонах, зокрема й у Поліссі. Однак моніторингових досліджень щодо оцінки рівня забруднення важкими металами, насамперед свинцем і кадмієм, природних ландшафтів та агроекосистем у Житомирській області за останні 35–40 років практично не проводилося. Вивчення ж форм знаходження і міграції хімічних елементів у ґрунтах та питань особливостей вертикального розподілу валових і міцнофіксованих форм Pb і Cd за профілем ґрунту дасть змогу оцінити як загальний ступінь забруднення ґрунтового покриву природних і агроландшафтів, так і вірогідність накопичення полютантів фітоценозами.

Питанням забруднення важкими металами ґрунтового покриву присвячена численна кількість досліджень [11, 12, 28, 35 та ін.]. Наразі увага вчених зосереджена на вивченні питань екогеохімії ландшафтів у зонах агрогенезу (агроландшафти), техногенезу (гірничо – промислові ландшафти у місцях видобутку корисних копалин, промислові ландшафти) та урбогенезу (у міських агломераціях та мегаполісах) [1, 6, 20, 26, 33 та ін.]. Значна частка наукових праць присвячена безпосередньо особливостям міграції й акумуляції окремих хімічних елементів у ґрунтовому покриві України. Дослідження Ю.М. Дмитрука [8] присвячені особливостям профільного розподілу міді і цинку в ґрунтах Карпатського регіону, А.І. Мельника [16] – міграції й акумуляції важких металів у ґрунтах Чернігівської області, С.С. Руденка і С.С. Костишина – у ґрунтах слабкоурбанизованих та агроландшафтів Чернівецької області [14, 27]. Характер

розділу Zn у ґрунтах Харківської області досліджено в роботі М.М. Мірошниченка та А.І. Фатєєва [22], особливості міграції й акумуляції важких металів у ґрунтах лучних і лісових ландшафтів заповідних територій – у роботах А.І. Самчука та Е.Я. Жовінського [2, 3], агроселітебних ландшафтів – Т.М. Мисливої і Л.О. Герасимчук [19, 21]. Досить активно проводяться дослідження щодо оцінки рівня забруднення важкими металами ґрутового покриву територій, техногенно порушених внаслідок видобутку корисних копалин, насамперед, відкритим способом [1, 13, 33], ґрунтів у межах впливу звалищ твердих побутових відходів, смуг відчуження залізничних колій [16, 29].

Значно менша кількість досліджень присвячена питанням міграції й акумуляції у ґрутовому профілі токсикантів, зокрема свинцю і кадмію. Оскільки ці елементи не є фізіологічно необхідними для рослин, в агроекологічних дослідженнях їм не приділяється належної уваги.Хоча в літературі наявна певна кількість відомостей щодо забруднення ґрунту свинцем [15] та кадмієм [23, 31], вони мають фрагментарний характер і переважно стосуються питань горизонтальної міграції Pb і Cd в умовах техногенно забруднених територій Донецько-Придніпровського регіону, а також агроландшафтів Лісостепу і Степу [7, 25, 30]. Зона ж Полісся залишилася поза увагою дослідників, хоча в окремих працях [34] вказується на хімічне забруднення її території Pb, що може призвести до проблем зі здоров'ям людей.

Мета і завдання досліджень

Зважаючи на наведене вище, нами було поставлено за мету визначити закономірності поширення валових і міцнофіксованих форм Pb і Cd у ґрунтах природних і агроландшафтів Житомирського Полісся, встановити особливості їх розподілу за генетичними горизонтами ґрутового профілю для різних типів ґрунтів та оцінити рівень забруднення ґрутового покриву природних і агроландшафтів на основі визначення геохімічних коефіцієнтів.

Об'єкти, методи та умови проведення досліджень

Дослідження ґрутового покриву природних і агроландшафтів виконували впродовж 2003–2012 рр. у межах поліської частини Житомирської області на території Баранівського, Брусилівського, Володарсько-Волинського, Ємельчинського, Коростенського, Коростишівського, Лугинського, Малинського, Народицького, Новоград-Волинського, Овруцького, Олевського, Радомишльського, Червоногармійського та Черняхівського адміністративних районів. Зразки ґрунту відбирали згідно з вимогами методики [17] та ДСТУ ISO 10381-4:2005 (ISO 10381-4:2003, IDT); їх підготовка до проведення аналізу виконувалася згідно з вимогами методики [18] та ДСТУ ISO 11464:2007 (ISO 11464:2006, IDT). Екстрагування валових форм важких металів, що містяться у ґрунті, проводили концентрованою HNO₃ згідно з вимогами [18], а екстрагування міцнофіксованих форм важких металів – 1н HNO₃. Визначення концентрації

хімічних елементів виконували за методом атомно-абсорбційної спектрометрії на приладі марки С 115–1М. Оцінку вмісту Pb і Cd у ґрунті здійснювали на основі визначення таких геохімічних коефіцієнтів, як коефіцієнт концентрації хімічного елемента (K_p) [30] та індекс насиченості ним ґрунту I_{el} [10]. Статистична обробка експериментальних даних була проведена з використанням пакета прикладних програм Microsoft Excel та Statistica 6.0.

Результати досліджень та їх обговорення

Свинець не належить до групи фізіологічно необхідних мікроелементів. Згідно з [24] за ступенем небезпечності для живих організмів його віднесено до першого (вищого) класу небезпеки. Природний вміст свинцю у ґрунтах успадковується від материнських порід і для ґрунтів України коливається в межах від 9 мг/100 г у піщаних відкладах до 90 мг/кг ґрунту в елювій–делювії. Середній вміст цього елемента у різних типах ґрунтів коливається від $0,37 \cdot 10^{-3}$ до $4,33 \cdot 10^{-3} \%$ [12, 32]. Його валовий вміст у ґрунтах України в середньому становить 8–12 мг/кг ґрунту і коливається від 10,7 (Лісостеп) до 15,3 мг/кг (Степ), поступово зростаючи з північного заходу на південь. Низьким вмістом валових форм свинцю характеризуються ґрунти Криму – 10 мг/кг – і Полісся – 11,4 мг/кг [35]. У Лісостепу певне підвищення вмісту валового свинцю приурочене до солонцоватих ґрунтів Полтавської області, а в Донбасі – до залягання чорноземів звичайних. Найвищим вмістом свинцю характеризуються ґрунти Карпатської зони (Передкарпаття, Карпати й Закарпаття), де його кількість в окремих ґрунтах досягає 240 мг/кг ґрунту [8, 9]. Характер розподілу рухомих форм свинцю у ґрунтах України аналогічний до розподілу їх валових форм, а вміст зменшується від ґрунтів Полісся до ґрунтів Лісостепу, Степу і Криму [22].

Грунти Житомирського Полісся характеризуються відносно низьким вмістом валового свинцю, який коливається в середньому від 5 до 20 мг/кг, що обумовлено, насамперед, якісним складом ґрунтотворних порід, легким гранулометричним складом ґрунту і низьким вмістом у ньому гумусу (табл. 1).

Таблиця 1. Вміст валових форм свинцю в окремих ґрутових відмінах агроландшафтів Житомирського Полісся, 2003–2012 рр., шар ґрунту 0–20 см

Назва ґрунту	Обстежена площа, га	Інтервал вмісту елемента, мг/кг				
		2–5	5–10	10–15	15–20	20–30
<i>Грунти агроекосистем</i>						
Дерново-слабопідзолистий піщаний на флювіогляціальних відкладах	45	<u>9,5</u> 21	<u>26,5</u> 59	<u>9,0</u> 20	—	—
Дерново-середньопідзолистий супіщаний на флювіогляціальних відкладах	80	<u>8,0</u> 10	<u>52,8</u> 66	<u>19,2</u> 24	—	—
Дерново-середньопідзолистий супіщаний на морені	60	—	<u>40,8</u> 68	<u>19,2</u> 32	—	—
Ясно-сірий опідзолений супіщаний на лесовидніх суглинках	50	—	<u>12,5</u> 25	<u>31,5</u> 63	<u>6,0</u> 12	—
Сірий опідзолений крупнопилувато-легкосуглиновий на лесовидніх суглинках	50	—	<u>9,0</u> 18	<u>33,5</u> 67	<u>7,5</u> 15	—
Темно-сірий опідзолений піщано-легкосуглиновий на лесовидніх суглинках	40	—	—	<u>10,4</u> 26	<u>24,0</u> 60	<u>5,6</u> 14
Дерновий глибокий глейовий супіщаний на воднольводовикових відкладах	40	—	—	<u>5,2</u> 13	<u>27,2</u> 68	<u>7,6</u> 19
Лучний опідзолений суглиновий на безкарбонатних глинах	40	—	<u>3,2</u> 8	<u>23,2</u> 58	<u>7,6</u> 19	<u>6,0</u> 15
<i>Грунти природних екосистем</i>						
Торфувато-болотний ґрунт	30	<u>2,4</u> 8	<u>4,2</u> 14	<u>5,4</u> 18	<u>14,4</u> 48	<u>3,6</u> 12
Дерново-слабопідзолистий піщаний на флювіогляціальних відкладах	80	<u>18,4</u> 23	<u>50,4</u> 63	<u>11,2</u> 14	—	—
Дерново-слабопідзолистий піщаний на древньоалювіальних відкладах	70	<u>16,8</u> 24	<u>53,2</u> 76	—	—	—
Дерново-середньопідзолистий супіщаний на морені	50	—	<u>10,5</u> 21	<u>32,5</u> 65	<u>7,0</u> 14	—

Примітка: чисельник – га; знаменник – % від обстеженої площи.

Максимальним вмістом валового свинцю – 16–20 мг/кг – характеризуються темно-сірі опідзолені, дернові і лучні ґрунти (від 20 до 60 % обстеженої площини), а мінімальним – 5,3–5,8 мг/кг – дерново-підзолисті піщані, сформовані на бідних на свинець флювіогляціальних і древньоалювіальних відкладах (від 10 до 20 % обстеженої площини). Високі коефіцієнти варіації цього елемента (від 18 до 32 %) у ґрунтах як природних, так і агроекосистем свідчать про нерівномірність і мозаїчність його розподілу, що є причиною антропогенного привнесення в довкілля.

Щодо міцнофіксованих форм свинцю, то мінімальні їх концентрації характерні для ґрунтів легкого гранулометричного складу, насамперед, піщаних. Максимальну кількість міцнофіксованого свинцю вміщують дерново-підзолисті глейові та поверхнево оглеєні ґрунти, від 70 до 75 % обстежених площин яких мають вміст цього елемента на рівні понад 6 мг/кг. Встановлено також наявність середнього негативного кореляційного зв’язку ($r = -0,68 \dots -0,73$) між вмістом у досліджуваних ґрунтах орних земель міцнофіксованих форм Pb і вмістом гумусу. Причиною цього, на наш погляд, є те, що Pb здатний утворювати комплексні сполуки з органічною речовиною ґрунту, внаслідок чого він стає тимчасово недоступним для рослин. Це положення підтверджують і дослідження інших авторів, якими встановлено спадаючий ряд елементів, здатних утворювати органо-мінеральні комплекси, який має вигляд: Cu > Pb > Cd > Zn [5].

Свинець є забруднювачем ґрунтового покриву агроекосистем Житомирського Полісся, оскільки навіть мінімальні його концентрації в ґрунті кратні трьом фонам (табл. 2). Коефіцієнти його концентрації коливаються залежно від типу ґрунту від 6–11 у ґрунтах піщаного гранулометричного складу, підstellenих елювієм масивно кристалічних порід, до 12–16 у глейових та ясно-сірих опідзолених ґрунтах.

Таблиця 2. Коефіцієнт концентрації K_c міцнофіксованих форм свинцю та індекс насиченості свинцем ІрРв окремих ґрунтових відмін агроландшафтів Житомирського Полісся, 2003–2012 рр., шар ґрунту 0–20 см

Назва ґрунту	Обстежена площа, га	K_c			Індекс насиченості ґрунту, ІрРв
		середнє значення межі коливання	≤ 3	> 3	
1	2	3	4	5	6
Дерново-підзолистий глеоватий супіщаний	145	<u>10,63</u> 3,05–17,28	—	<u>*145</u> 100	<u>**3,26</u> 1,75–4,16
Дерново-підзолистий глеоватий легкосуглинковий	80	<u>12,75</u> 6,58–21,23	—	<u>80</u> 100	<u>3,57</u> 2,56–4,61
Дерново-підзолистий супіщаний глейовий	55	<u>14,73</u> 9,28–23–18	—	<u>55</u> 100	<u>3,84</u> 3,05–4,81
Дерново-підзолистий глейовий супіщаний осушенний	70	<u>11,85</u> 7,25–18,70	—	<u>70</u> 100	<u>3,44</u> 2,69–4,32
Дерново-підзолистий глинисто-піщаний глейовий	90	<u>12,58</u> 8,50–14,83	—	<u>90</u> 100	<u>3,55</u> 2,92–3,85
Дерново-підзолистий неоглеєний глинисто – піщаний	80	<u>9,60</u> 1,98–13,0	<u>7,2</u> 9	<u>72,8</u> 91	<u>3,10</u> 1,41–3,61
Дерново-підзолистий глинисто-піщаний, підстелений елювієм масивно-кристалічних порід	80	<u>14,60</u> 8,83–23,0	—	<u>80</u> 100	<u>3,82</u> 2,97–4,80
Дерново-підзолистий супіщаний, підстелений елювієм масивно-кристалічних порід	90	<u>11,40</u> 4,63–14,80	—	<u>90</u> 100	<u>3,38</u> 2,15–3,85
Дерново-підзолистий піщаний, підстелений елювієм масивно-кристалічних порід	55	<u>9,08</u> 3,73–13,85	—	<u>55</u> 100	<u>3,01</u> 1,93–3,72
Дерново-підзолистий глеоватий глинисто-піщаний	90	<u>10,58</u> 6,80–16,28	—	<u>90</u> 100	<u>3,25</u> 2,61–4,03
Дерново-підзолистий глейовий глинисто-піщаний і супіщаний осушенний	80	<u>15,35</u> 9,25–23,28	—	<u>80</u> 100	<u>3,92</u> 3,04–4,82
Дерново-підзолистий неоглеєний супіщаний	50	<u>6,30</u> 1,55–11,13	<u>5,5</u> 11	<u>44,5</u> 89	<u>2,51</u> 1,24–3,34
Дерново-підзолистий супіщаний поверхнево-глеюватий	80	<u>15,75</u> 9,78–25,45	—	<u>80</u> 100	<u>3,97</u> 3,13–5,04
Дерново-підзолистий неоглеєний піщаний	80	<u>11,55</u> 4,28–16,10	—	<u>80</u> 100	<u>3,40</u> 2,07–4,01
Дерново-підзолистий неоглеєний глинисто-піщаний	80	<u>8,28</u> 1,50–12,05	<u>14,4</u> 18	<u>65,6</u> 82	<u>2,88</u> 1,22–3,47
Ясно-сірий опідзолений глеоватий супіщаний	50	<u>15,83</u> 9,80–20,28	—	<u>50</u> 100	<u>3,98</u> 3,13–4,50
Ясно-сірий опідзолений легкосуглинковий	50	<u>15,05</u> 8,33–19,08	—	<u>50</u> 100	<u>3,88</u> 2,89–4,37

Примітка: *чисельник – га; знаменник – % від обстеженої площи; ** – чисельник – середнє значення показника, знаменник – межі коливання показника.

Не було зафіксовано наявності у ґрунтах свинцю в концентраціях, еквівалентних його фоновому вмісту, і лише від 10 до 20 % обстежених площ дерново-підзолистих неоглесних глинисто-піщаних ґрунтів вміщували від 0,4 до 1,2 мг/кг ґрунту цього елемента. Про інтенсифікацію процесів акумуляції свинцю в орному шарі ґрунтів агроландшафтів свідчить і величина індексу насиченості ґрунту цим елементом, яка коливається від 2,5 до 3,9 і відповідає високому ступеню насичення. Оскільки валовий вміст свинцю як у ґрунтоутворюючих породах, так і у самих ґрунтах Полісся невисокий, природно припустити, що підвищений вміст його міцнофікованих форм у ґрунтах орних земель зумовлений виключно антропогенезом. Джерелами надходження свинцю до екосистем є: викиди металургійних підприємств, автомобільний транспорт, осади промислових і побутових стічних вод, а також хімічні засоби захисту рослин (інсектициди), до складу яких він входить. Щодо Житомирського Полісся, то джерелом забруднення його ґрунтового покриву свинцем вірогідно можуть бути й постчорнобильські випадіння цього елемента, на що, зокрема, вказано й у роботі [34]. Слід зауважити, що під час моніторингових спостережень за екологічним станом ґрунтового покриву особливу увагу необхідно приділяти, насамперед, оцінці рівнів вмісту у ґрунті міцнофікованих форм свинцю як найбільш вірогідних потенційних забруднювачів продукції агроценозів.

Характерною рисою Pb є його акумуляція у верхніх генетичних горизонтах, багатих на органічну речовину, та у верхній частині ілювіального горизонту, що пов'язано із вилуговуванням цього елемента у вигляді розчинних хелатних комплексів з органічними сполуками. Зазначена закономірність є результатом комплексної дії природних (біологічна акумуляція) і техногенних (привнесення як забруднювача) чинників. Тенденція до збільшення концентрації свинцю у верхньому гумусовому горизонті простежується й для сірих опідзолених ґрунтів. Вміст як валових, так і міцнофікованих форм цього елемента підвищується від ясно-сірих до темно-сірих ґрунтів пропорційно до поважчання гранулометричного складу як материнської породи, так і самих ґрунтів, та збільшення вмісту у них органічної речовини. Дернові і болотні ґрунти також здатні накопичувати свинець у верхніх генетичних горизонтах, багатих на органічну речовину.

Основні ґрунтоутворюючі породи Полісся природно бідні на кадмій [20], особливо мало його вміщують флювіогляціальні і древньоалювіальні піщані відклади, а також продукти вивітрювання кристалічних порід. У зв'язку з цим і ґрунти Полісся характеризуються відносно низькими запасами валового кадмію, які коливаються в середньому від 0,14 до 56 мг/кг (табл. 3).

Таблиця 3. Вміст валових форм кадмію в окремих ґрунтових відмінах агроландшафтів Житомирського Полісся, 2003–2012 рр., шар ґрунту 0–20 см

Назва ґрунту	Обстежена площа, га	Інтервал вмісту елемента, мг/кг				
		0,10– 0,20	0,20– 0,40	0,40– 0,60	0,60– 0,80	0,80– 1,0
Дерново-слабопідзолистий піщаний на флювіогляціальних відкладах	45	<u>35,1</u> 78	<u>9,9</u> 22	—	—	—
Дерново-середньопідзолистий супіщаний на флювіогляціальних відкладах	80	<u>29,6</u> 37	<u>50,4</u> 63	—	—	—
Дерново-середньопідзолистий супіщаний на морені	60	<u>10,2</u> 17	<u>35,4</u> 59	<u>14,4</u> 24	—	—
Ясно-сірий опідзолений супіщаний на лесовидних суглинках	50	—	<u>31,0</u> 62	<u>13,0</u> 26	<u>6,0</u> 12	—
Сірий опідзолений крупнопилувато-легкосуглинковий на лесовидних суглинках	50	—	<u>5,0</u> 10	<u>38,0</u> 76	<u>7,0</u> 14	—
Темно-сірий опідзолений піщано-легкосуглинковий на лесовидних суглинках	40	—	<u>2,4</u> 6	<u>31,2</u> 78	<u>6,4</u> 16	—
Дерновий глибокий глейовий супіщаний на воднольодовикових відкладах	40	—	<u>1,6</u> 4	<u>26,8</u> 67	<u>9,2</u> 23	<u>2,4</u> 6
Лучний опідзолений суглинковий на безкарбонатних глинах	40	—	<u>1,6</u> 4	<u>24,8</u> 62	<u>9,6</u> 24	<u>4,0</u> 10
<i>Грунти природних екосистем</i>						
Торфувато-болотний ґрунт	30	<u>3,3</u> 11	<u>4,2</u> 14	<u>19,8</u> 66	<u>2,7</u> 9	—
Дерново-слабопідзолистий піщаний на флювіогляціальних відкладах	80	<u>58,4</u> 73	<u>21,6</u> 27	—	—	—
Дерново-слабопідзолистий піщаний на деревноалювіальних відкладах	70	<u>55,3</u> 79	<u>14,7</u> 21	—	—	—
Дерново-середньопідзолистий супіщаний на морені	50	-	<u>34,5</u> 69	<u>15,5</u> 31	—	—

Примітка: чисельник – га; знаменник – % від обстеженої площи.

Максимальним вмістом міцнофіксованих форм кадмію характеризуються ґрунти більш важкого гранулометричного складу, багаті на органічну речовину, а також ті, що мають ознаки оглеєння. У ґрунтах природних екосистем вміст валового Cd нижчий, порівняно з ґрунтами агроекосистем, і в середньому становить від 0,2 до 0,4 мг/кг. В агроландшафтах від 20 до 80 % обстежених площ ґрунтів мають вміст цього елемента на рівні 0,4–0,6 мг/кг, а від 12 до 24 % – на рівні від 0,6 до 0,8 мг/кг. Найбіднішими на валовий кадмій є ґрунти, сформовані на флювіогляціальних і деревноалювіальних пісках (0,12–0,26 мг/кг). Оскільки на фіксацію кадмію в ґрунті впливають, насамперед, процеси його адсорбції на

глинистих частках, при поважчанні гранулометричного складу ґрунту чітко простежується тенденція до зростання вмісту в ньому валового кадмію до 0,8–1,0 мг/кг.

Кадмій, який потрапив у ґрунт, присутній у ньому, головним чином, у доступному для рослин стані, що має негативне екологічне значення. Рухома форма зумовлює порівняно високу міграційну здатність елемента в ландшафті і призводить до підвищеної забрудненості потоку речовин, що надходять із ґрунту в рослини. щодо ґрунтового покриву агроландшафтів Житомирського Полісся, то мінімальний вміст міцнофіксованих форм кадмію, який становить 0,03–0,07 мг/кг, характерний для ґрунтів легкого гранулометричного складу, насамперед, піщаних, підстелених елювієм масивно-кристалічних порід. Максимальну кількість міцнофіксованих форм цього елемента накопичують дерново-підзолисті та ясно-сірі опідзолені супіщані глеюваті ґрунти, у 0–20 см шарі яких концентрується понад 0,2 мг/кг Cd. Кількість рухомих форм кадмію зростає зі збільшенням вмісту органічної речовини та поважчанням гранулометричного складу ґрунту. На переважно техногенну природу його походження в ґрунті вказують високі коефіцієнти варіації вмісту міцнофіксованих форм – 60–82 %, оскільки полютант завжди має більш високий ступінь варіювання у просторі, ніж педогенний елемент. Джерелами потрапляння кадмію в екосистеми є промислові викиди, осади промислових і побутових стічних вод, сільськогосподарська діяльність (застосування фосфорних мінеральних добрив, вапнякових матеріалів) та викиди автотранспорту (гума автомобільних шин і мастильні матеріали вміщують кадмій). Близько 80 % антропогенних викидів цього полютанта пов’язані з виробництвом міді, свинцю, цинку і кадмію; біля 45 % загального забруднення цим елементом припадає на виплавку кадмію з руд; 52 % кадмію надходить в атмосферу внаслідок спалювання чи переробки виробів, що його вміщують [4, 32]. Значні кількості кадмію можуть потрапляти у ґрунт при внесенні мінеральних добрив: вміст його у фосфорних добривах, залежно від місця походження фосфатної сировини, може коливатись від 0,76–0,77 г/т P₂O₅ (Росія) до 43–49 г/т P₂O₅ (Марокко) і навіть досягати 176–218 г/т P₂O₅ (Туніс) [12, 32].

Для ґрунтів природних і агроландшафтів Полісся кадмій не виступає як пріоритетний елемент – забруднювач, оскільки коефіцієнт його концентрації лише в окремих випадках досягає 1,1–1,3, в середньому коливаючись від 0,15 до 0,95 (табл. 4). Проте, зважаючи на те, що хімічні і фізико-хімічні властивості ґрунтів Полісся досить сприятливі для підвищеної міграції кадмію у системі «ґрунт–рослина» або «ґрунт–вода», навіть на малозабруднених ґрунтах можливе одержання забрудненої рослинницької продукції.

Міграція кадмію за профілем дерново-підзолистого ґрунту має чітко виражений елювіально-ілювіальний характер. Має місце збіднення на кадмій елювіальних горизонтів, із яких він інтенсивно вимивається у нижні ілювіальні горизонти. Відсоток міцнофіксованих форм кадмію від його валового вмісту у

дерново-підзолистих ґрунтах є найвищим серед усіх досліджуваних елементів і коливається від 24 до 40 %. Це вказує на можливість їх накопичення рослинними організмами навіть на незабруднених ґрунтах. Вміст валових і міцнофіксованих форм Cd зростає зі збільшенням вмісту у ґрунті фізичної глини і підвищується від піщаних до суглинкових ґрунтів. Збагачення на Cd верхнього гумусового горизонту пов'язане із його техногенно-антропогенным привнесенням та збідненням елювіального горизонту, із якого цей елемент інтенсивно вимивається у нижній ілювіальний горизонт. Для ясно-сірого опідзоленого ґрунту характерним є зниження вмісту кадмію в елювіально-гумусовому горизонті, та зростання його концентрації в напрямку до материнської породи.

Таблиця 4. Коефіцієнт концентрації K_c міцнофіксованих форм кадмію та індекс насиченості кадмієм I_{pcd} окремих ґрутових відмін агроландшафтів Житомирського Полісся, 2003–2012 рр., шар ґрунту 0–20 см

Назва ґрунту	Обстежена площа, га	K_c			Індекс насиченості ґрунту, I_{pcd}
		середнє значення межі коливання	≤ 1	> 1	
Дерново-підзолистий глеюватий супіщаний	145	0,75 0,10–0,90	145 100	—	0,87 0,32–0,95
Дерново-підзолистий глеюватий легкосуглинковий	80	1,10 0,30–1,80	21,6 27	58,4 73	1,05 0,55–1,34
Дерново-підзолистий супіщаний глейовий	55	0,95 0,45–1,70	16,0 73	39,0 27	0,97 0,67–1,30
Дерново-підзолистий глейовий супіщаний осушенний	70	0,85 0,30–1,0	70 100	—	0,92 0,55–1,0
Дерново-підзолистий глинисто-піщаний глейовий	90	0,90 0,40–1,10	81,9 91	8,1 9	0,95 0,63–1,05
Дерново-підзолистий неоглеєний глинисто – піщаний	80	0,65 0,10–0,80	80 100	—	0,81 0,32–0,89
Дерново-підзолистий глинисто-піщаний, підстелений елювієм масивно-кристалічних порід	80	0,35 0,20–0,55	80 100	—	0,59 0,45–0,74
Дерново-підзолистий супіщаний, підстелений елювієм масивно-кристалічних порід	90	0,25 0,15–0,40	90 100	—	0,50 0,39–0,63
Дерново-підзолистий піщаний, підстелений елювієм масивно-кристалічних порід	55	0,15 0,10–0,25	55 100	—	0,39 0,32–0,50
Дерново-підзолистий глеюватий глинисто-піщаний	90	0,85 0,25–1,20	69,3 77	20,7 23	0,92 0,50–1,10
Дерново-підзолистий глейовий глинисто-піщаний осущений	80	1,25 0,30–1,90	14,4 18	65,6 82	1,12 0,55–1,38
Дерново-підзолистий неоглеєний супіщаний	50	0,80 0,55–1,15	39,5 79	10,5 21	0,89 0,74–1,07

Дерново-підзолистий супіщаний поверхнево-глеюватий	80	<u>1,0</u> 0,35–1,65	<u>53,6</u> 67	<u>26,4</u> 33	<u>1,0</u> 0,59–1,28
Дерново-підзолистий неоглеєний піщаний	80	<u>0,55</u> 0,30–0,85	<u>80</u> 100	—	<u>0,74</u> 0,55–0,92
Дерново-підзолистий неоглеєний глинисто-піщаний	80	<u>0,40</u> 0,20–0,60	<u>80</u> 100	—	<u>0,63</u> 0,45–0,77
Ясно-сірий опідзолений глеюватий супіщаний	50	<u>1,30</u> 0,75–1,95	<u>6,5</u> 13	<u>43,5</u> 87	<u>1,14</u> 0,87–1,40
Ясно-сірий опідзолений легкосуглинковий	50	<u>1,10</u> 0,75–1,70	<u>10,0</u> 5,0	<u>45,0</u> 90	<u>1,05</u> 0,87–1,30

Примітка: *чисельник – га; знаменник – % від обстеженої площини; ** – чисельник – середнє значення показника, знаменник – межі коливання показника.

Однак у сірому опідзоленому ґрунті ця тенденція вже не прослідовується, а характер міграції Cd за ґрутовим профілем має чітко виражений радіальний характер. У темно-сірому опідзоленому ґрунті кадмій розподіляється рівномірно по всьому ґрутовому профілю, дещо збільшуючись у материнській породі. Характер міграції валових і міцнофіксованих форм кадмію у дернових і болотних ґрунтах має чітко виражену радіальну спрямованість і зменшується від верхніх горизонтів до материнської породи.

Висновки

- У ґрутовому покриві природних і агроландшафтів Житомирського Полісся фіксується відносно низький вміст валових і міцнофіксованих форм кадмію і валових форм свинцю.
- Для ґрунтів природних і агроландшафтів Cd не є забруднювачем, а коефіцієнт його концентрації в середньому коливається від 0,15 до 0,95. Характер міграції Cd за профілем дерново-підзолистих ґрунтів має чітко виражений елювіально-ілювіальний, сірих опідзолених – радіальний характер, а у темно-сірих опідзолених ґрунтах Cd розподіляється рівномірно по всьому ґрутовому профілю.
- Пріоритетним забруднювачем ґрутового покриву в природних і агроландшатах є свинець, коефіцієнти концентрації міцнофіксованих форм якого коливаються залежно від типу ґрунту від 6–11 у ґрунтах піщаного гранулометричного складу, підстелених елювієм масивно кристалічних порід до 12–16 у дерново-підзолистих глейових та ясно-сірих опідзолених ґрунтах.
- Характерною рисою Pb є його акумуляція у верхніх генетичних горизонтах, багатих на органічну речовину, та у верхній частині ілювіального горизонту, що пов’язано із вилуговуванням цього елемента у вигляді розчинних хелатних комплексів з органічними сполуками.

Література

1. Біогеохімічні показники ґрунтів у зоні впливу Костянтинівського свинцево-цинкового комбінату / І. В. Кураєва, В. Й. Манічев, С. В. Олішевська та ін. // Мінерал. журн. – 2009. – 31, № 1. – С. 58–62.
2. Важкі метали у ґрунтах заповідних зон України / Е. Я. Жовінський, І. В. Кураєва, А. І. Самчук та ін.; за ред. Е. Я. Жовінського. – К. : Логос, 2005. – 104 с.
3. Важкі метали у ґрунтах Поліського заповідника / [Е. Я. Жовінський, А. І. Самчук, В. Й. Манічев, Г. В. Петріченко] // Мінерал. журн. – 2004. – 26, № 2. – С. 47–53.
4. Ведення сільськогосподарського виробництва у приватному секторі в умовах посиленого антропогенного впливу на навколошне середовище / Т. М. Мислива, П. П. Надточий, Л. О. Герасимчук та ін.; за ред. Т. М. Мисливої. – Житомир, 2011. – 50 с.
5. Влияние высоких концентраций тяжелых металлов на гумусное состояние и биологическую активность чернозема обыкновенного карбонатного / О. С. Безуглова, В. Ф. Вальков, К. Ш. Казеев и др. // Известия высших учебных заведений. – Северо-Кавказский регион. Сер. Естественные науки. – 1999. – №2. – С. 65–71.
6. Вовк О. Б. Особливості ґрутового моніторингу в умовах міста (на прикладі м. Львова) / О.Б. Вовк // Екологія та ноосферологія. – 2007. – Т. 18, № 1–2. – С. 57–63.
7. Геохімічні особливості розподілу важких металів у ґрунтах і рослинах балочного рельєфу лісостепової зони (на прикладі Полтавської області) / В.О. Стадник, А.І. Самчук, Б.О. Батієвський [та ін.] // Мінерал. журн. – 2004. – 26, № 2. – С. 54–60.
8. Дмитрук Ю. М. Геохімічні особливості ґрунтів агроландшафтів Передкарпаття / Ю. М. Дмитрук // Вісн. аграрн. науки. – 2005. – № 5. – С. 51–55.
9. Дмитрук Ю. М. До питання методики геохімічної характеристики ґрутового покриву екосистем / Ю. М. Дмитрук // Агроеколог. журн. – 2004. – № 4. – С. 56–63.
10. Дмитрук Ю. М. Оцінка вмісту нікелю в ґрунтах Покутсько-Буковинських Карпат на основі геохімічних коефіцієнтів / Ю. М. Дмитрук // Грунтознавство. – 2003. – Т. 4. – № 1 – 2. – С. 78–83.
11. Жовинский Э. Я. Геохимия тяжелых металлов в почвах Украины / Э. Я. Жовинский, И. В. Кураева. – К. : Наук. думка, 2002. – 214 с.
12. Кабата-Пендіас А. Микроэлементы в почвах и растениях; пер. с англ. / А. Кабата-Пендіас, Х. Пендіас. – М.: Мир, 1989. – 439 с.
13. Козловський В. І. Важкі метали в екосистемах техногенно порушених територій Яворівського родовища сірки (Передкарпаття) / В. І. Козловський // Наук. зап. Держ. природознав. музею. – 2009. – Вип. 25. – С. 99–110.

14. Костишин С. С. Природний та антропогенно трансформований рівень рухомих форм важких металів та алумінію в ґрунтах різних природних зон Чернівецької області України / С. С. Костишин, С. С. Руденко, Т. В. Морозова // Наук. вісн. Чернівецьк. ун-ту Серія: Біологія. – 2001. – Вип. 126. – С. 70–84.
15. Макаренко Н. А. Рухомість свинцю у різних типах ґрунтів України під впливом природних та антропогенних чинників / Н. А. Макаренко, І. В. Паращенко // Агроеколог. журн.. – 2007. – №3. – С. 34–39.
16. Мельник А. І. Моніторинг вмісту важких металів у ґрунтах Чернігівської області / А. І. Мельник, Г. О. Усманова // Агроекологічн. журн. – 2008. – Спец. вип. – С. 178–181.
17. Методика суцільного ґрутового агрохімічного моніторингу сільськогосподарських угідь України / за ред. О. О. Созінова, Б. С. Прістера. – К., 1994. – 162 с.
18. Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства. – М. : ЦИНАО, 1991. – 58 с.
19. Мислива Т. М. Важкі метали в урбаноземах агроселітебних ландшафтів південно-західної частини м. Житомира / Т. М. Мислива, Л. О. Герасимчук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – Сер. Агрономія. – 2011. – Вип. 162, ч. 1. – С. 155–165.
20. Мислива Т. М. Важкі метали у ґрунтах агроландшафтів Житомирського Полісся / Т. М. Мислива, В. А. Трембіцький // Агроеколог. журн. – 2009. – №4. – С. 30–35.
21. Мислива Т. М. Особливості накопичення важких металів в урбаноземах м. Житомир / Т. М. Мислива // м-ли міжнар. наук.-практ. конф. [Сучасне ґрунтознавство: наукові проблеми та методологія викладання], (Київ, 29–30 травня 2012 р.) / Кабінет Міністрів України [та ін.]. – Київ, 2012. – С. 183–189.
22. Мірошниченко М. М. Агрогеохімія мікроелементів у ґрунтах України / М.М. Мірошниченко, А. І. Фатеєв / Агрохімія і ґрунтознавство: міжвід. темат. наук. зб. – спец. вип. – кн. 1. – Житомир: Рута, 2010. – С. 98–107.
23. Мірошниченко М. М. Рухомість кадмію у ґрунтах і його транслокація до рослин / М. М. Мірошниченко, А.І. Фатеєв, Д. О. Семенов // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – 2005. – Вип. 257. – С. 112–117.
24. Охрана природы. Почвы. Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ: ГОСТ 17.4.3.06–86 [Чинний від 1986-10-03]. – Госстандарт ССРС, 1986. – [Електронний ресурс]: Режим доступу: www.vsesnip.com/Data1/8/8934/index.htm.

25. *Параняк Р. П. Шляхи надходження важких металів в довкілля та їх вплив на живі організми / Р. П. Параняк, Л. П. Васильцева, Х. І. Макух // Біологія тварин.* – 2007. – Т. 9, № 3. – С. 83–89.
26. Природный комплекс большого города (ландшафтно-экологический анализ) / Э. Г. Коломыц, О. В. Глебова, В. П. Юнина и др. – М.: Наука, 2000. – 286 с.
27. Руденко С. С. Порівняльний аналіз забруднення агроландшафтів Чернівецької області важкими металами та алюмінієм / С. С. Руденко, С. С. Костшин, Т. В. Морозова // Екологія та ноосферологія. – 2003. – Т. 14, № 3–4. – С. 73–78.
28. Самчук А. І. Важкі метали у ґрунтах Українського Полісся та Київського мегаполісу / А. І. Самчук, І. В. Кураєва, О. С. Єгоров. – К.: Наук. думка, 2006. – 108 с.
29. Семенов А. Д. Забруднення важкими металами ґрунту і рослин у смугах відчуження залізничних колій / А. Д. Семенов, В. П. Сахно, В. М. Мартиненко // Агроекол. журн. – 2008. – № 3. – С. 50–53.
30. Семенов Д. О. Рухомі форми кадмію у ґрунтах Лісостепу та Степу України / Д. О. Семенов // Вісник ХНАУ. – 2008. – № 2. – С. 126–129.
31. Семенов Д. О. Рухомість кадмію у системі ґрунт-рослина / Д. О. Семенов // Вісник аграрної науки. – 2008. – № 9. – С. 73–75.
32. Соколов О. А. Экологическая безопасность и устойчивое развитие. Кн. 1. Атлас распределения тяжелых металлов в объектах окружающей среды / О.А. Соколов, В. А. Черников. – Пущино : ОНТИ ПНЦ РАН, 1999. – 164 с.
33. Трунова О. І. Екологічна оцінка стану забруднення ґрунтів району відвалу фосфориту ВАТ «Суміхімпром» важкими металами / І. О. Трунова // Вісн. Сум. держ. ун-ту. – Сер. Техн. науки. – 2006. – № 5. – С. 135–138.
34. Тяжелые металлы в почве Украины / [И. М. Трахтенберг, В. М. Шестопалов, М. В. Набока, О. А. Бобылева] // Здоровье Украины. – 1999. – № 9. – С. 29.
35. Фатеев А. И. Фоновый вміст мікроелементів у ґрунтах України / А. И. Фатеев, Я. В. Пащенко. – Харків, 2003. – 72 с.