

РЕЦЕНЗІЯ

на монографію І.І. Горпинченка, Д.З. Воробця

«Механізми розвитку сексуальної дисфункції»

У жовтні 2013 року в м. Львові вийшла з друку монографія «Механізми розвитку сексуальної дисфункції», підготовлена професором І.І. Горпинченком та доктором медичних наук Д.З. Воробцем.

В останні роки в Україні було підготовлено та видано небагато книг з питань порушення статевої функції, тому кожна з них привертає велику увагу з боку фахівців.

Загальновідомо, що сексуальне життя людини посідає пріоритетне місце в системі її цінностей, а розлади у цій сфері є причиною виникнення дезадаптації у подружніх стосунках, зниження самооцінки, невротизації, психічних порушень, що в результаті знижує якість життя в цілому. Питанням розладів сексуального здоров'я у чоловіків присвячені численні наукові як зарубіжні, так і вітчизняні праці. У цих дослідженнях акцент робиться частіше на соматичних, рідше на психологічних причинах статевих розладів та відповідно рекомендуються методи їхньої корекції і лікування.


Однак поза увагою спеціалістів залишалося ретельне вивчення розладів сексуального здоров'я чоловіків на основі комплексного дослідження різних форм розладів ерекції, яке базувалося б на біохімічних дослідженнях функції ендотелію судин. Крім того, відсутні чіткі практичні рекомендації з біохімічних досліджень функції епітелію судин, необхідність яких для практичних лікарів в сучасній урології та сексопатології не викликає сумнівів. Саме це і зумовлює інтерес до монографії.

У монографії вперше на основі комплексного підходу відображені патогенетичні механізми розвитку сексуальної дисфункції у чоловіків, які проявляються метаболічними змінами – дисліпідемією, андрогенодефіцитом, дисфункцією NO-синтаз, аргінази, АТФ-гідролазних систем та зумовлюють погіршення якості життя. Показано важливе для виникнення ерекції значення біохімічних процесів функціонування ендотелію судин. Базуючись на встановлених зв'язках між порушенням лібідо, еректильними та еякуляторними розладами, в монографії зазначено, що навіть при первинних скаргах лише на порушення ерекції, страждають також інші складові сексуального здоров'я.

Відображена залежність сексуальних розладів від віку пацієнтів з проблемами метаболічного синдрому та пізнього гіпогонадизму. Автори детально описують процес дослідження кровотоку у кавернозних артеріях при кольоровій доплерографії неерегованого статевого члена та найвище негативне та позитивне передбачуване значення.

Проте, як уже зазначалося іншими дослідниками (Жуков О.Б., 2008), необхідно застерегти лікарів від гіпердіагностики судинних розладів ерекції за даними базового кровотоку релаксованого (неерегованого) статевого члена,

яка може призвести до необгрунтованого призначення дорогого лікування і дискредитації методу. Діагностично важливими ознаками судинної патології статевого члена є



тільки градієнти функціональних параметрів пенільного кровотоку в значущих стадіях ерекції.

У монографії також описані показники анкетування чоловіків, хворих на сексуальні розлади. Використання опитувальників широкого спектра в поєднанні з клініко-лабораторними, особливо біохімічними, методами дослідження, значно розширює існуючі уявлення про етіологію та патогенез виникнення розладів ерекції, що також дає можливість лікарю успішніше планувати діагностично-лікувальний процес.

Монографія І.І. Горпинченка і Д.З. Воробця «Механізми розвитку сексуальної дисфункції» буде цікавою як для практичних лікарів, так і для науковців, які вивчають механізми виникнення статевих розладів.

*Професор кафедри сексології та медичної психології
Харківської медичної академії післядипломної освіти
доктор медичних наук, професор Б.М. Ворнік*