

# СОДЕРЖАНИЕ 5 (121)/2017

## ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Вплив категорії ургентності кесарева розтину на адаптаційні можливості вагітних та роділь І.А. Усевич, В.Л. Колесник .....10

## НОВОСТИ И СОБЫТИЯ

Пост-релиз I Международного Конгресса «Репродуктивное здоровье: мультидисциплинарный подход в непрерывном профессиональном развитии врачей» (Часть 1) .....16

Микронизированный прогестерон и его роль в сохранении беременности и здоровья женщины при процедуре ЭКО (Пост-релиз) .....26

## АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

Аналіз випадків абдомінального розродження за гострої гіпоксії плода Ю.П. Вдовиченко, Н.П. Гончарук, О.Ю. Гурженко ....28

Психопрофілактика стресу під час вагітності та пологів І.А. Анчева .....32

Гестоз з точки зору перинатальної психології В.С. Жук, О.Д. Щуревська .....35

## В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

Ефективний шлях відновлення антиоксидантного потенціалу .....38

Вплив медичних та соціально-психологічних факторів на зміни психологічного статусу у пацієнток після проведених симультанних оперативних втручань В.Л. Дронова, О.М. Мокрик, Р.С. Теслюк .....42

Показники уратно-оксалатного обміну в осіб з цукровим діабетом, що зазнали малоінвазивного лікування з приводу уретеролітазу А.Ю. Гурженко .....46

Клінічні прояви порушень репродуктивного здоров'я і якість життя у жінок фертильного віку в умовах коморбідності при субклінічному гіпотиреозі Л.М. Варченко .....54

## Журнал «Здоровье женщины» индексируется и/или представлен здесь:

- «Библиометрика украинской науки»
- «Научная периодика Украины» (Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского)
- Google Scholar
- Copernicus International
- Science Index (eLIBRARY.RU)
- CrossRef (статьям журнала присваивается цифровой идентификатор объекта (DOI))
- INFOBASEINDEX
- ReaserchBib
- SIS
- Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
- Open Academic Journals Index (OAJI)
- Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
- International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)
- Hinari



# ПОЛІЖИНАКС®

Ністатин, Неоміцин, Поліміксин В

Унікальна комбінація широкого спектра дії  
для ефективного лікування вагітності\*

3 активні речовини\*

Ністатин  
Неоміцин  
Поліміксин В


Бактерії  
Грам +



Бактерії  
Грам -



Гриби роду  
*Candida*



**ПОЛІЖИНАКС**

Застосовувати інтравагінально ввечері перед сном 1 капсулу на добу. Курс лікування – 12 днів, профілактичний курс – 6 днів.



**ПОЛІЖИНАКС ВІРГО**

Для застосування у дитячій гінекологічній практиці.

Вміст 1 капсули вводиться інтравагінально (попередньо відірвавши кінець капсули) перед сном протягом 6 днів поспіль.

UA/101/993/01/01 Наказ МОЗ №101/9 від 29.12.2014



Представництво «Лабораторія Іннотек Інтернасьйональ» в Україні,  
01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська/Михайлівська, буд. 6/5.

\* Інструкція для медичного застосування препарату "Поліжинакс" та "Поліжинакс Вірго".  
Матеріал для розповсюдження в рамках спеціалізованих семінарів, конференцій, симпозіумів з медичної тематики та у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних та фармацевтичних працівників.  
Характеристики препарату дивіться на стор. 63

# Тотема®

залізо, мідь, марганець

ФРАНЦУЗЬКА ЯКІСТЬ –  
ЗАЛІЗНИЙ РЕЗУЛЬТАТ!



тотема Fe<sup>2+</sup>  
Mn Cu

- Швидка гематологічна відповідь<sup>1</sup>
- Органічні солі заліза, міді та марганцю<sup>2</sup>
- Можливе застосування під час вагітності<sup>2</sup>
- Дозволено дітям з 1-го місяця<sup>2</sup>
- Відповідає рекомендаціям ВООЗ<sup>3</sup>



<sup>1</sup> С.В. Семочкин Клиническая эффективность применения препарата Тотема в лечении железодефицитной анемии у взрослых: гематологический ответ и улучшение качества жизни «Земский врач»; № 1; 2012; стр. 37-42.  
<sup>2</sup> Інструкція для медичного застосування.  
<sup>3</sup> WHO Model List of Essential Medicines 18th list (April 2013) (Final Amendments – October 2013).



Представництво «Лабораторія Іннотек Інтернасьйональ» в Україні: 01001, Київ, вул. М.Житомирська, 6, тел. (044) 278 06 38, innotech@innotech.com.ua

Склад лікарського засобу: 1 ампула (10 мл) містить заліза (у вигляді заліза глюконату) 50 мг; марганцю (у вигляді марганцю глюконату) 1,33 мг; міді (у вигляді міді глюконату) 0,7 мг.

Показання для застосування. Залізодефіцитна анемія. Профілактичне лікування залізодефіциту у вагітних жінок, недоношених немовлят, близнюків або дітей, які народжені жінками з дефіцитом заліза. Якщо раціон харчування не містить достатньої кількості заліза. Протипоказання. Надлишок заліза в організмі. Регулярні гемотрансфузії. Одноточне застосування парентеральних форм заліза. Кишкова непрохідність. Залізорефрактерна анемія. Анемія, пов'язана з недостатністю медулярного кровотворення. Гіперчутливість до компонентів препарату. Сладкова непереносимість фруктози. Побічні ефекти. З боку шлунково-кишкового тракту: нудота, печія, закрп, діарея. Можливе тимчасове забарвлення випорожнення у чорний колір, що не має клінічного значення та, ніяких наслідків для здоров'я. Можлива тимчасова зміна кольору зубної емалі, яка не має ніяких наслідків для здоров'я і зникає після закінчення лікування. Для запобігання такому явищу достатньо розвести розчин препарату у відповідному напої та під час застосування не тримати його довшо у ротовій порожнині. Можливі алергічні реакції (свербіж, висипання, кропив'янка, анафілактична реакція); біль у животі, блювання.

Спосіб застосування та дози. Вміст ампули слід розчинити у простій чи підсопідженій воді або в будь-якому іншому напої, крім чаю, кави, молока та напоїв, що містять алкоголь. Лікування залізодефіцитної анемії: дорослим призначають по 100-200 мг заліза на добу, тобто 2-4 ампули препарату; дітям віком від 1 місяця, препарат призначають із розрахунку 5-10 мг заліза на 1 кг маси тіла на добу. Для лікування залізодефіциту застосовують вдвічі меншу дозу препарату ніж для лікування анемії. Профілактика анемії та залізодефіциту: для профілактики анемії в період вагітності препарат призначають вагітним із розрахунку по 50 мг елементарного заліза (1 ампула) на день протягом другого та третього триместрів вагітності, або починаючи з 4-го місяця вагітності. Категорія відпуску. Без рецепта. Реєстраційне посвідчення №UA/7854/01/01 Наказ МОЗ № 752 від 23.08.2013

Матеріал для розповсюдження в рамках спеціалізованих семінарів, конференцій, симпозіумів з медичної тематики та у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних та фармацевтичних працівників.

# СОДЕРЖАНИЕ 5 (121)/2017

Лікування нетипових форм прогресуючої варикозної хвороби вен у вагітних (варикоз вен пахвинного каналу)

В.М. Антонюк-Кисіль, І.Я. Дзюбановський,  
В.М. Єнікеєва, С.І.Лічнер, В.М. Липний,  
М.В. Семенюк.....57

Сравнительное исследование сывороточных уровней цинка, меди, марганца и железа у беременных с преэклампсией

М.С. Sarwar et al. ....63

Особливості рухової активності плодів у III триместрі вагітності: результати проспективного когортного дослідження

В.І. Ошовський, О.Г.Соловей .....66

## АКУШЕРСТВО

Профілактика невиношування вагітності у II триместрі у жінок, які багато народжують

О.В. Набхан .....71

Ефективність застосування різних форм мікронізованого прогестерону під час лікування загрози аборту

В.І. Пирогова, І.В. Козловський, Н.С. Вереснюк,  
М.Й. Малачинська.....74

Risks of miscarriage and noncarrying of pregnancy in women with excessive body weight, obesity and metabolic syndrome

О.А. Dyndar, V.O. Benyuk, L.D. Lastoveckaya.....78

Гіперглікозильований хоріонічний гонадотропін – прогностичний критерій розвитку ускладнень вагітності

Н.В. Пехньо.....82

## ЛЕКЦИИ И ОБЗОРЫ

Ведення пацієток з лейоміомою матки.

Консервативні методи лікування

(Огляд канадського клінічного керівництва SOGC)

Н.Я. Жилка .....86

## ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Гиперпролактинемия: оптимальный алгоритм лабораторной диагностики

О.В. Рыкова .....92

## МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОТОКОЛЫ

Увеличение частоты послеродовых кровотечений, возможная связь с серотонинергическими и другими психофармакологическими препаратами:

сопоставляющее когортное исследование

Hanna M. Heller, Anita C. J. Ravelli, Andrea H. L. Bruning, Christianne J. M. de Groot, Fedde Scheele, Maria G. van Pampus and Adriaan Honig Heller et al. ....96

Менеджмент наследственных нарушений свертываемости крови во время беременности

Руководство № 71 (совместно с UKHCDO).....102

## ГИНЕКОЛОГИЯ

Гормональний статус пацієток після хірургічного лікування фіброзно-кістозної мастопатії та можливості його корекції

Ю.Я. Присташ .....128

Сучасні можливості лікування хронічних запальних захворювань статевих органів у жінок фертильного віку

Вл.В. Подольський, В.В. Подольський.....132