

СОДЕРЖАНИЕ 7 (123)/2017

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Апендикулярно-генітальний синдром у дитячій гінекології Т.В. Герасимова, О.М. Гопчук	11
---	----

НОВОСТИ. СОБЫТИЯ

Рациональное ведення пологів. Сучасні підходи до проведення передіндукції та індукції пологів.....	14
--	----

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

Національний консенсус щодо ведення пацієнок з цервікальними інтраепітеліальними неоплазіями, зумовленими папіломавірусною інфекцією Робоча група	16
--	----

Современная тактика лечения железодефицитной анемии С.Н. Гайдукова, С.В. Выдыборец	25
---	----

Новые аспекты в лечении лейомиомы матки, ассоциированной с эндометриозом В.В. Каминский, Е.В. Прокопович	32
---	----

Тактика лікування кіст нирок С.О. Возіанов, А.І. Бойко, Т.І. Шматюк, Д.І. Купрін	36
---	----

Гестаційна коагулопатія: прорив у поглядах на профілактику кровотеч М.В. Макаренко, Д.О. Говсєєв, І.В. Сокол, А.І. Слободенюк, В.О. Берестовий, Р.М. Ворона	40
--	----

Нові можливості у лікуванні міом тіла матки – HIFU-технологія Т.М. Козаренко, І.Ю. Карачарова, В.М. Гончаренко, О.М. Ключов, Т.М. Говоруха.....	47
--	----

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

Клінічна ефективність вагінальних супозиторіїв, що містять мірамістин, у користувачів акушерського педарію при неспецифічному вагініті Д.Г. Коньков, А.В. Старовер, О.В. Булавенко, А.В. Вознюк.....	52
---	----

Оптимізація прегравідарної підготовки жінок з міомою матки А.А. Довгань.....	59
---	----

Перспективи безперервного професійного розвитку в умовах приватного медичного центру І.В. Яроцька, С.Ю. Вдовиченко	61
---	----

Журнал «Здоровье женщины» индексируется и/или представлен здесь:

- «Библиометрика украинской науки»
- «Научная периодика Украины» (Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского)
- Google Scholar
- Copernicus International
- Science Index (eLIBRARY.RU)
- CrossRef (статьям журнала присваивается цифровой идентификатор объекта (DOI))
- INFOBASEINDEX
- ReaserchBib
- SIS
- Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
- Open Academic Journals Index (OAJI)
- Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
- International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)
- Hinari



ПОЛІЖИНАКС®

Ністатин, Неоміцин, Поліміксин В

Унікальна комбінація широкого спектра дії
для ефективного лікування вагітності*

3 активні речовини*

Ністатин
Неоміцин
Поліміксин В


Бактерії
Грам +



Бактерії
Грам -



Гриби роду
Candida



ПОЛІЖИНАКС

Застосовувати інтравагінально ввечері перед сном 1 капсулу на добу. Курс лікування – 12 днів, профілактичний курс – 6 днів.



ПОЛІЖИНАКС ВІРГО

Для застосування у дитячій гінекологічній практиці.

Вміст 1 капсули вводиться інтравагінально (попередньо відірвавши кінець капсули) перед сном протягом 6 днів поспіль.

UA1019301/01 Ністатин, Неоміцин, Поліміксин В №19 від 29.12.2014



Представництво «Лабораторія Іннотек Інтернаціональ» в Україні,
01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська/Михайлівська, буд. 6/5.

* Інструкція для медичного застосування препарату "Поліжинакс" та "Поліжинакс Вірго".
Матеріал для розповсюдження в рамках спеціалізованих семінарів, конференцій, симпозіумів з медичної тематики та у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних та фармацевтичних працівників.
Характеристики препарату дивіться на стор. 31

ТОТЕМА®

залізо, мідь, марганець

ФРАНЦУЗЬКА ЯКІСТЬ –
ЗАЛІЗНИЙ РЕЗУЛЬТАТ!



тотема Fe²⁺
Mn Cu

- Швидка гематологічна відповідь¹
- Органічні солі заліза, міді та марганцю²
- Можливе застосування під час вагітності²
- Дозволено дітям з 1-го місяця²
- Відповідає рекомендаціям ВООЗ³



¹ С.В. Семочкин Клиническая эффективность применения препарата Тотема в лечении железодефицитной анемии у взрослых: гематологический ответ и улучшение качества жизни «Земский врач», № 1; 2012; стр. 37-42.
² Інструкція для медичного застосування.
³ WHO Model List of Essential Medicines 18th list (April 2013) (Final Amendments – October 2013).



Представництво «Лабораторія Іннотек Інтернаціональ» в Україні: 01001, Київ, вул. М.Житомирська, 6, тел. (044) 278 06 38, innotech@innotech.com.ua
Склад лікарського засобу: 1 ампула (10 мл) містить заліза (у вигляді заліза глюконату) 50 мг; марганцю (у вигляді марганцю глюконату) 1,33 мг; міді (у вигляді міді глюконату) 0,7 мг.

Показання для застосування. Залізодефіцитна анемія. Профілактичне лікування залізодефіциту у вагітних жінок, недоношених немовлят, близнюків або дітей, які народжені жінками з дефіцитом заліза. Якщо раціон харчування не містить достатньої кількості заліза. **Протипоказання.** Надлишок заліза в організмі. Регулярні гемотрансфузії. Одночасне застосування парентеральних форм заліза. Кишкова непрохідність. Залізорефрактерна анемія. Анемія, пов'язана з недостатністю медулярного кровотворення. Гіперчутливість до компонентів препарату. Складова непереносимість тимчасова зміна кольору зубної емалі, яка не має ніяких наслідків для здоров'я і зникає після закінчення лікування. Для запобігання такому явищу достатньо розвести розчин препарату у відповідному напої та під час застосування не тримати його довшо у ротовій порожнині. Можливі алергічні реакції (свербіж, висипання, кровив'янка, анафілактична реакція); біль у животі, блювання.
Спосіб застосування та дози. Вміст ампули слід розчинити у простій чи підслодженій воді або в будь-якому іншому напої, крім чаю, кави, молока та напоїв, що містять алкоголь. Лікування залізодефіцитної анемії: дорослим призначають по 100-200 мг заліза на добу, тобто 2-4 ампули препарату; дітям віком від 1 місяця, препарат призначають із розрахунку 5-10 мг заліза на 1 кг маси тіла на добу. Для лікування залізодефіциту застосовують вдвічі меншу дозу препарату ніж для лікування анемії. Профілактика анемії та залізодефіциту: для профілактики анемії в період вагітності препарат призначають вагітним із розрахунку по 50 мг елементарного заліза (1 ампула) на день протягом другого та третього триместрів вагітності, або починаючи з 4-го місяця вагітності. **Категорія відпуску.** Без рецепта. Реєстраційне посвідчення №UA/7854/01/01 Наказ МОЗ № 752 від 23.08.2013

Матеріал для розповсюдження в рамках спеціалізованих семінарів, конференцій, симпозіумів з медичної тематики та у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних та фармацевтичних працівників.

СОДЕРЖАНИЕ 7 (123)/2017

Оптимізація діагностики і тактики ведення вагітних з доброякісними пухлинами та пухлиноподібними утвореннями яєчників
В.І. Бойко, Н.П. Сухостаєць63

Лікування хворих з гіперактивним сечовим міхуром, гіпокінетичним тонусом детрузора та поєднаною нейрогенною патологією дистального відділу товстої кишки
П.В. Чабанов66

Особливості професійної захворюваності жінок – медичних працівників
О.С. Шелигін70

Особенности психоэмоциональных нарушений и качества жизни в зависимости от тяжести и формы акне у женщин с бесплодием
А.И. Литус, О.И. Заднипрная72

Characteristic features of puberty in adolescent girls from the Precarpathian region and the main factors of reproductive potential decline
V.V. Dziombak, O.M. Makarchuk77

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Индекс свободного тестостерона или тестостерон общий и свободный: Что оптимально выбрать для диагностики биохимической гиперандрогении?
О.В. Рыкова81

АКУШЕРСТВО

Хронический гломерулонефрит и беременность
Е.В. Исламова84

Плацентарна дисфункція у вагітних із супутньою патологією серцево-судинної системи
О.М. Гопчук88

Профілактика невиношування вагітності у жінок з вродженими аномаліями розвитку матки
В.І. Бойко, Ю.С. Воліна-Стаخورна93

Особливості акушерської та перинатальної патології у жінок з недиференційованою дисплазією сполучної тканини
А.Л. Костюк96

ГИНЕКОЛОГИЯ

Новий погляд на ендометріоз: роль відновлення повноцінного імунного нагляду над ектопічними клітинами ендометрія
С.М. Мельников, О.Ф. Тацький99

Комплексная оценка диагностических критериев у женщин с цистоцеле и стрессовым недержанием мочи
А.А. Люлько107

Особливості перебігу післяопераційного періоду при хірургічному лікуванні лапаротомічним та лапароскопічним доступом гінекологічних захворювань у жінок з екстрагенітальною патологією
В.В. Костіков111

Корекція біоценозу піхви із застосуванням Лактагелю після проведення гінекологічних операцій
О.В. Булавенко, В.О. Рудь, С.А. Босий116

Вплив гормональної контрацепції на слизову оболонку шийки матки у жінок з надмірною масою тіла
Н.В. Авраменко, І.Б. Грідіна120

Важка дисплазія епітелію шийки матки та внутрішньоепітеліальна карцинома (ЦІН 3) з поширенням на склепіння та стінки піхви. Діагностика та лікування
Н.Ф. Лигирда, В.С. Свінціцький, М.С. Кротевиц123

Поєднання аденоміозу і гіперпластичних процесів матки: удосконалена тактика діагностики та лікування
П.М. Прудніков132

ТОРСН-ИНФЕКЦИИ И ЗППП

Стан системи імунітету у жінок з латентною папіломавірусною інфекцією шийки матки
О.Л. Дола135

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОТОКОЛЫ И ОБЗОРЫ

Систематический обзор первичных исходов, их оценка в результатах рандомизированных исследований, изучающих лечение преэклампсии
James M.N. Duffy, Martin Hirsch, Chris Gale, Louise Pealing, Anusuya Kawsar, Marian Showell, Paula R. Williamson, Khalid S. Khan, Sue Ziebland, Richard J. McManus139

Первичная профилактика рака шейки матки: ресурсно стратифицированное руководство Американского общества клинической онкологии143