

# СОДЕРЖАНИЕ 9 (125)/2017

## ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Синдром гіперпролактинемії в амбулаторній практиці акушера-гінеколога (Клінічна лекція)  
В.І. Пирогова, Н.С. Вереснюк, С.О. Шурпяк .....10

## АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

Оцінка якості життя у жінок високого кардіологічного ризику з варикозною хворобою у післяпологовому періоді  
В.В. Баранова, А.Ю. Ліманська, Ю.В. Давидова .....17

Новий погляд на проблему діагностики післяпологових гнійно-запальних захворювань  
О.В. Булаченко, Л.Р. Остап'юк, В.О. Рудь, А.С. Волошиновський, Т.С. Малий .....22

Критические случаи материнской смертности – тяжелое акушерское осложнение, отражающее качество оказанных медицинских услуг  
Ю.В. Дондюк .....27

## В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

Общие корни предменструального синдрома, предменструальной мастодинии, фиброзно-кистозной мастопатии и бесплодия: действие экстрактов витекса священного (*Vitex agnus-castus*) в виде раствора  
Дана Зайдлова-Вуттке, Вольфганг Вуттке .....31

Деструктивно-хірургічні методи лікування патології шийки матки – плюси та мінуси  
К.В. Чайка, М.Н. Шалько, І.В. Ковальчук .....41

Канефрон® Н при лечении рецидивирующего цистита у женщин детородного возраста: рандомизированное контролируемое исследование  
Максим Сабадаш, Александр Шуляк .....44

Оцінка показників урофлоуметрії під час діагностики та лікування жінок з поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів та дистального відділу товстої кишки  
С.О. Возіанов, М.П. Захараш, П.В. Чабанов, Ю.М. Захараш, Н.А. Севастьянова, В.Ю. Угаров, А.С. Репринцева .....48

## Журнал «Здоровье женщины» индексируется и/или представлен здесь:

- «Библиометрика украинской науки»
- «Научная периодика Украины» (Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского)
- Google Scholar
- Copernicus International
- Science Index (eLIBRARY.RU)
- CrossRef (статьям журнала присваивается цифровой идентификатор объекта (DOI))
- INFOBASEINDEX
- ReaserchBib
- SIS
- Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
- Open Academic Journals Index (OAJI)
- Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
- International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)
- Hinari



# ПОЛІЖИНАКС®

Ністатин, Неоміцин, Поліміксин В

Унікальна комбінація широкого спектра дії  
для ефективного лікування вагініту\*

3 активні речовини\*

Ністатин  
Неоміцин  
Поліміксин В

Бактерії  
Грам +

Бактерії  
Грам -

Гриби роду  
*Candida*

**ПОЛІЖИНАКС**  
12 капсул вагінальних

**ПОЛІЖИНАКС ВІРГО**  
8 капсул, що містять речовини для інтравагінального введення

**ПОЛІЖИНАКС**  
Застосовувати інтравагінально ввечері перед сном 1 капсулу на добу. Курс лікування – 12 днів, профілактичний курс – 6 днів.

**ПОЛІЖИНАКС ВІРГО**  
Для застосування у дитячій гінекологічній практиці.  
Вист 1 капсули вводять інтравагінально (попередньо відірвавши кінець капсули) перед сном протягом 6 днів поспіль.

UA/10/193/01/01 Наказ МОЗ №1019 від 29.12.2014

**Лікування вагініту, спричиненого чутливими мікроорганізмами:\***

- бактеріальний вагініт;
- рецидивуючий неспецифічний вагініт;
- вагініт, спричинений грибами роду *Candida* (*Candida albicans* і *Candida non-albicans*).

**Профілактика інфекційних ускладнень:\***

- перед встановленням внутрішньоматкового засобу, абортom;
- перед і після діатермокоагуляції шийки матки;
- перед пологами.



Представництво «Лабораторія Іннотек Інтернасьйональ» в Україні,  
01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська/Михайлівська, буд. 6/5.

\* Інструкція для медичного застосування препарату "Поліжинакс" та "Поліжинакс Вірго".  
Матеріал для розповсюдження в рамках спеціалізованих семінарів, конференцій, симпозіумів з медичної тематики та у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних та фармацевтичних працівників.  
Характеристики препарату дивіться на стор. 21

## флебодія 600 МГ діосмін

Дві проблеми –  
одне рішення!

Полегшення  
симптомів  
лімфовенозної  
недостатності<sup>1,2,3</sup>  
біль • тяжкість • трофічні розлади

1 таблетка  
на добу



Швидке  
зменшення  
симптомів  
геморою<sup>3,4,5,6</sup>  
біль • набряк • кровотеча

3 таблетки  
на добу

## Флеботонік та ангіопротектор<sup>3</sup>

1. R. Barbe Etude de la durée d'action du Diovenor avec contrôle par pléthysmographie, Tribune médicale, 1988, n°270, p49-50.  
2. Cazaubon M. et al. Etude comparative d'acceptabilité, d'efficacité et de tolérance de deux formes galéniques de diosmine 600 mg, dans le traitement des symptômes de la maladie veineuse chronique. Angiologie, 2011, vol.63, n°2.  
3. 5m<sup>2</sup>C Phlebodia 600 mg (diosmin), im-coated tablet.  
4. Chauvenot M., Libeskind M. Intérêt de la diosmine d'hémisynthèse dans la poussée hémorroïdaire aiguë. Essai multicentrique randomisé en double insu versus placebo. Rev Fr Gastro-Enterol 1994 ; 303 : 3-8.  
5. Kecmanovic D. et al - The use of Phlebodia® in the management of bleeding non-prolapsed haemorrhoids. Acta Chirurgica Iugoslavica 2005, 52, 1, 115-116  
6. Debien P., Denis J. Traitement des signes fonctionnels de la crise hémorroïdaire aiguë: Essai multicentrique, randomisé, diosmine d'hémisynthèse versus association extrait de Ginkgo biloba-heptaminol troxerutine. Med Chir Dig 1996 ; 25 (5) : 259-64.

Склад лікарського засобу: 1 таблетка містить діосмін, що відповідає діосміну безводного чистого 600 мг. Фармакотерапевтична група. Ангіопротектори. Капіляростабілізуючі засоби. Біофлавоноїди. Код АТС C05C A03. Показання для застосування: для полегшення симптомів, обумовлених лімфовенозною недостатністю, таких як відчуття тяжкості у нижніх кінцівках, біль, трофічні розлади; у комплексному лікуванні загострення геморою; як додатковий метод лікування підвищеної ламкості капілярів, порушення мікроциркуляції. Спосіб застосування та дози. Для перорального застосування. При хронічній лімфовенозній недостатності: 1 таблетка на день вранці перед сніданком. Тривалість курсу лікування визначає лікар залежно від перебігу захворювання. Тривалість лікування залежить від показань до застосування та від стадії захворювання. Середня тривалість лікування складає 2 місяці. При гострому геморої: 2-3 таблетки на день під час прийому їжі протягом 7 днів, у разі необхідності, лікування продовжують по 1 таблетці 1 раз на добу до 1 – 2 місяців. Якщо після лікування геморою залишилися симптоми захворювання, необхідно звернутися до проктолога для корекції лікування. Максимальна добова доза – 1800 мг (3 таблетки). Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату, особливо у пацієнтів, схильних до алергічних реакцій на кошеніль червону А (E 124). Препарат звичайно не рекомендується застосовувати у період годування груддю. Побічні ефекти. Можливі алергічні реакції, включаючи шкірні висипання, свербіж. Рідко можливі диспептичні розлади, головний біль. РП № UA/8590/01/01 Наказ МОЗ № 649 от 26.07.2013.

Матеріал для розповсюдження в рамках спеціалізованих семінарів, конференцій, симпозіумів з медичної тематики та у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних та фармацевтичних працівників.

# СОДЕРЖАНИЕ 9 (125)/2017

Пути снижения диагностической и лечебной агрессии у пациенток с ВПЧ-инфекцией в репродуктивном возрасте Н.Н. Волошина, Э.Д. Званцева .....	51
---	----

## АКУШЕРСТВО

Профілактика передчасних пологів у жінок із доброякісною патологією шийки матки в анамнезі О.О. Корчинська, Н. Ю. Бисага .....	59
Особенности методов родоразрешения у рожениц с маловодием Л.И. Алиева, Э.М. Алиева, А.Д. Исмаилова, Т.Н. Ахмедова.....	65

## ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Характеристика маркерів метаболічного синдрому та особливості перебігу ранніх термінів гестації у жінок із загрозою невиношування вагітності залежно від їхньої маси тіла Ю.М. Дука.....	69
---	----

## ГИНЕКОЛОГИЯ

Функціональний стан слизової оболонки піхви при бактеріальному вагінозі та його корекція В.О. Бенюк, О.А. Щерба, Л.Д. Ластовецька .....	77
Передменструальний синдром: раціональні підходи до негормональної терапії О.В. Кравченко.....	84
Оценка показателей ультразвуковых исследований женщин с пролапсом половых органов и недержанием мочи после проведенного лечения А.А. Люлько .....	88
Досвід лікування рецидивного неспецифічного вульвовагініту С.Є. Косилова .....	92
Порівняльні аспекти впливу різних методів лікування генітального ендометріозу на якість життя П.М. Прудніков .....	97

Динаміка показників імунної системи після профілактики порушень у менопаузі у жінок з гіперпроліферативними процесами репродуктивної системи Л.І. Бутіна .....	100
---	-----

## ПОДРОСТКОВАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ

Досвід використання комплексу рослинного походження Валесан у лікуванні первинної альгодисменореї у дівчат-підлітків А.В. Старовер, Д.Г. Коньков, О.В. Булавенко, Б.О. Маркевич, Я.В. Полторак.....	105
--	-----

## БЕСПЛОДИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ

The optimization ways of pregnancy and labor management tactics in women after application of assisted reproductive technologies L.M. Vygivska, T.R. Nykoniuk, V.F. Oleshko .....	111
Ефективність лікування трубно-перитонеальної форми безплідності у програмах допоміжних репродуктивних технологій залежно від протоколу стимуляції суперовуляції О.В. Багатько, Н.О. Данкович.....	114

## ТОРСН-ИНФЕКЦИИ И ЗППП

Аналіз показників клітинної та гуморальної ланок імунної системи у вагітних з парвовірусною інфекцією у різні періоди гестації Н.П. Бондаренко .....	117
---	-----

## МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОТОКОЛЫ И ОБЗОРЫ

Влияние пероральной и трансдермальной терапии эстрогенами на сексуальную функцию в период ранней постменопаузы Hugh S. Taylor, MD; Aya Tal, PhD; Lubna Pal, MD; Fangyong Li, MPH; Dennis M. Black, MD; Eliot A. Brinton, MD; Matthew J. Budoff, MD; Marcelle I. Cedars, MD; Wei Du, MS; Howard N. Hodis, MD; Rogerio A. Lobo, MD; JoAnn E. Manson, MD, DrPH; George R. Merri .....	122
---	-----