

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

| | |
|--|----|
| Мікоплазма геніталіум – таємний руйнівник О.А. Бурка, Н.Ф. Лигирда..... | 10 |
|--|----|

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

| | |
|--|----|
| Психосоціальні аспекти пологів С.І. Жук, О.Д. Шуревська..... | 15 |
| Інновації розродження вагітних з аномально інвазивною плацентою: placenta percreta (Випадок з практики) О.В. Голяновський, В.В. Мехедко, А.О. Савонік, Д.О. Гончаренко, В.М. Кучер, С.В. Верещакін, С.В. Герасімов..... | 19 |

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

| | |
|--|----|
| Методология профилактики больших акушерских синдромов Ю.В.Тезиков, И.С.Липатов, Н.А.Фролова, О.А.Кутузова, А.В.Приходько..... | 25 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| Управление биотопами женщины – новые подходы С.И. Жук, А.А. Шляхтина..... | 34 |
| Оцінка стану біоценозу піхви у пацієнток з рецидивом ектопії циліндричного епітелію шийки матки в умовах інфікування вірусом папіломи людини Ю.Ю. Мазур, В.І. Пирогова, Н.М. Кузь..... | 37 |
| Порівняльне дослідження ефективності топічної терапії комбінованими препаратами змішаних вагінітів, асоційованих з цервіцитами В.І. Пирогова, С.О. Шурпак, Ю.Р. Фейта, М.Й. Малачинська, Н.М. Кузь..... | 42 |
| Анатомо-функціональний стан органів малого таза у жінок зі зниженою відповіддю на стимуляцію яєчників Г.В. Стрелко..... | 50 |

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

| | |
|--|----|
| Сучасні підходи до лабораторної діагностики і менеджменту синдрому тиреотоксикозу В.І. Паньків..... | 57 |
|--|----|

Журнал «Здоровье женщины» индексируется и/или представлен здесь:

- «Библиометрика украинской науки»
- «Научная периодика Украины» (Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского)
- Google Scholar
- Copernicus International
- Science Index (eLIBRARY.RU)
- CrossRef (статьям журнала присваивается цифровой идентификатор объекта (DOI))
- INFOBASEINDEX
- ReaserchBib
- SIS
- Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
- Open Academic Journals Index (OAJI)
- Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
- International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)
- Hinari



ПОЛІЖИНАКС®

Ністатин, Неоміцин, Поліміксин В

Унікальна комбінація широкого спектра дії для ефективного лікування вагініту*

З активні речовини*



Лікування вагініту, спричиненого чутливими мікроорганізмами:*

- бактеріальний вагініт;
- рецидивуючий неспецифічний вагініт;
- вагініт, спричинений грибами роду *Candida* (*Candida albicans* і *Candida non-albicans*).

Профілактика інфекційних ускладнень:*

- перед встановленням внутрішньоматкового засобу, абортom;
- перед і після діатермокоагуляції шийки матки;
- перед пологами.



Представництво «Лабораторія Іннотек Інтернасьйональ» в Україні, 01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська/Михайлівська, буд. 6/5.

* Інструкція для медичного застосування препарату "Поліжинакс" та "Поліжинакс Вірго".
Матеріал для розповсюдження в рамках спеціалізованих семінарів, конференцій, симпозіумів з медичної тематики та у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних та фармацевтичних працівників.
Характеристики препарату дивіться на стор. 33

флебодія 600 МГ діосмін

Дві проблеми – одне рішення!

Полегшення симптомів лімфовенозної недостатності^{1,2,3}
біль • тяжкість • трофічні розлади

1 таблетка
На добу



Швидке зменшення симптомів геморою^{3,4,5,6}
біль • набряк • кровотеча

3 таблетки
На добу

Флеботонік та ангіопротектор³

1. R. Barbe Etude de la durée d'action du Diovenor avec contrôle par pléthysmographie, Tribune médicale, 1988, n°270, p49-50.
2. Cazaubon M. et al. Etude comparative d'acceptabilité, d'efficacité et de tolérance de deux formes galéniques de diosmine 600 mg, dans le traitement des symptômes de la maladie veineuse chronique. Angiologie, 2011, vol.63, n°2.
3. 5mPC Phlebodia 600 mg (diosmin). Im-coated tablet.
4. Chauvenet M., Libeskind M. Intérêt de la diosmine d'hémisynthèse dans la poussée hémorroïdaire aiguë. Essai multicentrique randomisé en double insu versus placebo. Rev Fr Gastro-Enterol 1994; 303: 3-8.
5. Kecmanovic D. et al - The use of Phlebodia® in the management of bleeding non-prolapsed haemorrhoids. Acta Chirurgica Iugoslavica 2005, 52, 1, 115-116
6. Debieu P., Denis J. Traitement des signes fonctionnels de la crise hémorroïdaire aiguë: Essai multicentrique, randomisé, diosmine d'hémisynthèse versus association extrait de Ginkgo biloba-heptaminol troxérutine. Med Chir Dig 1996; 25 (5) : 259-64.

Склад лікарського засобу: 1 таблетка містить діосмін, що відповідає діосміну безводного чистого 600 мг. Фармакотерапевтична група. Ангіопротектори. Капіляростабілізуючі засоби. Біофлавоноїди. Код АТС C05C A03. Показання для застосування: для полегшення симптомів, обумовлених лімфовенозною недостатністю, таких як відчуття тяжкості у нижніх кінцівках, біль, трофічні розлади; у комплексному лікуванні загострення геморою; як додатковий метод лікування підвищеної ламкості капілярів, порушення мікроциркуляції. Спосіб застосування та дози. Для перорального застосування. При хронічній лімфовенозній недостатності: 1 таблетка на день вранці перед сніданком. Тривалість курсу лікування визначає лікар залежно від перебігу захворювання. Тривалість лікування залежить від показань до застосування та від стадії захворювання. Середня тривалість лікування складає 2 місяці. При гострому геморої: 2-3 таблетки на день під час прийому їжі протягом 7 днів, у разі необхідності, лікування продовжують по 1 таблетці 1 раз на добу до 1 – 2 місяців. Якщо після лікування геморою залишилися симптоми захворювання, необхідно звернутися до проктолога для корекції лікування. Максимальна добова доза — 1800 мг (3 таблетки). Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату, особливо у пацієнтів, схильних до алергічних реакцій на кошениль червону А (Е 124). Препарат звичайно не рекомендується застосовувати у період годування груддю. Побічні ефекти. Можливі алергічні реакції, включаючи шкірні висипання, свербіж. Рідко можливі диспептичні розлади, головний біль. РП № UA/8590/01/01

СОДЕРЖАНИЕ 6 (132)/2018

АКУШЕРСТВО

| | |
|--|----|
| Оцінка лікувального та профілактичного потенціалу препарату Канефрон® Н у лікуванні гестаційного пієлонефриту у вагітних Р.З. Шеремета, М.Є. Сабадаш, О.В. Шуляк..... | 62 |
| Великі акушерські синдроми – сучасні можливості профілактики Т.Г. Романенко, О.М. Суліменко..... | 67 |
| Акушерські та перинатальні наслідки розродження жінок із варикозною хворобою Ю.Б. Моцюк | 73 |
| Ведення вагітності та розродження жінок на тлі гострого панкреатиту О.В. Голяновський, Я.П. Фелештинський, Т.П. Павлів, Д.О. Гончаренко..... | 76 |
| Вивчення біотопу пологових шляхів у вагітних з маловоддям І.О. Басюга..... | 81 |

ГИНЕКОЛОГИЯ

| | |
|---|----|
| Role of genetic factors in the development of premenstrual syndrome L.V. Pakhareno | 84 |
| Междисциплинарный подход в менеджменте хронической тазовой боли у женщин С.И. Жук, О.А. Гордийчук | 87 |
| Клініко-анамнестичні особливості гіперпластичних процесів ендометрія у жінок репродуктивного віку Ю.М. Садигов | 92 |
| Можливі шляхи корекції тяжких форм клімактеричного синдрому у жінок на тлі ендометріозу Н.Ф. Захаренко, Н.В. Коваленко, І.М. Ретунська | 96 |

| | |
|--|-----|
| Особливості клінічного перебігу міоми матки у жінок репродуктивного віку М.А. Флаксемберг | 102 |
|--|-----|

ЛЕКЦИИ И ОБЗОРЫ

| | |
|--|-----|
| Концептуальная модель необходимости преодоления климактерических расстройств (Клиническая лекция) З.М. Дубоссарская..... | 109 |
| Плацентарний синдром як імовірний фактор ризику розвитку прееклампсії (Огляд літератури) В.В. Артьоменко, Л.І. Берлінська | 113 |

БЕСПЛОДИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ

| | |
|---|-----|
| Особливості психоемоційного стану та біопродукування стрес-асоційованих гормонів у вагітних після застосування допоміжних репродуктивних технологій Л.М. Вигівська, І.А. Усевич, І.В. Майданник, В.Ф. Олешко | 118 |
| Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок після застосування допоміжних репродуктивних технологій на тлі ожиріння (За даними ретроспективного аналізу) І.А. Жабченко, О.Р. Сюдмак | 122 |

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОТОКОЛЫ

| | |
|--|-----|
| Гинекологическая помощь для подростков и молодых женщин с расстройствами пищевого поведения..... | 127 |
| Менеджмент болевого синдрома после родов..... | 134 |