

КОМОРБІДНА ПАТОЛОГІЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА ПОДАГРУ

**©Н. З. Ярема, С. М. Андрейчин, Н. Я. Верещагіна, І. І. Ганьбергер,
О. І. Кузів, У. О. Мудра, Б. М. Депутат, В. І. Рудий**

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Вступ. Проблема коморбідності є надзвичайно актуальною у клініці внутрішніх хвороб. Це повною мірою стосується хворих на таке поширене захворювання, як подагра. У цих пацієнтів особливо часто спостерігається коморбідна патологія з боку серцево-судинної системи.

Мета дослідження – вивчення функціонального стану серцево-судинної системи у хворих на подагру.

Матеріал і методи дослідження. Обстежено 74 пацієнти, серед яких 30 – з хронічним перебігом, 44 – з інтермітуючим перебігом подагри. У 49,6 % хворих на подагру діагностовано також ІХС, у 32,7 % – артеріальну гіпертензію, що перевищує поширеність даних захворювань у популяції відповідного віку.

Результати й обговорення. Клініко-електрокардіографічні і ультразвукові ознаки ураження міокарда і коронарних судин частіше мають місце у хворих на хронічну подагру і вираженість їх

більш значуща, ніж при інтермітуючому перебігу. У хворих на подагру спостерігається також більш висока частота розвитку прихованої коронарної недостатності, функціональна здатність міокарда має тенденцію до зниження.

Частота гіпер- і дисліпідемії при подагрі складала 77,8 %, що перевищує цей показник у хворих на хронічну ІХС, особливо у віці до 50 років. Поширеність, вираженість гіперліпопротеїдемії при подагрі більшою мірою асоціюється з рівнем гіперурикемії, ніж з давністю хвороби.

Висновок. Отримані дані свідчать, що подагра, особливо її хронічний перебіг, є фактором ризику ІХС, а тому в комплексну терапію подагри слід включати статини.

Перспективи подальших досліджень. Результати дослідження спонукають до подальшого вивчення особливостей перебігу подагри на тлі різних захворювань внутрішніх органів.