

**ОТДЕЛ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ГФЦ МЗ УКРАИНЫ
ЗАПОРОЖСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ**

**Информационное сообщение о подозреваемом побочном действии
лекарственных препаратов**

Информация о пациенте

Больной 33 лет. Диагноз: Хроническая открытоугольная глаукома

Информация о препарате, вызвавшем побочную реакцию

Бетоптик (бетаксолол), глазные капли 5,0 мл 0,25%. Производитель: ALCON-Couvreur, Бельгия.

Назначен по 5 кап 2 р/день в оба глаза с целью снижения внутриглазного давления

Описание побочной реакции

После применения капель появился офтальмологический дискомфорт, затемненное зрение, точечный кератит, слезотечение, сухость глаз, зуд

Сопутствующие препараты

Нет

Коррекция побочной реакции

Отмена подозреваемого лекарственного препарата и назначение препарата. Алтива

Особенности клиники, последствия

После отмены препарата и назначения антигистаминного препарата побочные явления исчезли через 2 дня

Аллергологический анамнез и наличие ранее перенесенных побочных реакций

Не отягощён. Какие-либо необычные реакции на лекарственные препараты или химические вещества в прошлом не отмечались

Информация предоставлена городской поликлиникой №1, г. Мелитополь

Информация о пациенте

Больной 57 лет. Диагноз: Гипертоническая болезнь II.

Ангиопатия сосудов сетчатки по гипертоническому типу.

Информация о препарате, вызвавшем побочную реакцию

Каптопрес (каптоприл+гидрохлортиазид), таблетки. Производитель: Дарница, Украина.

Назначен 1 табл. однократно per os в качестве неотложной помощи при гипертоническом кризе

Описание побочной реакции

После приема первой таблетки возникла аллергическая реакция в виде отека Квинке

Сопутствующие препараты

Аккузид 10 мг 2 раза день

Коррекция побочной реакции

Отмена препарата

Особенности клиники, последствия

Состояние нормализовалось через день после отмены препарата

Аллергологический анамнез и наличие ранее перенесенных побочных реакций

Поливалентная аллергия

Информация предоставлена 8-й городской больницей, г. Запорожье

Информация о пациенте

Больной 54 года. Диагноз: Дегенеративно-дистрофическое поражение позвоночника. Люмбалгия

Информация о препарате, вызвавшем побочную реакцию

Ранселекс (целекоксиб), таблетки, 100 мг. Производитель: Ranbaxy, Индия.

Назначен по 100 мг 2 раза в день per os в качестве анальгезирующего, противовоспалительного средства

Описание побочной реакции

На 3 день после приема препарата появились боли в животе и жидкий стул

Сопутствующие препараты

Кетанов 1,0 в/м однократно в первый день

Коррекция побочной реакции

Отмена препарата. Мультисорб по 1 пор. 3 р/день

Особенности клиники, последствия

Состояние нормализовалось через 2 дня

Аллергологический анамнез и наличие ранее перенесенных побочных реакций

Не отягощён. Какие-либо необычные реакции на лекарственные препараты или химические вещества в прошлом не отмечались

Информация предоставлена городской поликлиникой №3, г. Мелитополь

Информация о пациенте

Больной 75 лет. Диагноз: ХОЗЛ III ст., фаза обострения. Эмфизема легких. Пневмосклероз. ЛН II ст. ДН 2 ст.

Информация о препарате, вызвавшем побочную реакцию

Беротек (фенотерол), аэрозоль, 100 мкг/дозу, 15 мл. Производитель: Берингер Ингельхайм, Германия.

Назначен по 100 мкг 3 р/день ингаляционно в качестве бронхолитика.

Описание побочной реакции

Жалобы на отечность языка, затрудненное дыхание, чувство страха смерти.

Объективно: язык обычной формы, несколько утолщен слева до 3-5 мм.

Сопутствующие препараты

Цефтриаксон

Коррекция побочной реакции

Отмена препарата. Преднизолон 60 мг в/в № 1, преднизолон 30 мг в/м №1,

планово Зодак 1 таб. 1 р/д.

Особенности клиники, последствия

После оказания медицинской помощи общее состояние больной нормализовалось через 1 час.

Аллергологический анамнез и наличие ранее перенесенных побочных реакций

В анамнезе непереносимость эуфиллина

Информация предоставлена 2-ой городской больницей, г. Запорожье

Информация о пациенте

Больная 25 лет. Диагноз: Бурсит кисти

Информация о препарате, вызвавшем побочную реакцию

Нимесил (нимесулид), порошок для перорального применения, 0,1. Производитель: Берлин-Хеми, Германия. Назначен по 0,1 2 р/день per os в качестве анальгезирующего, противовоспалительного средства.

Описание побочной реакции

После приема 3-го пакетика появились боли в подложечной области, в правом подреберье, появились высыпания на коже живота, которые сопровождались зудом.

Сопутствующие препараты

Фастум-гель, наружно.

Коррекция побочной реакции

Отмена препарата. Лоратадин 1 таб. 1 р/д, омез 1 капсул. 2 р/день.

Особенности клиники, последствия

Состояние нормализовалось через 2 суток.

Аллергологический анамнез и наличие ранее перенесенных побочных реакций

Не отягощен. Какие-либо необычные реакции на лекарственные препараты или химические вещества в прошлом не отмечались.

Информация предоставлена городской поликлиникой № 3, г. Мелитополь

Информация о пациенте

Больной 63 года. Диагноз: Сахарный диабет 2 тип. Гипотиреоз.

Информация о препарате, вызвавшем побочную реакцию

Мексидол, р-р д/инфузий, 5% 2 мл. Производитель: ООО МЦ «Эллара», Российская Федерация.

Назначен в/в капельно 1 раз в день в качестве метаболической терапии.

Описание побочной реакции

При введении препарата у больной началась резкая головная боль в височных областях.

Длительность боли 20-30 минут.

Сопутствующие препараты

Агапурин, р-р д/инъекций 5,0 мл в/в 1 раз в день.

Коррекция побочной реакции

Больная приняла спазмалгон, боль прекратилась, препарат отменен.

Особенности клиники, последствия

В течение 30 минут после отмены препарата и назначения коррекционной терапии состояние стабилизировалось.

Аллергологический анамнез и наличие ранее перенесенных побочных реакций

Не отягощен. Какие-либо необычные реакции на лекарственные препараты или химические вещества в прошлом не отмечались.

Информация предоставлена Запорожским областным клиническим эндокринологическим диспансером