

УДК 582. 26

О.А. ПЕТЛЕВАННЫЙ

Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины,
Украина, 01601 Киев, ул. Терещенковская, 2
E-mail: algae@botany.kiev.ua

**ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ *CHLOROPHYTA* ВОДОЁМОВ
ДОНЕЦКО-ПРИАЗОВСКОЙ СТЕПИ (УКРАИНА)**

Охарактеризовано разнообразие *Chlorophyta* водоёмов Донецко-Приазовской Степи, указаны черты его специфики, обнаружен 541 вид (607 внутривидовых таксонов), 164 рода, 55 семейств, 22 порядка и 8 классов. Основу разнообразия *Chlorophyta* региона формируют классы *Chlorophyceae*, *Zygnematophyceae*, *Trebouxiophyceae*. Отмечено уменьшение видового богатства *Chlorophyta* в водоёмах региона в направлении с севера на юг, выделено три территориальные единицы: северную, центральную и южную. Проанализированы особенности внутривидового состава *Chlorophyta* разных типов водоёмов (стоячие, проточные, текущие). Показано, что центром разнообразия зелёных водорослей региона является пойма системы р. Северский Донец. Установлено значительную географическую дифференциацию *Chlorophyta* разных физико-географических областей Донецко-Приазовской Степи. Продемонстрированы связи *Chlorophyta* водоёмов Донецко-Приазовской Степи и Степной зоны Украины. Впервые для флоры Украины приводится 32 вида (41 ви. такс.), для Степной зоны Украины – 107 (126).

Ключевые слова: водоросли, *Chlorophyta*, водоёмы, Донецко-Приазовская Степь, разнообразие.

Введение

Изучение разнообразия водорослей Украины продолжается почти два столетия, а альгофлора страны является одной из наиболее исследованных в мире. На современной территории Украины обнаружено 4908 видов (6101 ви. такс.) водорослей из 894 родов (Дополнение ..., 2001), что составляет 42% видового разнообразия общемировой континентальной альгофлоры и около 10% альгофлоры мира (срвн.: Norton et al., 1996; Разнообразие ..., 2000). Однако несмотря на высокое выявленное богатство водорослей в водоёмах Украины, до сих пор не разрешена проблема эмпиричности информации согласно географических, систематических и экологических параметров, также следует учитывать неодинаковый интерес к исследованию альгофлоры в различные периоды времени. Это усложняет процесс познания разнообразия водорослей различных регионов и установление их альгофлористической самобытности.

Планомерная инвентаризация водорослей континентальных водоёмов Украины ещё далека от завершения и в настоящее время нельзя выделить территории, сведения о разнообразии водорослей которых были бы исчерпывающими. Миф о высоком уровне изученности альгофлоры Украины не выдерживает критики при анализе альгофлористических данных для территорий рангом ниже физико-географической зоны. Кроме того, важнейшие с позиций инвентаризации биологического разнообразия территории природно-заповедного фонда (эталонные экосистемы) зачастую вообще лишены базовых сведений о составе их водорослей либо эти данные ограничены. Наиболее богато во флоре Украины представлены зелёные водоросли (отдел *Chlorophyta*) – 2039 видов (2586 ви. такс.) из 365 родов (Дополнение ..., 2001), что составляет 41,5% её альгофлоры по количеству видов.

По сведениям П.М. Царенко с соавт. (Царенко и др., 1998), распределение разнообразия *Chlorophyta* в континентальных водоёмах Украины согласно физико-географическим зонам её равнинной территории и горных стран неравномерно: для зон Смешанных и Широколиственных лесов (Украинское Полесье) указывается 996 видов (1255 вида такс.), Лесостепи – 1115 (1374), Степи – 701 (758), значительно меньше для горных стран – Украинских Карпат – 487 (592) и Крымских Гор – 272 (316). Таким образом, наименее богаты на равнинной территории Украины является разнообразие *Chlorophyta* Степной зоны, эта же территория относится к числу наименее исследованных в альгологическом отношении, особенно её восточная часть, где антропогенное влияние наиболее высоко. Перечисленные факты обуславливают необходимость специального комплексного исследования *Chlorophyta* востока Степной зоны Украины.

Согласно оригинальному критико-систематическому анализу литературных данных, для водоёмов Степной зоны Украины известен 761 вид (846 видов такс.) *Chlorophyta*, принадлежащих к 206 родам, из них в разных типах водоёмов выявлено: реки – 460 видов (505 видов такс.) из 148 родов, лиманы – 399 (426) из 132, водохранилища – 300 (318) из 113, озёра – 192 (195) из 86, пруды – 169 (177) из 74, пойменные водоёмы – 148 (152) из 60, каналы – 96 (99) из 48.

Материалы и методы

Регион исследований (рис. 1)

охватывает 5 физико-географических областей: Старобельскую слоно-возвышенностьную (СТР), Западно-Донецкую склоно-возвышенностьную (ЗДН), Донецкую возвышенностьную (ДНЦ), Приазовскую возвышенностьную (ПВС) и Приазовскую низменностьную (ПНЗ) (см. Географич. на ... , 1993; Атлас ..., 1999-2000). Учитывая, что данная территория на севере расположена в бассейне системы р. Сиверский Донец, а на юге омывается Азовским морем, нами предложено название региона "Донецко-Приазовская Степь" (ДПС).

Объектом исследования являются зелёные водоросли (отдел *Chlorophyta*) региона ДПС. Предмет исследования данной работы – разнообразие отдела *Chlorophyta*, его систематический состав, экологические особенности в соответствии с природными условиями региона ДПС, а также закономерности распределения представителей отдела в различных физико-географических областях с учётом типа водоёмов.

Принятая классификационная система *Chlorophyta*. Использовано собранную, но согласованную относительно современных взглядов систему отдела. За основу принята система С. Van den Hoek с соавт. (Hoek et al., 1992, 1995) с учётом некоторых дополнений: 1) порядок *Oedogoniales*, в соответствии со взглядами F.E. Round (Round, 1963), представлен в ранге самостоятельного класса *Oedogoniophyceae*; 2) классы *Cladophorophyceae* и *Klebsormidiophyceae* не признаны как самостоятельные – их представители рассматриваются в составе классов *Ulvophyceae* и *Charophyceae* соответственно; 3) не принято класс *Pleurastrophycaceae*, большинство представителей которого рассмат-



Рис. 1. Регион Донецко-Приазовской Степи в пределах Украины (Атлас ..., 1999-2000).

ривается среди *Trebouxiophyceae* (Friedl, 1995, 1996) в понимании П.М. Царенко (Algae ..., 2005). Особо следует отметить целесообразность разделения отдела *Chlorophyta* на две основные эволюционные ветви: собственно *Chlorophyta* и *Streptophyta* (Bremmer, 1985), однако последняя группа не является таксономической единицей (отделом), а лишь эволюционной ветвью, включающей кроме классов *Zygematophyceae*, *Charophyceae*, *Mesostigmatophyceae* все отделы высших растений.

Сбор и идентификация альгологического материала. В течение 1998–2000 гг. проведено 22 экспедиционных выезда в ДПС для сбора альгологического материала из водоёмов региона. В пределах заповедных территорий (Луганский и Украинский степной природные заповедники) отбор проб проводили периодически (апрель–сентябрь).

Принято классификацию типов водоёмов по таким параметрам: интенсивность движения водных масс, период существования водоёма, солёность. Согласно этой классификации, выделяются три типа водоёмов: А – текущие (ручьи, реки, каналы), В – проточные (пруды, имеющие сток и водохранилища), С – стоячие (озёра, включая пойменные водоёмы, лужи, пруды, не имеющие стока). Для каждого типа водоёма указывается период его существования (подтипы): постоянные водоёмы (A_1 , B_1 , C_1) и эфемерные (A_2 , B_2 , C_2). Для стоячих водоёмов отмечают солёность (C_1^{sol} , C_2^{sol}).

Во время экспедиций обследовано 212 водоёмов, из которых 23 реки, 18 прудов, 14 водохранилищ, 1 канал, 56 пресных озёр, 6 солёных озёр, 9 карьерных озёр, 3 рыбных пруда, 52 лужи, 12 ручьёв, 1 минеральный сероводородный источник, а также 17 водоёмов искусственного происхождения (обводные каналы, фонтаны, шахтные отстойники, оранжерейные водоёмы). Всего в различных типах водоёмов отобрано 725 альгологических проб вфиксированном (705 единиц) и живом (20 единиц) состояниях.

Идентификацию видового состава *Chlorophyta* проводили согласно отечественным и зарубежным монографическим сводкам: *Pedinomonadales*, *Chlorodendrales*, *Pyramitom-nadales*, *Dunaliales*, *Chlamydomonadales*, *Volvocales* (Maciok, 1983; Ettl, 1983), *Tetrasporales*, *Chlorococcales*, *Sphaeropleales*, *Chlorellales* (Голлербах, Слобникова, 1980; Komárek, Fott, 1983; Hindák, 1984, 1988; Царенко, 1990; Ettl, Gártner, 1998), *Oedogoniales* (Mrozińska, 1985; Юнгер, Мошкова, 1993), *Chaetophorales*, *Ulothrichales*, *Ulvales*, *Siphonocladales*, *Mic-rothamniales*, *Coleochaetales*, *Chaetopeltidales*, *Klebsormidiales* (Hoek, 1963, 1982; Starmach, 1972; Мошкова, 1979), *Zygnematales* (Kolkwitz, Krieger, 1941, 1944; Transeau, 1951; Косинская, 1952; Kadlubowska, 1972; Рундина, 1988, 1998), *Desmidiales* (Косинская, 1952, 1960; Krieger, Gerloff, 1962, 1965, 1969; Prescott et al., 1977, 1981, 1982; Паламарь-Мордвинцева, 1982; Förster, 1982; Паламарь-Мордвинцева, 1984, 1986; Flora ..., 1986, 1988, 1994; Coesel, 1991, 1994, 1997), *Charales* (Голлербах, Красавина, 1983; Голлербах, Паламарь-Мордвинцева, 1991).

Методы микроскопирования. Изучение альгологического материала проводили с помощью светового микроскопа (CARL ZEISS-NF). Рисунки водорослей выполнены с использованием рисовального аппарата РА-6. Исследование скелетики поверхности оболочек клеток и уточнение видовой принадлежности некоторых представителей *Sphaeropleales* и *Desmidiales* проводили с помощью сканирующего электронного микроскопа JSM-6300F (Юлихский науч. центр, Германия) по методу Е. Hegewald с соавт. (Hegewald et al., 1998; Hegewald, Tsarenko, 1998).

Культуральные методы. Использовали стандартные методы культивирования водорослей (Водоросли ..., 1989) на жидкой (колбы) и агаризованной (чашки Петри) среде Болда с тройным содержанием азота (Bischoff, Bold, 1963).

Методы сравнительной флористики. Общий подход относительно сравне- ний флор основывается на взглядах А.И. Толмачёва (Толмачёв, 1974, 1986). При про-

ведении флористического анализа рассчитывали коэффициенты флористической общности, учитывали такие признаки флоры, как структура ведущих семейств, ведущих родов и их количественные соотношения (Шмидт, 1980, 1984). Учитывая неравномерность видовых (внутривидовых) выборок, основным методом сравнения разнообразия *Chlorophyta* выбран метод мер включения (Семкин, Комарова, 1977).

Современное состояние изученности *Chlorophyta* Донецко-Приазовской Степи

Специальные флористические исследования зелёных водорослей региона не проводились. Количество работ, содержащих данные о зелёных водорослях водоёмов ДПС, ограничена и в большинстве случаев имеет гидробиологическую направленность. В большинстве работ приведены данные об исследовании гидробионтов системы р. Сиверский Донец, анализе гидробиологического режима канала Сиверский-Донец – Донбасс, изучении водорослей водохранилищ Донбасса. Кроме указанных направлений исследований имеется несколько работ флористической направленности узкой локализации, посвящённых конкретным природным водоёмам.

Всего для региона ДПС на основе оригинального критико-систематического анализа литературных данных известно 235 видов (246 ви. такс.) из 108 родов. В большинстве работ авторы приводят наиболее распространённые (ведущие) таксоны, а равномерной (полной) картины распространения зелёных водорослей в водоёмах ДПС, в соответствии с систематическим и территориальным аспектами, до сих пор не существует.

Согласно литературным данным, количественное распределение *Chlorophyta* по физико-географическим областям имеет следующий вид: СТР – 118 видов (121 ви. такс.) из 70 родов, ЗДН – 76 из 44, ДНЦ – 10 видов и 17 родов (большинство без конкретизации вида), ПВС – 42 из 38, ПНЗ – 2 вида и 3 рода (в т. ч. без конкретизации вида).

Разнообразие *Chlorophyta* Донецко-Приазовской Степи

Общая характеристика *Chlorophyta* водоёмов ДПС. На основе проведенных оригинальных исследований, с учётом литературных данных в водоёмах ДПС выявлен 541 вид (607 ви. такс.) зелёных водорослей, принадлежащих к 164 родам, 55 семействам, 22 порядкам и 8 классам (табл. 1).

Основу разнообразия зелёных водорослей региона составляют классы *Chlorophyceae* – 248 видов (273 ви. такс.) из 92 родов, *Zygnematophyceae* – 163 (201) из 27 и *Trebouxiophyceae* – 75 (76) из 28, вместе представляющие 89,8% всего видового состава *Chlorophyta* ДПС. Умеренно представлены классы *Ulvophyceae* – 24 вида (25 ви. такс.) из 5 родов и *Charophyceae* – 15 из 6. Остальные классы не играют значительной роли в формировании разнообразия зелёных водорослей ДПС и представлены лишь несколькими видами: *Oedogoniophyceae* – 10 (11) из 2, *Prasinophyceae* – 4 из 3, *Pedinophyceae* – 2 из 1. Указанное распределение разнообразия зелёных водорослей в целом является характерным для Степной зоны Украины и объясняется гидрологическими особенностями водоёмов региона, а также общими характеристиками климата.

Наиболее богато среди зелёных водорослей водоёмов ДПС представлены три порядка: *Desmidiales* – 134 вида (167 ви. такс.), *Sphaeropleales* – 150 (171) и *Chlorellales* – 74 (75). Вместе они представляют 66,1% всего видового состава *Chlorophyta* региона исследований, что является следствием гидрологических особенностей наиболее богатых зелёными водорослями водоёмов, благоприятных именно для развития планктонной

Таблица 1. Систематический состав *Chlorophyta* водотоков северо-западного физико-географического областям

ТАКСОН	Количество таксонов согласно физико-географическим областям												Беро (ДИС)					
	СТР	Гн	Sp	Сп														
PEDINOPHYCEAE Moestr.	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2		
<i>Pedinomorphales Korschik.</i>	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2		
PRASINOPHYCEAE T.A. Christ. ex P.C. Silva	1	1	1	—	—	1	1	1	—	—	—	2	3	3	4	4		
<i>Chlorodendales F.E. Fritsch</i>	1	1	1	—	—	1	1	1	—	—	1	1	1	1	2	2		
<i>Pyraminiales Chaudet.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	1	2	2		
CHLOROPHYCEAE T.A. Christ.	73	191	211	42	94	101	34	83	91	48	89	92	24	48	49	92	248	273
<i>Dinobryales H. Erdt.</i>	1	1	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	3
<i>Chlamydomonadales F.E. Fritsch in G.S. West et F.E. Fritsch</i>	8	28	30	4	10	10	3	5	5	8	11	11	1	1	1	9	36	39
<i>Ulvoccales Ottm.</i>	7	9	9	3	3	3	4	6	6	4	5	5	3	3	3	7	10	10
<i>Tetrasporales Pasch.</i>	3	4	4	2	3	3	—	—	—	1	1	1	1	1	1	6	9	9
<i>Chlorococcales March. emend. Tzat.</i>	9	15	16	2	2	2	1	1	1	4	4	4	2	2	2	12	19	20
<i>Sphaeropleales Katz.</i>	38	120	137	26	67	74	22	65	73	27	64	67	14	35	36	47	150	171
<i>Chlorellales O'Keley, Watanabe et Floyd</i>	2	2	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2
<i>Chlorophorales Ville sensu Stewart et Mattox</i>	5	12	12	3	6	6	4	6	6	4	4	4	3	6	6	7	19	19
OEDOGONIOPHYCEAE F.E. Round	2	9	9	1	2	2	1	1	1	2	3	3	—	—	—	2	10	11
<i>Oedogoniidae G.S. West</i>	2	9	9	1	2	2	1	1	1	2	3	3	—	—	—	2	10	11
<i>ULOPHYCEAE (Lamour.) Stewart et Mattox</i>	3	7	7	5	17	18	3	9	9	3	8	8	3	8	8	5	24	25
<i>Ulothriaceae Borza</i>	1	3	3	1	4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	4	1	7	7
<i>Uvulariales Blackm. et Tansl.</i>	1	1	1	1	5	6	1	2	2	1	3	3	1	3	3	1	5	6
<i>Siphonocladales (Blackm. emend. Tensl.) Ohlm.</i>	1	3	3	3	8	8	1	6	6	1	4	4	1	1	1	3	12	12
TREBOUXIOPHYCEAE Fritell	20	46	47	15	32	32	16	32	33	14	30	31	5	6	6	28	75	76
<i>Chlorococcales Bold et Wayne</i>	19	45	46	15	32	32	16	32	33	14	30	31	5	6	6	27	74	75
<i>Microhanniales Melkonian</i>	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
ZYGEMATOPHYCEAE F.E. Round	24	133	163	4	19	19	5	27	32	9	31	32	3	11	11	27	163	201
<i>Zygematiales V. Krieg.</i>	7	18	22	1	5	5	1	2	2	5	7	7	1	3	3	8	29	34
<i>Desmidiales (Meregh.) Pasch.</i>	17	115	141	3	14	14	4	25	30	4	24	25	2	8	8	19	134	167
CHAROPHYCEAE Mignot et al	6	8	8	3	3	1	1	3	3	3	2	3	3	6	6	15	15	15
<i>Coleochaetales Chaudet.</i>	1	1	1	1	1	1	—	—	1	1	1	—	—	—	1	3	3	3
<i>Klebsormidiales Stewart et Mattox</i>	2	2	2	2	2	2	—	—	1	1	1	1	1	2	2	2	6	6
<i>Charales Dumort.</i>	3	5	5	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	6
CHLOROPHYTA	130	396	447	72	169	177	61	154	168	79	164	169	39	79	80	164	541	607

Обозначения: Гн – гамма, Sp – спирея, Спр – спиреевые таксоны, физико-географические области: СТР – Старобельская сплошь-возвышенность, ПВС – Приазовская возвышенность, ПНЗ – Западно-Донецкая склонно-возвышенность, ДНЦ – Донецкая возвышенность, Ауторы таксонов уничтожены по Авторы ..., 2001.

группы видов (в первую очередь это реки с медленным течением и пойменные водоёмы), а также биотических условий (наличие высшей водной растительности, ассоциативно с которой развиваются планктонные виды). Умеренное разнообразие характерно для семи порядков: *Chlamydomonadales* – 36 видов (39 ви. такс.), *Zygnetales* – 29 (34), *Chlorococcales* – 19 (20), *Chaetophorales* – 19, *Siphonocladales* – 12, *Oedogoniales* – 10 (11), *Volvocales* – 10. Остальные порядки представлены менее чем 10 видами (см. табл. 1).

К десяти ведущим семействам зелёных водорослей водоёмов ДПС принадлежат (рис. 2): *Desmidiaceae* – 104 вида (127 ви. такс.), *Scenedesmaceae* – 61 (76), *Oocystaceae* – 48, *Closteriaceae* – 27 (37), *Selenastraceae* – 35, *Chlorellaceae* – 26 (27), *Chlamydomonadaceae* – 22 (24), *Spirogyraceae* – 17 (20), *Hydrodictyaceae* – 12 (18), *Chaetophoraceae* – 17. Их общая доля составляет 68,2% на видовом и 70,7% на внутривидовом уровнях от общего количества зелёных водорослей ДПС, что свидетельствует о определённой систематической однобокости этой группы водорослей в водоёмах региона. Из указанных ведущих семейств три принадлежат к порядку *Sphaeropleales*, по два к порядку *Desmidiales* и *Chlorellales*, порядки *Chlamydomonadales*, *Zygnetales* и *Chaetophorales* представлены одним семейством каждый. Таким образом, учитывая количество таксонов каждого из семейств, разнообразие *Chlorophyta* ДПС имеет чёткий десмидово-сфероплеево-хлорелловый характер.




Рис. 2. Ведущие семейства *Chlorophyta* водоёмов Донецко-Приазовской Степи (%).

Внешний слой – внутривидовой, средний – видовой, внутренний – родовой.

К ведущим родам среди зелёных водорослей водоёмов ДПС принадлежат (рис. 3): *Cosmarium* Corda ex Ralfs – 52 вида (67 ви. такс.), *Closterium* Nitzsch ex Ralfs – 27 (37), *Desmodesmus* (Chod.) Hegew. – 22 (33), *Chlamydomonas* Ehrenb. – 17 (19), *Spirogyra* Link ex Nees – 15 (18), *Staurastrum* Meyen – 16 (17), *Pediastrum* Meyen – 7 (13), *Monoraphidium* Kom.-Legn. in Fott et al. – 11, *Cosmoastrum* Pal.-Mordv. ex Pal.-Mordv. – 8 (11). Указанные ведущие роды представляют 34,4% на видовом и 39,0% на внутривидовом уровнях всего разнообразия зелёных водорослей водоёмов ДПС.




Рис. 3. Ведущие роды *Chlorophyta* водоёмов Донецко-Приазовской Степи (%) на внутривидовом уровне.

Несмотря на значительные антропогенные трансформации ДПС (особенно водоёмов региона), нами обнаружен ряд редких и интересных во флористическом отношении видов (табл. 2, 3; рис. 4, 5). Впервые для флоры ДПС приводится 306 видов (361 вида такс.), для Степной зоны Украины – 107 (126), для флоры Украины – 32 (41). При этом большинство из них отмечено для СТР и ПВС (Петльваний, 2004, 2005б, е; Петлеваний, 2005б). Для СТР высокие показатели новых флористических находок обеспечиваются за счёт богатства расположенных тут пойменных водоёмов р. Сиверский Донец (Петлеваний, 2001, 2005а; Петльваний, 2005а), для ПВС – богатством и специфичностью водоёмов на выходах гранитов отделения Украинского степного природного заповедника Каменные Могильы (Петлеваний, 2001а). Наибольший процент новых флористических находок зелёных водорослей отмечен для ПНЗ (Петлеваний, 2001; Петльваний, 2001а), разнообразие которых является наименьшим по общему количеству видов и одновременно с этим наиболее самобытным, что объясняется наличием солёных и солоноватых озёр – постоянных или эфемерных вдоль побережья Азовского моря (C_1^{Sol} – и C_2^{Sol} -типы водоёмов). Здесь впервые для флоры Украины обнаружено 2 рода – *Maleochloris* Pasch. и *Siderocellosis* Hind. Высокий уровень богатства зелёных водорослей отмечен в водоёмах эталонных экосистем природных заповедников, что свидетельствует о рефугиональном типе распределения разнообразия *Chlorophyta* (Петлеваний, 1999, 2000, 2001а, 2003, 2004; Петльваний, 1999, 2000, 2001б, 2002, 2005в-д; Петлеваний и др., 2000а, б; Petlovany et al., 2000).

Особенности распределения *Chlorophyta* в разных типах водоёмов ДПС. Распределение зелёных водорослей согласно типам водоёмов ДПС имеет контрастно-неравномерный характер. Наиболее богато зелёными водорослями представлены в стоячих постоянных водоёмах (C_1 -тип), где обнаружено 327 видов (367 видов такс.), наиболее бедно – в текучих эфемерных водоёмах (A_2 -тип) – 2. Относительно полно эта группа представлена в текучих постоянных водоёмах (A_1 -тип) – 210 видов (224 видов такс.) и проточных постоянных (B_1) – 193 (213). Умеренное разнообразие зелёных водорослей характерно для эфемерных стоячих водоёмов (C_2 -тип) – 35 видов (37 видов такс.). Низким разнообразием *Chlorophyta* отличаются солёные озёра ДПС – солёные стоячие постоянные водоёмы (C_1^{Sol} -тип), для которых отмечено 14 видов, и солёные стоячие эфемерные водоёмы (C_2^{Sol} -тип) – 11. Однако разнообразие солёных водоёмов ДПС отличается наибольшей специфичностью. В регионе исследований водоёмы этого типа встречаются в ЗДН (Славянская группа озёр – Слепное, Репное и Вейсовое, а также Артёмовские озёра) и в ПНЗ

Таблица 2. Новые для флоры Украины представители *Chlorophyta* из водоемов Донецко-Приазовской Степи

Таксон	Физико-географическая область							
	СТР		ЗДН		ДНЦ		ПВС	
	Sp	Ssp	Sp	Ssp	Sp	Ssp	Sp	Ssp
<i>Chlorodendraceae</i> Oltm.								
<i>Scherffelia dubia</i> (Scherff.) Pasch.	+	+	-	-	-	-	-	-
<i>Pyramimonadaceae</i> Korschik.								
<i>Pyramimonas nanella</i> W. Conrad et Kufferat	-	-	-	-	-	-	-	+
<i>Chlamydomonadaceae</i> G.M. Sm.								
<i>Vitreochlamys gloeocephala</i> (Pasch. et Jahoda) Massjuk	+	+	-	-	-	-	-	-
<i>Chlorangiellaceae</i> Bourrelly ex Fott								
<i>Maleochloris sessilis</i> Pasch.	-	-	-	-	-	-	-	+
<i>Palmellopsidaceae</i> Korschik.								
<i>Chlamydocapsa bacillus</i> (Teil.) Fott	+	+	-	-	-	-	-	-
<i>Ch. planctonica</i> (W. West et G.S. West) Fott	-	-	-	-	-	+	+	-
<i>Charactochloridaceae</i> Skuja								
<i>Characiocloris apiculata</i> Korschik.	+	+	-	-	-	-	-	-
<i>Botryococcaceae</i> Wille								
<i>Botryococcus australis</i> Kom. et Marv.	+	+	-	-	-	-	-	-
<i>B. terribilis</i> Komárek et Marv.	+	+	+	-	-	-	-	-
<i>Radilococcaceae</i> Fott et Kom.								
<i>Coenochloris helvetica</i> Hind.	-	-	-	-	-	+	+	-
<i>C. hindakii</i> Kom.	+	+	-	-	-	-	-	-
<i>Selenastraceae</i> (Black. et Tansl.) F.E. Fritsch in G.S. West et Fritsch								
<i>Monoraphidium circinale</i> (Nyg.) Nyg.	-	-	-	-	-	+	+	-
<i>M. pusillum</i> (Printz) Kom.-Legn. in Fott	-	-	-	-	-	-	+	+
<i>Raphidocelis valida</i> Nyg. et al.	-	-	-	-	-	+	+	-
<i>R. van-goori</i> Nyg. et al.	-	-	-	-	-	-	+	+
<i>Scenedesmaceae</i> Oltm.								
<i>Coelastrum astroideum</i> De Not. var. <i>rugosum</i> (Rich.) Sodom.	-	+	-	-	-	-	-	-
<i>Desmodesmus armatus</i> (Chod.) Hegew. var. <i>subalternans</i> (G.M. Smith) Hegew.	-	+	-	-	-	-	-	+
<i>D. costato-granulatus</i> (Skuja) Hegew. var. <i>elegans</i> (Hortob.) Hegew.	-	+	-	-	-	-	-	-
<i>Tetrastrum hortobagyi</i> Hajdu	+	+	-	-	-	-	-	-
<i>Sphaeropleaceae</i> Kütz. emend. Cohn								
<i>Sphaeroplea wilmani</i> Fritsch et Rich	-	-	-	-	-	+	+	-
<i>Chaetophoraceae</i> Greve.								
<i>Stigeoclonium stagnatile</i> (Hazen) Coll.	-	-	-	-	-	-	+	+
<i>Uronema elongatum</i> Hodg.	+	+	-	-	-	-	-	-
<i>Oedogoniaceae</i> De Bary ex Hirn								
<i>Oedogonium chungkingense</i> (C.C. Jao) C.C. Jao	+	+	-	-	-	-	-	-
<i>Chlorellaceae</i> Brunth.								
<i>Actinastrum gracillimum</i> G.M. Sm.	-	-	-	+	+	-	-	-
<i>Siderocelis granulata</i> (Heyn.) Kom.	-	-	-	-	-	-	+	+
<i>S. irregularis</i> Hind.	+	+	-	-	-	-	-	-
<i>Siderocellosis kolwitzii</i> (Naum.) Hind.	-	-	-	-	-	-	+	+
<i>Oocystaceae</i> Bohl.								
<i>Franceia elongata</i> Korschik.	-	-	-	+	+	-	-	-
<i>Lagerheimia balatonica</i> (Scherff. in Kol.) Hind.	+	+	-	-	-	-	-	-
<i>Tetrachlorella incerta</i> Hind.	+	+	-	-	-	+	+	-
<i>Spirogyraceae</i> Kütz.								
<i>Spirogyra heieri</i> Nág. in Kütz.	-	+	-	-	-	-	-	-
<i>S. decimina</i> (O.F. Müll.) Kütz. emend. Polansk. <i>f. circumscissa</i> (Czurda) Polansk.	+	+	-	-	-	-	-	-
<i>Closteriaceae</i> Ehrenb. ex Prich.								
<i>Closterium lineatum</i> Ehrenb. var. <i>elongatum</i> (Rosa) Croasd.	-	+	-	-	-	-	-	-
<i>Desmidiaeae</i> Ralfs								
<i>Cosmarium arctoum</i> Nordst.	+	+	-	-	-	-	-	-
<i>C. pseudarctoum</i> Nordst. in Wittr. et Nordst.	-	-	-	-	-	-	-	+
<i>C. pseudotritusiforme</i> Grönbl.	-	-	-	-	+	+	-	-
<i>C. pygmaeum</i> W. Arch. var. <i>heimerlii</i> (W. West et G.S. West) W. Krieg et Gerloff	-	+	-	-	+	-	-	-
<i>C. regnellii</i> Willd. var. <i>pseudoregnellii</i> (Messak.) W. Krieg. et Gerloff	-	+	-	-	-	-	-	-
<i>C. subcostatum</i> Nordst. in Wittr. et Wittr. var. <i>minus</i> (W. West et G.S. West) Först.	-	+	-	-	+	-	-	-
<i>Staurastrum vestitum</i> Ralfs var. <i>abundans</i> Korsch.	-	+	-	-	-	-	-	-
<i>Staurastrum convergens</i> ((Ehrenb.) ex Ralfs) Teil. var. <i>laportei</i> Teil.	-	+	-	-	-	-	-	-
Всего новых таксонов для физико-географических областей	16	25	1	1	3	5	6	6
Всего новых таксонов для региона ДНЗ							8	9
Обозначения: Sp – виды, Ssp – внутривидовые таксоны; “+” – наличие таксона, “–” – отсутствие таксона.								

Таблица 3. Новые для флоры Степной зоны Украины представители *Chlorophyta*
из водоёмов Донецко-Приазовской Степи

Таксон	Физико-географическая область							
	СТР.		ЗДН		ДНЛ		ПВС	
	Sp	Ssp	Sp	Ssp	Sp	Ssp	Sp	Ssp
<i>Dunaliellaceae</i> T.A. Christ.	+	+	-	-	-	-	-	-
<i>Spermatozopsis exultans</i> Korschik.								
<i>Chlamydomonadaceae</i> G.M. Sm.								
<i>Carteria klebsii</i> (P.A. Dang) Francé emend. Troitzkij in Francé	-	-	-	-	-	-	+	-
<i>Chlamydomonas aculeata</i> Korschik. in Pash.	+	+	+	-	-	-	-	-
<i>Ch. gelatinosa</i> Korschik. in Pasch.	+	+	-	-	-	-	-	-
<i>Ch. gloeophila</i> Skuja	+	+	-	-	-	-	-	-
<i>Ch. leiostraca</i> (Strehlow) H. Ettl	+	+	-	-	-	-	-	-
<i>Ch. monadina</i> F. Stein var. <i>globulifera</i> (Korschik.) Korschik.	-	+	-	-	-	-	-	-
<i>Chlorogonium fusiforme</i> Matv.	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Phacotaceae</i> (Bütschli) Oltm.								
<i>Dysmorphococcus coccifer</i> Korschik.	-	-	-	-	-	-	+	-
<i>Pteromonas pseudoangulosa</i> Péterfi	+	+	-	-	-	-	-	-
<i>Spondylomoraceae</i> Korschik.								
<i>Pyrobotrys korschikoffii</i> (Schkorb.) Korschik.	+	+	-	-	-	-	-	-
<i>Volvocaceae</i> Cohn								
<i>Eudorina cylindrica</i> Korschik.	+	+	-	-	-	-	-	-
<i>Chlorococcaceae</i> Black. et Tansl.								
<i>Nautococcopsis constricta</i> (Korschik.) Geitler	-	-	-	-	+	+	-	-
<i>Characiocloridaceae</i> Skuja								
<i>Chlamydopodium plurilococcum</i> (Korschik.) H. Ettl et Kom.	+	+	-	-	-	-	-	-
<i>Sphaerocystidaceae</i> Fott ex Tsar.								
<i>Sphaerocystis planctonica</i> (Korschik.) Bourr.	-	-	-	-	-	-	-	+
<i>Rhopalosolenaceae</i> H. Ettl et Kom.								
<i>Pseudochlorothecium mucigenum</i> Korschik.	+	+	-	-	-	-	-	-
<i>P. spinifer</i> (Printz) Korschik.	+	+	-	-	-	-	-	-
<i>Botryococcaceae</i> Wille								
<i>Botryospharella sudetica</i> (Lemm.) P.C. Silva	+	+	-	-	-	-	-	-
<i>Quadrilococcus ellipticus</i> Hortob.	+	+	-	-	-	-	+	+
<i>Q. verrucosus</i> Fott	+	+	-	-	-	-	-	-
<i>Radiococcaceae</i> Fott et Kom.								
<i>Coenochloris piscinalis</i> Fott	-	-	-	-	-	-	+	-
<i>Palmodictyon lobatum</i> Korschik.	+	+	-	-	-	-	-	-
<i>P. viride</i> Kütz.	+	+	-	-	-	-	-	-
<i>Characiaceae</i> (Näg.) Wille in Warm.								
<i>Characium conicum</i> Korschik.	-	-	+	-	-	-	-	-
<i>Hydrodictyaceae</i> (S.W. Gray) Dumort.								
<i>Pediastrum integrum</i> Näg.	+	+	-	-	-	-	-	-
<i>Selenastraceae</i> (Black. et Tansl.) F.E. Fritsch in G.S. West et Fritsch								
<i>Chlorolobion lunulatum</i> Hind.	+	+	-	-	-	-	+	+
<i>Ch. obtusatum</i> Korschik.	+	+	-	-	-	-	-	-
<i>Raphidocelis danubiana</i> (Hind.) Marv. et al.	+	+	-	-	-	-	-	-
<i>R. sigmoida</i> Hind.	+	+	+	+	-	-	-	+
<i>R. subcapitata</i> (Korschik.) Nyg. et al.	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Gloeoitilaceae</i> H. Ettl et Gartner								
<i>Gloeotila spiralis</i> Chod.	+	+	-	-	-	-	-	-
<i>Ulothrichopsis cylindrica</i> Wichm.	-	-	-	-	-	-	+	-
<i>Scenedesmaceae</i> Oltm.								
<i>Enallax acutiformis</i> (Schröd.) Hind. var. <i>costatus</i> (Hub.-Pestal.) Pankow	-	-	-	-	-	-	-	+
<i>Scenedesmus papillosum</i> Pankow	+	+	-	-	-	-	+	-
<i>S. parvus</i> (G.M. Sm.) Bourr. in Bourr. et Mang.	+	+	-	-	-	-	-	-
<i>S. raciborskii</i> Wołosz.	-	-	-	+	+	-	-	-
<i>Microsporaceae</i> Bourr.								
<i>Geminella interrupta</i> (Turp.) Lagerh.	+	+	-	-	-	-	-	-
<i>Microspora quadrata</i> Hazen	-	-	-	-	-	-	+	-
<i>Oedogoniaceae</i> De Bary ex Hirn								
<i>Oedogonium decipiens</i> Witt. ex Hirn	-	-	-	-	-	-	+	-
<i>Oe. gracilius</i> (Witt. ex Hirn) Tiff.	+	-	-	-	-	-	-	-

окончание табл. 3

Таксон	Физико-географическая									
	СТР		ЗДН		ДНЦ		ПВС		ПНЗ	
	Sp	Ssp	Sp	Ssp	Sp	Ssp	Sp	Ssp	Sp	Ssp
<i>Chlorellaceae</i> Brunnth.										
<i>Dicotyphaerium granulatum</i> Hind.	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Golenkiniopsis parvula</i> (Woron.) Korschik.	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
<i>Keratococcus sueticus</i> Hind.	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-
<i>Ocytaceae</i> Bohl.										
<i>Amphikrikos hexacosta</i> (Thomp.) Hind.	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-
<i>Oocystis rhomboidea</i> Fott	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-
<i>Zygemataceae</i> Black. et Tensl.										
<i>Cylindrocystis crassa</i> De Bary	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-
<i>Zygema chalybeosporum</i> Hansg.	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-
<i>Mougeotiacae</i> Black. et Tensl.										
<i>Mesotaenium caldarium</i> (Lagerh.) Hansg.	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-
<i>M. chlamydosporum</i> De Bary	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-
<i>M. endlicherianum</i> Nag.	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-
<i>Peniaceae</i> Haack.										
<i>Pentium bogueanum</i> Skuja	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-
<i>Closteriaceae</i> Ehrenb. ex Pritch.										
<i>Closterium costatum</i> Corda ex Ralfs	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>C. ehrenbergii</i> Menegh. ex Ralfs var. <i>podolicum</i> Gutw.	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>C. moniliferum</i> (Bory) Ehrenb. ex Ralfs var. <i>submoniliferum</i> (Woron.) W. Krieg	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>C. pseudolumina</i> Borge emend. W. Krieg.	+	+	-	-	-	-	+	+	-	-
<i>Desmidiaeae</i> Ralfs										
<i>Actinotaenium cuscibita</i> (Bréb. in Ralfs) Teil. ex Růžička et Pouzar	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-
<i>Cosmarium anceps</i> Lund.	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-
<i>C. bioculatum</i> [Bréb.] ex Ralfs var. <i>depressum</i> (Schaarschm.) Schmidle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>C. biretum</i> Bréb. ex Ralfs var. <i>trigibberum</i> Nordst.	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>C. broomei</i> Thwaites in Ralfs	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>C. debaryi</i> W. Arch. in Prich.	+	+	-	-	+	+	-	-	-	-
<i>C. hammeri</i> Reinsch	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-
<i>C. hornavanense</i> Gutw.	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>C. impressulum</i> Elfv. var. <i>suborthogonum</i> (Racib.) Presc.	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-
<i>C. margaritatum</i> (Lund.) Roy et Biss.	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-
<i>C. ochotodes</i> Nordst. var. <i>amoebum</i> W. West	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>C. praecisum</i> Borge	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>C. pseudobroomei</i> Wolle	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>C. quadratum</i> Ralfs ex Ralfs	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>C. regnelli</i> Wille	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-
<i>Cosmoastrum brebissonii</i> (W. Arch.) Pal.-Mordv.	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>C. dilatatum</i> (Ehrenb.) Pal.-Mordv.	+	+	-	-	-	-	+	+	-	-
<i>C. dispar</i> (Bréb.) Pal.-Mordv.	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>C. pyramidatum</i> (W. West) Pal.-Mordv.	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-
<i>Desmidium baileyi</i> (Ralfs) Nordst.	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>D. swartzii</i> (C. Agardh) Ralfs var. <i>amblyodon</i> (Itzig.) Rabenh.	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Pleurotaenium nodulosum</i> (Bréb.) De Bary	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Raphidiastrium avicula</i> (Bréb.) Pal.-Mordv.	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>R. granulosum</i> (Ehrenb.) Pal.-Mordv.	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>R. keratotum</i> (Ralfs) Pal.-Mordv. var. <i>planctonicum</i> (W. West and G.S. West) Pal.-Mordv.	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Spondylosium panduriforme</i> (Heimerl) Teil.	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Klebsormidiaceae</i> Stewart and Mattox										
<i>Klebsormidium subtile</i> (Kötz.) Tracana ex Tell	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-
<i>Koliella closteroides</i> (Kuff.) Hind.	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-
<i>K. corcontica</i> Hind.	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-
<i>Nitellaceae</i> Bessey										
<i>Tolyella prolifera</i> (Ziz ex A. Br.) Leonh.	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего новых таксонов для физико-географических областей	48	55	7	7	8	9	27	28	8	9
Всего новых таксонов для региона ДПС							75 видов (85 вид. такс.)			

Обозначения: Sp – виды, Ssp – внутривидовые таксоны, “+” – наличие таксона, “–” – отсутствие таксона. Общее количество впервые обнаруженных для Степной зоны таксонов, с учётом новых для флоры Украины, составляет: ДПС – 107 видов (126 вид. такс.), ЗДН – 8, ДНЦ – 11 (14), ПВС – 33 (34), ПНЗ – 16 (18).




Рис. 4. Новые и редкие для флоры Степной зоны и Украины *Chlorophyta* из водоемов Донецко-Приазовской Степи: 1 – *Tetrastrum hortobagii* Hajdu; 2 – *Acutodesmus regularis* (Swir.) Tsar. in Tsar. et Petlov.; 3 – *Desmodesmus costato-granulatus* (Skuja) Hegew. var. *elegans* (Hortob.) Hegew.; 4 – *Siderocelis irregularis* Hind.; 5 – *Cosmarium broomei* Thwaites in Ralfs; 6 – *C. pseudobroomei* Wolle.




Рис. 5. Новые и редкие для флоры Степной зоны и Украины *Chlorophyta* из водоемов Донецко-Приазовской Степи: 1 – *Chlamydopodium plurilococcum* (Korschik.) H. Ettr. et Kom.; 2 – *Botryosphaerella sudetica* (Lemm.) P.C. Silva; 3 – *Pteromonas pseudoangulosa* Péterfi; 4 – *Coenochloris piscinalis* Fott; 5 – *Quadricoccus ellipticus* Hortob.; 6 – *Q. verrucosus* Fott; 7 – *Echinospheridium nordstedtii* Lemm.; 8, 9 – *Palmodictyon lobatum* Korschik.; 10 – *Koliella corcontica* Hind.; 11 – *Closterioides* (Kuff.) Hind.; 12 – *Desmidium swartzii* (C. Agardh) C. Agardh ex Ralfs var. *amblyodon* (Itzig.) Rabenh.; 13 – *D. baileyi* (Ralfs) Nordst.; 14 – *Stauromedesmus convergens* ([Ehrenb.] ex Ralfs) Teil. var. *laportei* Teil.; 15 – *Cosmarium arctoum* Nordst.; 16 – *C. biretum* Bréb. ex Ralfs var. *trigibberum* Nordst. Масштаб линейки 5 мкм.

(Приазовская группа озёр). Первая группа представлена солёными постоянными, в основном гипергалинными озёрами (рассолы), вторая – эфемерными солоноватыми озёрами. Особенности их солевого режима, периода существования, гидрологические и биотические факторы обуславливают формирование низкого и специфичного богатства зелёных водорослей, значительная часть которых – редкие для флоры Европы.

Согласно методу мер включения, установлено высокую специфичность внутривидового состава зелёных водорослей разного типа водоёмов (рис. 6). Центрами разнообразия *Chlorophyta* при $\delta \geq 0,50$ признаются три типа водоёмов – A_1 , B_1 и C_1 , а при $\delta \geq 0,70$ два – B_1 и C_1 . Наиболее высокие показатели включения характерны для текущих эфемерных водоёмов, разнообразие которых полностью входит в проточные постоянные водоёмы (${}^{sp}K_{(A_2-B_1)} = 1,00$), что, однако, обеспечивается в первую очередь за счёт низкого богатства зелёных водорослей A_2 -типа водоёмов. Значимые показатели отмечены для стоячих водоёмов – постоянных и эфемерных, при этом разнообразие эфемерных водоёмов достоверно включается в постоянные (${}^{sp}K_{(C_2-C_1)} = 0,84$). Показатели включения для других пар сравнения следующие: ${}^{sp}K_{(B_1-C_1)} = 0,70$, ${}^{sp}K_{(C_2-B_1)} = 0,70$ и ${}^{sp}K_{(A_1-C_1)} = 0,65$. Значимые обратные связи отмечены только для одной пары сравнений (текущие постоянные и проточные постоянные водоёмы), что объясняется обменом водными массами (например, водохранилище на реке) и, как следствие, прямым обменом диаспорами водорослей и их вегетативными стадиями с последующим их активным развитием в застойных водных массах. Так, показатели включения внутривидового разнообразия *Chlorophyta* для этих пар сравнения составляют: прямая связь – ${}^{sp}K_{(A_1-B_1)} = 0,62$, обратная – ${}^{sp}K_{(A_1-B_1)} = 0,59$, и в данном случае можно отметить не только определённую меру включения внутривидового разнообразия *Chlorophyta*, но и значительную их близость. Для остальных пар сравнения показатели меры включения несколько ниже: ${}^{sp}K_{(C_2-A_1)} = 0,60$, ${}^{sp}K_{(A_2-A_1)} = 0,50$, ${}^{sp}K_{(A_2-C_1)} = 0,50$, ${}^{sp}K_{(C_2-Sol-B_1)} = 0,50$. При этом наиболее специфичным оказалось разнообразие солёных стоячих постоянных водоёмов – значимые связи с разнообразием *Chlorophyta* других типов водоёмов отсутствуют.




Рис. 6. Ориентированный график отношений внутривидового состава *Chlorophyta* разного типа водоёмов Донецко-Приазовской Степи с указанием соответствующего показателя включения (K_0), $a - \delta \geq 0,50$, $b - \delta \geq 0,70$.

Основное разнообразие *Chlorophyta* водоёмов ДПС сконцентрировано в реках (А₁-тип водоёмов), водохранилищах (В₁) и озёрах (С₁). Для каждого типа водоёмов характерно специфическое внутривидовое разнообразие зелёных водорослей, из которых наиболее богаты пойменные озёра в долине р. Сиверский Донец.

Характерные особенности *Chlorophyta* Донецко-Приазовской Степи

Особенности территориального распределения Chlorophyta Донецко-Приазовской Степи. Разнообразие зелёных водорослей в водоёмах ДПС согласно физико-географическим областям распределяется контрастно неравномерно. Наиболее богатая является территория СТР – 396 видов (447 ви. такс.), принадлежащих к 130 родам, бедной – ПНЗ – 79 (80) из 39. Для остальных областей региона характерно умеренное разнообразие *Chlorophyta*: ЗДН – 169 (177) из 72, ДНЦ – 154 (168) из 61, ПВС – 164 (169) из 79.

В соответствии с представленностью зелёных водорослей (видового и внутривидового богатства), в водоёмах региона ДПС можно выделить три территориальные единицы, каждой из которых характерен определённый уровень разнообразия *Chlorophyta*:

северная – территория СТР, наиболее богата по количеству видов зелёных водорослей и показателями обилия их развития;

центральная – территория ЗДН, ДНЦ и ПВС, характеризуется умеренным разнообразием зелёных водорослей, для каждой из областей количество обнаруженных видов почти одинаково;

южная – территория ПНЗ, зелёные водоросли в водоёмах представлены бедно, показатели обилия минимальны.

Видовое разнообразие *Chlorophyta* ДПС уменьшается в направлении с севера на юг, что обусловлено комплексом факторов, из которых наиболее важными являются: 1) уровень оводненности региона и представленность разных типов водоёмов, 2) общая минерализация водных масс и их ионный состав, 3) количество солнечной радиации, 4) уровень антропогенной нагрузки.

Указанные особенности распределения разнообразия *Chlorophyta* водоёмов ДПС проявляются и на более высоком территориальном уровне. Сопоставление видового состава *Chlorophyta* разных физико-географических зон равнинной территории Украины (Смешанных и Широколиственных Лесов, Лесостепи, Степи) указывает на уменьшение его богатства в водоёмах в направлении на юг. Эта тенденция в распределении зелёных водорослей водоёмов Украины наиболее ярко проявляется непосредственно в Степной зоне. Распределение богатства *Chlorophyta* в Степной зоне и специфичность его видового состава свидетельствует о "переходном" характере разнообразия зелёных водорослей в водоёмах Степи от типичного разнообразия умеренного пояса до разнообразия, характерного для субтропических областей (жаркий пояс). Последнее заключается в общем снижении разнообразия *Chlorophyta*, уменьшении представленности конъюгат (класс *Zygnematophyceae*), увеличении роли видов, имеющих нитчатую структуру тела (класс *Ulvophyceae*), в формировании альгоценозов.

Систематическая структура Chlorophyta физико-географических областей Донецко-Приазовской Степи. Для каждой из областей ДПС характерны не только определённые показатели богатства зелёных водорослей, но и специфическое видовое разнообразие. Во флористических спектрах *Chlorophyta* на уровне семейств в большинстве случаев первый ранг занимает семейство *Scenedesmaceae* (рис. 7), что является следствием высокой представленности его видов в водоёмах ДПС и природного богатства




Рис. 7. Спектры семейств *Chlorophyta* физико-географических областей Донецко-Приазовской Степи на внутривидовом уровне (десять ведущих семейств согласно рангам масштабировано).

самого семейства, исключение составляет лишь СТР, в спектре которой оно занимает вторую позицию. В СТР наиболее богато представлены семейства класса *Zygnematophyceae*; два из них – *Desmidiaceae* и *Closteriaceae*, соответственно, занимают первую и третью позиции в ранжированном ряду. С продвижением на юг ДПС ведущая роль этих семейств значительно снижается. Так, семейство *Desmidiaceae* с первого ранга (СТР) перемещается на второй-четвёртый (ДНЦ, ПВС, ПНЗ) и седьмой (ЗДН), при этом изменяется и его родовой состав; семейство *Closteriaceae* – с третьего (СТР) до шестого (ПВС) и седьмого (ДНЦ) рангов, а для ЗДН и ПНЗ вообще выпадает из спектра. Это, вероятно, связано с отсутствием экотопов, характерных для значительного развития этой группы и соответствующей высшей водной растительности, с которой коньюгаты образуют устойчивые ассоциативные связи, а также усилением антропогенной нагрузки на водоёмы. С другой стороны, в спектрах южных областей появляются семейства из класса *Ulvophyceae* (*Ulotrichaceae*, *Ulvaceae*, *Cladophoraceae*), отсутствующие среди ведущих семейств СТР. Относительно постоянные позиции занимают семейства *Selenastraceae*,

Chlorellaceae (центральная часть спектра) и *Hydrodictyaceae* (нижняя), что свидетельствует о благоприятных условиях для развития их представителей в водоёмах всего региона ДПС, а климатические, биотические и антропогенные факторы не имеют значительного лимитирующего влияния. При этом следует учитывать представленность среди этих семейств значительного количества широко распространённых эврибионтных видов-убикистов. Позиция семейства *Oocystaceae* в разных областях неоднозначна. В спектрах ЗДН, ДНЦ и ПВС (центральная территориальная единица ДПС) оно занимает вторую-третью позиции, для СТР – четвёртую, для ПНЗ – седьмую, что, вероятно, является следствием особенностей гидрологии разных типов водоёмов, доминирующих в различных областях, и ионного состава водных масс.

К специфическим особенностям разнообразия *Chlorophyta* водоёмов ДПС следует отнести гетерогенность флористических спектров (особенно в нижней части спектра) разных областей на уровне семейств. Последний факт следует понимать как значительное различие флор. Однако этому есть субъективные и объективные пояснения. К субъективным следует отнести две причины: 1) нами анализируется не вся альгофлора, а лишь отдел *Chlorophyta*, 2) отдел *Chlorophyta*, в свою очередь, также является экологически и систематически достаточно гетерогенной группой. Среди объективных причин – колебания климатических условий (включая гидрологические особенности водоёмов) в разных областях, а также разный уровень антропогенной нагрузки (от аграрного севера до высокондустриализованных центра и юга).

Особенности видового состава *Chlorophyta* физико-географических областей Донецко-Приазовской Степи. Центром разнообразия *Chlorophyta* ДПС на уровне физико-географических областей являются водоёмы СТР, в него на значимо высоком уровне включается богатство зелёных водорослей других областей (рис. 8). Наиболее высокие показатели характерны для двух территориально близких центру областей – ЗДН ($^{sp}K_{(здн-стр)} = 0,79$) и ДНЦ ($^{sp}K_{(днц-стр)} = 0,76$). Для более отдалённой области – ПВС, этот показатель несколько ниже ($^{sp}K_{(пвс-стр)} = 0,63$) и с увеличением уровня значимости ($\delta \geq 0,50$ до $\delta \geq 0,70$) признаётся недостоверным. Высокий показатель связей отмечен для областей, выделенных нами в центральную территориальную единицу (ЗДН, ДНЦ, ПВС). Причём, связь между разнообразием зелёных водорослей ДНЦ и ПВС обеспечивается через водоёмы ЗДН (в последнем случае отмечены обратные значимые связи, что свидетельствует о подобии видового состава этих областей).

С увеличением уровня значимости до $\delta \geq 0,70$ наиболее специфичным признаётся разнообразие зелёных водорослей ПНЗ, остальные области образуют плеяду с дистанционной связью с центром разнообразия (СТР), причём связь *Chlorophyta* ПВС и СТР непрямая и реализуется через водоёмы ЗДН.

Таким образом, для региона ДПС установлено: 1) водоёмы СТР – центр разнообразия *Chlorophyta* ДПС, 2) наиболее высокие показатели связей богатства зелёных водорослей характерны для территориально близких областей: СТР (северная единица) и ДНЦ, ЗДН (центральная), 3) связь между разнообразием *Chlorophyta* ПВС и СТР непрямая и обеспечивается через водоёмы ЗДН, 4) наибольшая близость богатства зелёных водорослей (подобие) отмечена для областей центральной территориальной единицы (ЗДН и ПВС), 5) для разнообразия *Chlorophyta* водоёмов ДПС характерна значительная географическая дифференциация, что чётко проявляется в направлении с севера на юг региона.




Рис. 8. Орграф отношений внутривидового состава *Chlorophyta* водоёмов различных физико-географических областей Донецко-Приазовской Степи: а – с указанием соответствующего показателя включения (K_0), при $\delta \geq 0,50$, б – с вычленением корреляционной плейды, при $\delta \geq 0,70$.

Репрезентативность и самобытность *Chlorophyta* Донецко-Приазовской Степи

В водоёмах Степной зоны, с учётом литературных данных и оригинальных исследований, зарегистрировано 869 видов (973 вида такс.) зелёных водорослей, из них 541 вид (607 вид. такс.) обнаружен в водоёмах ДПС. Таким образом, на долю ДПС приходится 62,3% видового и 62,4% внутривидового разнообразия *Chlorophyta* Степной зоны, 26,5% и 23,5% *Chlorophyta* Украины соответственно (сравн. Дополнение ..., 2001). Мера включения внутривидового разнообразия *Chlorophyta* водоёмов ДПС по отношению к Степной зоне в целом составляет 0,79 ($^{sp}K_{(DPS-ST)} = 0,79$).

Особенности спектров ведущих семейств *Chlorophyta*. Флористические спектры семейств зелёных водорослей водоёмов во флоре ДПС и остальной территории Степной зоны на уровне десяти ведущих семейств оказываются достаточно близкими (рис. 9). Очевидно, что сопоставленные спектры в определённой мере отображают особенности систематической структуры отдела и субъективные аспекты истории его исследования. Поэтому общие тенденции, приведенные ниже, не следует считать абсолютными, однако мы старались вычленить лишь главные и наименее спорные их закономерности.

Подобие спектров: общими для двух спектров являются восемь семейств (*Desmidiaceae*, *Scenedesmaceae*, *Closteriaceae*, *Oocystaceae*, *Chlamydomonadaceae*, *Selenastraceae*, *Chlorellaceae*, *Chaetophoraceae*), при этом первые два занимают одинаковые высшие ранги. Последнее вполне предсказуемо, поскольку именно эти два семейства наиболее богато представлены среди зелёных водорослей, а их представители широко распространены в альгофлорах мира (от умеренного до тропического пояса).

Отличия спектров: 1) близкие, но неодинаковые ранги для шести общих семейств, 2) наличие двух семейств, специфических для каждого из спектров. Первый факт, скорее, объясняется наличием в Степной зоне транзональных рек (Дунай, Днестр, Днепр) и крупных водохранилищ на них, отсутствующих в ДПС, что обус-

лавливает доминирование видов, более приспособленных для развития в больших, относительно застойных водоёмах. Второй факт, с одной стороны, связан с наличием множества лиманов, связующих реки с Чёрным морем, что обусловило вхождение в спектр *Chlorophyta* Степной зоны семейства *Cladophoraceae*. Для ДПС, омыаемого Азовским морем, влияние засоления приусьтевых участков рек значительно ниже. С другой стороны, вхождение в спектр Степной зоны семейства *Oedogoniaceae*, а для ДПС – *Hydrodictyaceae* и *Spirogyraceae*, скорее, можно объяснить субъективным фактором – степенью изученности представителей разных семейств в различных областях Степной зоны.




Рис. 9. Спектр семейств *Chlorophyta* водоёмов: а – Степная зона Украины, б – Донецко-Приазовская Степь.

Анализ флористических спектров на уровне семейств *Chlorophyta* показал, что регион ДПС не может быть признан специфическим по отношению к остальной территории Степной зоны. Однако несмотря на информативность показателей систематической структуры флор, для вычленения специфики близких территорий с подобными климатическими условиями целесообразнее использовать методы сравнений, позволяющие анализировать не ведущую часть выборки, а генеральные их совокупности. Самобытность близких территорий определяется на внутривидовом уровне. Неравномерность выборок обуславливает использование для достижения этой цели метода "мер включения" (Сёмкин, Комарова, 1977). Данный метод применяется нами для выявления специфики внутривидового разнообразия зелёных водорослей водоёмов в двух направлениях: первое – территориальное (сопоставление богатства *Chlorophyta* различных подзон Степной зоны Украины), второе – экологическое (сопоставление богатства *Chlorophyta* различных типов водоёмов ДПС и остальной части Степной зоны Украины).

Особенности разнообразия *Chlorophyta* в водоёмах разных подзон Степной зоны. Для вычленения специфичности богатства зелёных водорослей ДПС по отношению к Степной зоне Украины нами выбран уровень подзон. Степная зона Украины представлена тремя подзонами – Северостепной, Среднестепной, Сухостепной (Атлас..., 1999-2000). Причём из первой и самой крупной зоны нами выделено регион ДПС, что, во-первых, является необходимым условием проведения анализа, а во-вторых – уравновешивает размеры территорий, богатство водорослей которых сравнивается. Таким образом, для сопоставления разнообразия *Chlorophyta* водоёмов включены: 1) Северостепная подзона (без региона ДПС), 2) Среднестепная подзона, 3) Сухостепная подзона, 4) регион ДПС.

Внутривидовое разнообразие зелёных водорослей различных регионов Степной зоны в пределах Украины характеризуется тесными связями. Так, установлены высокие показатели включения разнообразия *Chlorophyta* для всех территориальных единиц, при этом отмечены не только значимые связи, но и подобие, что подтверждается наличием обратных связей.

При $\delta \geq 0,50$ регион ДПС признаётся центром разнообразия *Chlorophyta* Степной зоны, что, очевидно, объясняется уровнем изученности этой группы водорослей в Степной зоне Украины (рис. 10, а). Разнообразие *Chlorophyta* водоёмов остальных подзон достоверно включается в ДПС: Северостепная подзона – на уровне 0,58, Среднестепная – 0,55, Сухостепная – 0,57. Для первых двух подзон показатели включения внутривидового разнообразия характеризуются наличием обратной связи – 0,53 и 0,55, соответственно, что свидетельствует о близости исследуемых выборок водорослей.

При увеличении уровня достоверности ($\delta \geq 0,70$) для разнообразия зелёных водорослей отдельных территорий Степной зоны проявляются черты специфичности (рис. 10, б). Так, богатство водоёмов *Chlorophyta* Северостепной, Среднестепной и Сухостепной подзон объединяется в единую плеяду с показателями включения, варьирующими в пределах 0,71-0,79. В этой плеяде наибольшей близостью отличается разнообразие зелёных водорослей водоёмов Северостепной и Среднестепной подзон (наличие обратных связей). Зелёные водоросли водоёмов ДПС образуют отдельную группу видов, значимо не связанную ни с одной из подзон, что подтверждает высокий уровень специфичности и самобытности разнообразия *Chlorophyta* ДПС на внутривидовом уровне.




Рис. 10. Орграф отношений внутривидового состава *Chlorophyta* разных подзон Степной зоны Украины и Донецко-Приморской Степи с указанием соответствующего показателя включения (K_{α}): а – при $\delta \geq 0,50$, б – при $\delta \geq 0,70$. Обозначения подzon: NST – Северостепная, CST – Среднестепная, SST – Сухостепная, DPS – Донецко-Приморская Степь.

Высокая специфичность внутривидового разнообразия *Chlorophyta* ДПС обусловлена следующими причинами: 1) наличие в ДПС наиболее развитой в Степной зоне системы пойменных водоёмов (старицы р. Сиверский Донец), где экологические условия для развития зелёных водорослей особо благоприятны, 2) чёткая геологическая мозаичность региона Донецкого кряжа и Приазовской низменности и, как следствие, абиотических условий. Дополнительными факторами, подчёркивающими специфику *Chlorophyta* водоёмов ДПС при сравнении с южными территориями Степи (Среднестепная и Сухостепная подзона), является усиление сухости климата, снижение коэффициентов гидрографической сети, а также изменение общей минерализации водных масс и их ионный состав.

Особенности разнообразия *Chlorophyta* в разных типах водоёмов Степной зоны. Значительная экологическая дифференциация представителей отдела *Chlorophyta* обуславливает необходимость сопоставления их разнообразия в соответствии с основными типами водоёмов (текущие – А-тип, проточные – В-тип, стоячие – С-тип) в пределах ДПС и остальной территории Степной зоны. Для отдельных типов водоёмов характерны высокие показатели включения внутривидового разнообразия *Chlorophyta* ДПС в таковую Степной зоны (рис. 11). Значимые показатели характерны для водоёмов А- и В-типов (K_0 колеблется в пределах 0,71–0,74). Для текущих водоёмов (А-тип), основу которых составляют реки, это поясняется сходством гидрологических условий степных рек. Для проточных водоёмов (В-тип), представленных в основном водохранилищами и лиманами, это обусловлено искусственным происхождением водохранилищ и типичностью созданных здесь условий. Высокие показатели связей между разнообразием текущих и проточных водоёмов – следствие прямого обмена водными массами рек, созданными на них водохранилищами и лиманами в устьевых участках рек. С другой стороны, несмотря на обмен водных масс, наличие специфических видов для этих типов водоёмов является следствием их различных гидрологических условий (интенсивность движения водных масс, их прогрев, насыщенность кислородом и т.д.).




Рис. 11. Орграф отношений внутривидового состава *Chlorophyta* разных типов водоёмов Степи и Донецко-Приазовской Степи с указанием соответствующего показателя включения (K_0): а – при $\delta \geq 0,50$; б – при $\delta \geq 0,70$. Обозначения типов водоёмов: А_{ST} – текущие, В_{ST} – проточные, С_{ST} – стоячие (Степная зона), А_{DPS} – текущие, В_{DPS} – проточные, С_{DPS} – стоячие (ДПС).

Иначе формируются связи разнообразия зелёных водорослей стоячих водоёмов (С-тип). Так, показатели включения внутривидового богатства стоячих водоёмов ДПС в текучие и проточные Степной зоны варьируют в пределах 0,52-0,56. С увеличением уровня достоверности данных до $\delta \geq 0,70$ связи С-типа водоёмов ДПС с водоёмами остальной части Степи признаются незначимыми. Низкие показатели включения внутривидового разнообразия *Chlorophyta* стоячих водоёмов ДПС в другие водоёмы (текущие и проточные) свидетельствуют о его самобытности. Разнообразие зелёных водорослей стоячих водоёмов ДПС более богатое, чем на остальной части Степной зоны Украины, а низкие показатели включения *Chlorophyta* стоячих водоёмов Степи в ДПС ($K_{C-ST-C-DPS} = 0,46$) подтверждают специфичность внутривидового состава водорослей.

Главной особенностью разнообразия зелёных водорослей ДПС и Степной зоны для соответствующих типов водоёмов является принадлежность видов, формирующих связи, к убiquистам, характеризующим широким распространением. Это эврибионтные виды из семейств *Schenesmaceae* и *Selenastraceae*, а также наиболее распространённые представители семейств *Desmidiaeae* и *Ulvaceae*.

Основное богатство *Chlorophyta* стоячих водоёмов ДПС сконцентрировано в старицах р. Сиверский Донец, где условия для развития этой группы водорослей наиболее благоприятны. Поэтому мы рассматриваем пойменные водоёмы р. Сиверский Донец как рефутиум разнообразия зелёных водорослей Степной зоны Украины, что подтверждается следующими фактами: 1) наибольшее количество видов *Chlorophyta*, обнаруженных в стоячих водоёмах в пределах Степной зоны, 2) высокие показатели обилия развития (включая редкие таксоны), 3) значительная специфичность видового состава. При этом следует также учитывать характеристики Сиверско-Донецкого меридионального экологического коридора: 1) наибольшее количество пойменных озёр среди степных рек, 2) относительно незначительная антропогенная трансформация поймы Сиверского Донца по сравнению с другими реками Степной зоны.

Анализ разнообразия *Chlorophyta* ДПС и остальной территории Степной зоны Украины на внутривидовом уровне в соответствии с типами водоёмов показал высокую самобытность зелёных водорослей для стоячих водоёмов (пойма р. Сиверский Донец) и значительное подобие их богатства для других типов водоёмов (текущие, текущие и проточные).

Заключение

Водоёмы Донецко-Приазовской Степи, в сравнении со степными экосистемами, характеризуются высоким разнообразием *Chlorophyta*, что объясняется разнородностью природных условий региона (климатических, гидрологических и биологических). В пределах этой территории обнаружен 541 вид (607 ви. такс.) зелёных водорослей, принадлежащих к 164 родам, 55 семействам, 22 порядкам и 8 классам. Впервые для флоры Донецко-Приазовской Степи обнаружено 306 видов (361 ви. такс.), Степной зоны – 107 (126), Украины – 32 (41) и 2 рода (*Maleochloris*, *Siderocelopsis*).

Основу разнообразия зелёных водорослей водоёмов Донецко-Приазовской Степи составляют три класса: *Chlorophyceae* – 248 видов (273 ви. такс.) из 92 родов, *Zygematophyceae* – 163 (201) из 27 и *Trebouxiophyceae* – 75 (76) из 28, которые вместе объединяют 89,8% всего видового состава *Chlorophyta*. В фитоценозах водоёмов региона доминируют представители классов *Chlorophyceae* или *Ulvophyceae*, в направлении на юг увеличивается роль класса *Ulvophyceae*.

Наиболее богато в водоёмах Донецко-Приазовской Степи представлены семейства *Desmidiaceae* – 104 вида (127 ви. такс.), *Scenedesmaceae* – 61 (76), *Oocystaceae* – 48, *Cladophoraceae* – 27 (37), *Selenastraceae* – 35, *Chlorellaceae* – 26 (27), *Chlamydomonadaceae* – 22 (24), *Spirogyraceae* – 17 (20), *Hydrodictyaceae* – 12 (18), *Chaetophoraceae* – 17, общая доля которых составляет 68,2% всего видового разнообразия зелёных водорослей. Наиболее богатые роды *Cosmarium* – 52 вида (67 ви. такс.), *Closterium* – 27 (37), *Desmodesmus* – 22 (33), *Chlamydomonas* – 17 (19), *Spirogyra* – 15 (18), *Staurastrum* – 16 (17), *Pediastrum* – 7 (13), *Monoraphidium* и *Oocystis* – по 11, *Cosmostastrum* – 8 (11), представляющие 34,4% всего видового разнообразия региона.

Распределение разнообразия *Chlorophyta* в водоёмах Донецко-Приазовской Степи имеет контрастно неравномерный характер. Богатство *Chlorophyta* региона уменьшается в направлении с севера на юг, что обусловлено такими основными факторами: 1) уровнем обводнённости региона и представленностью различных типов водоёмов, 2) общей минерализацией водных масс и их ионным составом, 3) уровнем антропогенной нагрузки. Наиболее богаты зелёными водорослями водоёмы Старобельской склоно-возвышенностной физико-географической области – 396 видов (447 ви. такс.) из 130 родов, бедны – Приазовской низменностной – 79 (80) из 39, умеренное разнообразие установлено для Западно-Донецкой склоно-возвышенностной – 169 (177) из 72, Донецкой возвышенностной – 154 (168) из 61 и Приазовской возвышенностной областей – 164 (169) из 79. В соответствии с видовым разнообразием *Chlorophyta* водоёмов в регионе выделяются три территориальные единицы: 1) северная – Старобельская склоно-возвышенностная область, 2) центральная – Западно-Донецкая склоно-возвышенностная, Донецкая возвышенностная и Приазовская возвышенностная области, 3) южная – Приазовская низменностная область.

Для разнообразия *Chlorophyta* водоёмов Донецко-Приазовской Степи характерна значительная географическая дифференциация, что проявляется в гетерогенности видового состава разных физико-географических областей. Основу связей формируют широко распространённые виды-убикисты из семейств *Selenastraceae* и *Scenedesmaceae*. Наиболее близким является богатство зелёных водорослей Старобельской склоно-возвышенностной, Западно-Донецкой склоно-возвышенностной и Донецкой возвышенностной областей. Связь между разнообразием *Chlorophyta* Старобельской склоно-возвышенностной и Приазовской возвышенностной областей является не-прямой и обеспечивается через водоёмы Западно-Донецкой склоно-возвышенностной области.

Разнообразие *Chlorophyta* водоёмов Донецко-Приазовской Степи характеризуется рефтиональным типом распределения, что связано со значительной антропогенной фрагментированностью экосистем региона. Наибольшее количество видов на единицу площади обнаружено в пределах пойменных водоёмов средней части р. Сиверский Донец (57,5% всего видового разнообразия региона), данную территорию следует рассматривать как потенциальный альгорезерват.

Согласно типам водоёмов, видовое богатство *Chlorophyta* Донецко-Приазовской Степи увеличивается в следующем направлении: текучие эфемерные → стоячие эфемерные → текучие постоянные → проточные постоянные → стоячие постоянные. Согласно интенсивности движения водных масс и периоду существования водоёмов, количество видов *Chlorophyta* возрастает с увеличением их застойности и увеличением периода существования. Разнообразие зелёных водорослей искусственно созданных водоёмов, как правило, ниже, чем естественных, что является следствием отсутствия

исторически устойчивых экологических ассоциативных связей между видами, населяющими экотоп. Уменьшение богатства *Chlorophyta* водоёмов региона больше зависит от уничтожения биотопов, чем от частичного их загрязнения.

Водоёмы Донецко-Приазовской Степи характеризуются высокой самобытностью богатства *Chlorophyta* по отношению к водоёмам других территорий Степной зоны Украины, что проявляется на внутривидовом и видовом уровнях. На родовом уровне эта специфика нивелируется, что обусловлено подобием климатических условий и однотипностью водоёмов. Наиболее близкой по внутривидовому составу зелёных водорослей для региона исследований является западная часть Северостепной подзоны, наиболее удалённой – Сухостепная подзона. Связи разнообразия зелёных водорослей разных подзон Степной зоны Украины формируются за счёт широко распространённых видов-убийц (семейства *Selenastraceae*, *Scenedesmaceae*, частично *Desmidiaceae* и *Ulvaceae*) текучих и проточных водоёмов. Высокий уровень гетерогенности внутривидового состава *Chlorophyta* региона исследований и других территорий Степной зоны Украины характерен для стоячих водоёмов.

O.A. Petlovany

N.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sciences of Ukraine,
2, Tereshchenkovska St., 01001, Kiev, Ukraine
E-mail: algae@botany.kiev.ua

CHARACTERISTICS OF CHLOROPHYTA OF WATER BODIES OF DONETSKO-PRIAZOVSKY STEPPE (UKRAINE)

Diversity of *Chlorophyta* of the water bodies of Donetsk-Priazovsky Steppe and its peculiarities are discussed. Totally 541 species (607 infraspecies taxa) belonging to 164 genera, 55 families, 22 orders and 8 classes were revealed. Such classes as *Chlorophyceae*, *Zygnematophyceae*, *Trebouxiophyceae* form main part of the diversity of *Chlorophyta* of studied region. Decrease of species richness of *Chlorophyta* in water bodies of the region from north to south was registered. Peculiarities of infraspecies composition of *Chlorophyta* of different types of water bodies are analyzed. Flood-lands of the Siversky Donets is the centre of diversity of green algae of the studied area. Sufficient geographical differentiation of *Chlorophyta* of different physiographical regions of Donetsk-Priazovsky Steppe is shown. Connections of *Chlorophyta* of the water bodies of Donetsk-Priazovsky Steppe with those of Steppe zone of Ukraine are demonstrated. 32 species (41 infraspecies taxa) are first cited for Ukraine, and 107 (126) are new for Steppe zone of Ukraine.

Keywords: algae, *Chlorophyta*, water bodies, Donetsk-Priazovsky Steppe, diversity.

Атлас України. Вєрсія 1.0 // Ін-т географії НАН України, 1999-2000, інтелектуальні системи ГЕО, 1999-2000. (Компакт-диск).

Водорости. Справочник / С.П. Вассер, Н.В. Кондратьева, Н.П. Масюк и др.; Отв. ред. С.П. Вассер – К.: Наук. думка, 1989. – 608 с.

Географічна енциклопедія України: в 3-х т. / Відп. ред. О.М. Маренич. – К.: УРЕ, 1989–1993. – Т. 1–3.

Голлербах М.М., Красавича Л.К. Харовы водоросли – *Charophyta* // Опред. пресновод. водорослей СССР. Вып. 14. – Л.: Наука, 1983. – 190 с.

Голлербах М.М., Паламар-Мордвинцева Г.М. Харовы водоросли (*Charophyta*) // Визн. пресновод. водорослей України. Т. 9. – К.: Наук. думка, 1991. – 196 с.

- Галлербах М.М., Соболюкова Н.В. Зелёные водоросли: Сифонокладовые // Зелёные водоросли – *Chlorophyta*, красные водоросли – *Rhodophyta*, бурые водоросли – *Phaeophyta* // Опред. пресновод. водорослей СССР. Вып. 13. – Л.: Наука, 1980. – С. 89.
- Дополнение к "Разнообразию водорослей Украины" / П.М. Царенко, О.А. Петлеванний. – К.: Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного НАНУ, 2001. – 130 с. (Альгология / Supplement)
- Косинская Е.К. Конъюгаты, или спицлянки. I. Мезотениевые и гонатозиговые водоросли // Флора спор. раст. СССР. Т. 2. – М.;Л: Изд-во АН СССР, 1952. – 163 с.
- Косинская Е.К. Конъюгаты, или спицлянки. II. Десмидиевые водоросли // Флора спор. раст. СССР. Т. 5, вып. 1. – М.;Л: Изд-во АН СССР, 1960. – 706 с.
- Масюк Н.П. Морфология, систематика, экология, географическое распространение рода *Duriellia* Teod. – К.: Наук. думка, 1973. – 244 с.
- Мошкова Н.О. Улотриковые водоросли – *Ulotrichales*. Кладофоровые водоросли – *Cladophorales* // Визн. прісновод. водоростей Української РСР. Т. 6. – К.: Наук. думка, 1979. – 500 с.
- Паламар-Мордвинцева Г.М. Конъюгаты – *Conjugatophyceae*. Ч. I. Мезотениевые – *Mesotentiales*, гонатозиговые – *Gonatozygales*, десмидовые – *Desmidiales* // Визн. прісновод. водоростей Української РСР. Т. 8. – К.: Наук. думка. – 1984. – 510 с.
- Паламар-Мордвинцева Г.М. Конъюгаты – *Conjugatophyceae*. Ч. 2. Десмидовые – *Desmidiales* // Визн. прісновод. водоростей Української РСР. Т. 8. – К.: Наук. думка, 1986. – 320 с.
- Паламар-Мордвинцева Г.М. Зелёные водоросли. Класс Конъюгаты. Порядок Десмидиевые. – *Chlorophyta*. *Conjugatophyceae. Desmidiales* // Опред. пресновод. водорослей СССР. Вып. II. Ч. 2. – Л.: Наука, 1982. – 483 с.
- Петлеванний О.А. Систематическое разнообразие водорослей заповедников Донецко-Приазовской Степи (Украина) // Тез. докл. II Междунар. конф. "Актуальные проблемы современной альгологии" (Киев, май 1999 г.) // Альгология. – 1999. – № 2. – С. 113-114.
- Петлеванний О.А. Новые виды водорослей для заповедных территорий Донецко-Приазовской Степи // Там же. – 2000. – № 2. – С. 201-206.
- Петлеванний О.А. *Chlorophyta* Украинского степного природного заповедника. Отделение "Каменные Могилы" // Там же. – 2001а. – № 2. – С. 236-249.
- Петлеванний О.А. Екологіческі коридори Донецко-Приазовської Степі як фактор разнообразия *Chlorophyta* регіона // 36. доп. "Екологічні проблеми водних екосистем та забезпечення безпеки життєдіяльності на водному транспорті" (Одеса, 22-23 травня 2001 р.). – Одеса, 2001б. – С. 92-95.
- Петлеванний О.А. *Chlorophyta* солёных озёр Азовского побережья (Донецко-Приазовская Степь) // Тез. конф. молодых учёных "Проблемы экологии Азово-Черноморского бассейна: современное состояние и прогноз" (Севастополь, 18-20 сентября 2001 г.). – Севастополь, 2001в. – С. 68-69.
- Петлеванний О.А. *Chlorophyta* Украинского степного природного заповедника. Отделение Меловая Флора // Альгология. – 2003. – № 1. – С. 55-69.
- Петлеванний О.А. *Chlorophyta* Украинского степного природного заповедника. Отделение Хомутовская степь // Альгология. – 2004. – № 2. – С. 194-210.
- Петлеванний О.А. *Chlorophyta* Pascher поименных озёр реки Северский Донец // Мат. III Междунар. конф. "Актуальные проблемы современной альгологии" (Харьков, 20-23 апреля 2005 г.). – Харьков, 2005а. – С. 120-121.
- Петлеванний О.А. *Chlorophyta* Pascher континентальных водоёмов Донецко-Приазовской Степи // Мат. III Междунар. конф. "Актуальные проблемы современной альгологии" (Харьков, 20-23 апреля 2005 г.). – Харьков, 2005б. – С. 121-122.
- Петлеванний О.А., Леванец А.А., Царенко П.М. Современное состояние изученности *Chlorophyta* заповедников Украины // Тр. Междунар. конф. "Микология и криптогамная ботаника в России: традиции и

- современность" (Санкт-Петербург, 24-28 апреля 2000 г.). – СПб: Изд-во Санкт-Петербургской гос. хим.-фарм. акад., 2000а. – С. 455-456.
- Петлькованай О.А., Царенко П.М., Леванец А.А. *Chlorophyta* заповедников Украины // Альгология. – 2000б. – 10, № 3. – С. 282-304.
- Петлькованай О.А. Різноманіття водоростей водойм заповідників "Провальський степ" і "Хомутувський степ" // Мат. конф. молодих вчених-ботаніків України "Актуальні питання ботаніки та екології" (Ніжин, 14-17 вересня 1999 р.). – Ніжин, 1999. – С. 53-54.
- Петлькованай О.А. *Chlorophyta* Луганського природного заповідника (Україна) // Мат. конф. молодих вчених-ботаніків України "Актуальні проблеми ботаніки та екології" (Чернігів, Седів, 13-16 вересня 2000 р.). – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2000. – С. 19-20.
- Петлькованай О.А. *Chlorophyta* солоних озер Донецько-Приазовського Степу // Укр. бот. журн. – 2001а. – 58, № 5. – С. 583-593.
- Петлькованай О.А. *Chlorophyta* еталонних екосистем Степу України: "Кам'яні Могили" (Український степовий природний заповідник) // Мат. конф. молодих учених-ботаніків України "Актуальні проблеми ботаніки та екології" (смт. Зноб-Новгородське, 20-23 серпня 2001 р.). – Ніжин, 2001б. – С. 20-21.
- Петлькованай О.А. *Chlorophyta* еталонних екосистем Степу України: Крейдове Флора (Український степовий природний заповідник) // Мат. конф. молодих вчених-ботаніків України "Актуальні проблеми флористики, систематики, екології та збереження фіторізноманіття" (Львів, Івано-Франково, 6-10 серпня 2002 р.). – Львів, 2002. – С. 36-39.
- Петлькованай О.А. *Chlorophyta* континентальних водойм Донецько-Приазовського Степу // Мат. конф. молодих вчених-ботаніків "Актуальні питання ботаніки та екології" (Канів, 7-10 вересня 2004 р.). – Кам'янець-Подільський, 2004. – Вип. 9. – С. 22-24.
- Петлькованай О.А. *Chlorophyta* Сіверсько-Донецького скородору // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. – 2005а. – Сер. Біологія (спец. вип. "Гідроекологія"), № 3 (26). – С. 350-353.
- Петлькованай О.А. *Chlorophyta* Приазовської низовинної фізико-географічної області // Тез. конф. молодих учених "Проблемы экологии Азово-Черноморского бассейна: современное состояние и прогноз" (Севастополь, 24-27 мая 2005 г.). – Севастополь, 2005б. – С. 115-117.
- Петлькованай О.А. *Chlorophyta* водойм Луганського природного заповідника: відділення Ставичино-Луганське // Мат. конф. молодих учених-ботаніків "Актуальні проблеми дослідження та збереження фіторізноманіття" (Умань, 6-9 вересня 2005 р.). – К.: Укр. фітосоціол. центр, 2005в. – С. 34-35.
- Петлькованай О.А. *Chlorophyta* водойм Луганського природного заповідника: відділення Стрільцівський степ // Мат. конф. молодих учених-ботаніків "Актуальні проблеми дослідження та збереження фіторізноманіття" (Умань, 6-9 вересня 2005 р.). – К.: Укр. фітосоціол. центр, 2005г. – С. 36-37.
- Петлькованай О.А. *Chlorophyta* водойм Луганського природного заповідника: відділення Провальський степ // Мат. конф. молодих учених-ботаніків "Актуальні проблеми дослідження та збереження фіторізноманіття" (Умань, 6-9 вересня 2005 р.). – К.: Укр. фітосоціол. центр, 2005д. – С. 37-38.
- Петлькованай О.А. Основні риси *Chlorophyta* водойм Донецько-Приазовського Степу // Зб. мат. I Міжнар. конф. молодих вчених "Сучасні проблеми екології" (Запоріжжя, 28-30 вересня 2005 р.). – Запоріжжя, 2005е. – С. 246-249.
- Разнообразие водорослей Украины / Е.В. Борисова, Л.Н. Бухтирова, С.П. Вассер и др.; Под. ред. С.П. Вассера, П.М. Царенко // Альгология. – 2000. – 10, № 4. – 350 с.
- Рундина Л.О. Коньюгати – *Conjugatophyceae*. Ч. 3. Зигнемові – *Zygnetales* // Визн. прісновод. водоростей Української РСР. Т. 8. – К.: Наук. думка, 1988. – 202 с.
- Рундина Л.А. Зигнемовые водоросли России. – СПб: Наука, 1998. – 351 с.
- Семкин Б.И., Комарова Т.А. Анализ фитоценотических описаний с использованием мер включения // Бот. журн. – 1977. – 62, № 1. – С. 54-63.
- Толмачёв А.И. Введение в географию растений. – Л.: Изд-во Ленинград. гос. ун-та, 1974. – 244 с.

- Толмачев А.И. Методы сравнительной флористики и проблемы флорогенеза. – Новосибирск: Наука, 1986. – 197 с.
- Царенко П.М., Паламарь-Мордовецева Г.М., Вассер С.П. Районообразие водорослей Украины (предварительные данные) // Альгология. – 1998. – 8, № 3. – С. 227-241.
- Царенко П.М. Краткий определитель хлорококковых водорослей Української СРР. – К.: Наук. думка, 1990. – 208 с.
- Шмидт В.М. Статистические методы в сравнительной флористике. – Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1980. – 176 с.
- Шмидт В.М. Математические методы в ботанике. – Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1984. – 288 с.
- Юнкер В.П., Мошкова Н.О. Едогонії водорості – *Oedogoniales* // Визн. прісновод. водоростей України. Т. 7. – К.: Наук. думка. – 1993. – 410 с.
- Algae of Ukraine: diversity, nomenclature, taxonomy, ecology and geography* / Eds.: P.M. Tsarenko, S.P. Wasser, E. Nevo. – Ruggell: Gantner Verlag, 2005. – Vol. 1. – 715 p.
- Autors of plant names* / Eds R.K. Brummitt & C.E. Powell. – Kew: Roy. Bot. Gardens, 2001. – 732 p.
- Bischoff H.W., Bold H.C. Phycological studies. IV. Some soil algae from Enchanted Rock and related algal species // Univ. Texas Publ. – 1963 (6318). – P. 1-95.
- Bremer K. Summary of green plant phylogeny and classification // Cladistica. – 1985. – 1. – P. 369-385.
- Coesel P.F.M. De Desmidiaceen van Nederland. Deel 4. Fam. *Desmidiaeae* (2) // Wetensch. Med. KNNV. – 1991. – 202. – 89 p.
- Coesel P.F.M. De Desmidiaceen van Nederland. Deel 5. Fam. *Desmidiaeae* (3) // Wetensch. Med. KNNV. – 1994. – 210. – 55 p.
- Coesel P.F.M. De Desmidiaceen van Nederland. Deel 6. Fam. *Desmidiaeae* (4) // Wetensch. Med. KNNV. – 1997. – 220. – 95 p.
- Ettl H. *Chlorophyta I. Phytonadina* // Süßwasserflora von Mitteleuropa. – Jena: G. Fischer, 1983. – Bd. 9. – 807 S.
- Ettl H., Gärtnер G. *Chlorophyta II. Tetrasporales, Chlorococcales, Gloeodendrales* // Süßwasserflora von Mitteleuropa. – Jena: G. Fischer, 1988. – Bd. 10. – 437 S.
- Flora of New Zealand. Freshwater algae, *Chlorophyta*, desmids: with ecological comments on their habitats. Vol. 1 / H. Croasdale, E.A. Flint. – Wellington: Govt. Print., 1986. – 133 p. + 27 plates.
- Flora of New Zealand. Freshwater algae, *Chlorophyta*, desmids: with ecological comments on their habitats. Vol. 2 / H. Croasdale, E.A. Flint. – Christchurch: DSIR, Bot. Divis., 1988. – 147 p. + 34 plates.
- Flora of New Zealand. Freshwater algae, *Chlorophyta*, desmids: with ecological comments on their habitats. Vol. 3 / H. Croasdale, E.A. Flint, M.M. Racine. – Lincoln (N.Z.): Manaaki Whenua Press, 1994. – 218 p. + 85 plates.
- Förster K. *Conjugatophyceae, Zygnematales and Desmidiales* (excl. *Zygnemataceae*) // Die Binnengewässer. – Stuttgart: Schweizerbart, 1982. – Tl. 8 (1). – 543 S.
- Friedl T. Inferring taxonomic position and testing genus level assignments in coccoid green lichen algae: a phylogenetic analysis of 18S ribosomal RNA sequences from *Dictyochloropsis reticulata* and from members of the genus *Myrmecia* (*Chlorophyta, Trebouxiophyceae* cl. nov.) // J. Phycol. – 1995. – 31. – P. 632-639.
- Friedl T. Evolution of the polyphyletic genus *Pleurostaurum* (*Chlorophyta*): inferences from nuclear-encoded ribosomal DNA sequences and motile cell ultrastructure // Phycologia. – 1996. – 35. – P. 456-459.
- Hegewald E., An S.S., Schnepp E., Tsarenko P. Taxonomy and cell wall ultrastructure of *Scenedesmus hirsutus* (*Chlorophyta, Chlorococcales*) // Algol. Stud. – 1998. – 91. – P. 11-25.
- Hegewald E., Tsarenko P. *Desmactractum spryi*, (*Chlorophyceae, Trebariaceae*) neu für Deutschland und die Ukraine // Ibid. – 89. – S. 15-22.
- Hindák F. Studies on the chlorococcal algae (*Chlorophyceae*). III // Biol. Práce. – 1984. – 30, N 1. – 308 p.
- Hindák F. Studies on the chlorococcal algae (*Chlorophyceae*). IV // Ibid. – 1988. – 34, N 1-2. – 263 p.
- Hoek C. van den. Revision of the European species of *Cladophora*. – Lieden: E.J. Brill, 1963. – 1 + 248 p. + 55 tabs.
- Hoek C. van den. A taxonomic revision of the American species of *Cladophora* (*Chlorophyceae*) in the North Atlantic Ocean and their geographic distribution. – Amsterdam, etc.: N.-Holland Publ., 1982. – 235 p.

- Hoek C. van den, Stam W.T., Olsen J.L. The Chlorophyta: Systematics and phylogeny // Phylogenetic changes in peroxisomes of algae. Phylogeny of plant peroxisomes / Ed. H. Stabenau. – Oldenburg: Univ. Oldenburg, 1992. – P. 330–368.
- Hoek C. van den, Mann D.G., Johns H.M. Algae: an introduction to phycology. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1995. – 623 p.
- Kadlubowska J.Z. Zygnemaceae, Chlorophyta V. Conjugales // Flora Śląsko-dawna Polski. – T. 12A. – Krakow: PWN, 1972. – 431 s.
- Kolkwitz R., Krieger H. Zygnemales // L. Rabenhorst. Kryptogamen-Flora von Deutschland, Österreich u. d. Schweiz. – Leipzig, 1941. – Bd. 13, Abt. 2, Lfg. 1-3. – S. 1-294.
- Kolkwitz R., Krieger H. Zygnemales // L. Rabenhorst. Kryptogamen-Flora von Deutschland, Österreich u. d. Schweiz. – Leipzig, 1944. – Bd. 13, Abt. 2, Lfg. 4. – S. 295-499.
- Komárek J., Fott B. Chlorophyceae (Grünalgen). Ordnung: Chlorococcales // Die Binnengewässer. – Stuttgart: Schweizerbart, 1983. – Bd. 16, Tl. 7. – 1044 S.
- Krieger W., Gerloff J. Die Gattung *Cosmarium*. Lief. 1. – Weinheim: J. Cramer, 1962. – S. 1-112.
- Krieger W., Gerloff J. Die Gattung *Cosmarium*. Lief. 2. – Weinheim: J. Cramer, 1965. – S. 113-240.
- Krieger W., Gerloff J. Die Gattung *Cosmarium*. Lief. 3-4. – Weinheim: J. Cramer, 1969. – S. 241-410.
- Mrozińska T. Chlorophyta VI. Oedogoniophyceae: Oedogoniales // Süßwasserflora von Mitteleuropa. – Jena: G. Fischer, 1985. – Bd. 14. – 624 S.
- Norton T.A., Melkonian M., Andersen R.A. Algal biodiversity // Phycologia. – 1996. – 35, N 4. – P. 308–326.
- Petlovany O., Tsarenko P., Levantes A. Diversity of freshwater green algae in reserves of Ukraine // 11th Hungarian algol. meet. (Salgóbaranya, 16-19 May 2000). – P. – 37.
- Prescott G.W., Bicudo C.E. de M., Vinyard W.C. A Synopsis of North American Desmids. Pt. 2. Desmidiaeae: Placoderme. Sect. 4. – Lincoln; London: Univ. Nebraska Press, 1982. – 700 p.
- Prescott G.W., Croasdale H.T., Vinyard W.C. A Synopsis of North American Desmids. Pt. 2. Desmidiaeae: Placoderme. Sect. 2. – Lincoln; London: Univ. Nebraska Press, 1977. – 413 p.
- Prescott G.W., Croasdale H.T., Vinyard W.C., Bicudo C.E. de M. A Synopsis of North American Desmids. Pt. 2. Desmidiaeae: Placoderme. Sect. 3. – Lincoln; London: Univ. Nebraska Press, 1981. – 720 p.
- Round F.E. The taxonomy of the Chlorophyta // Brit. Phycol. Bull. – 1963. – 2. – P. 224-235.
- Starmach K. Chlorophyta III. Zielenice nitkowate: Ulothrichales, Ulvales, Prasiolales, Sphaeropleales, Cladophorales, Chaetophorales, Trentepohloales, Siphonales, Dichatomosiphonales // Flora Śląsko-dawna Polski. – Warszawa; Krakow: Państw. Wydaw. Nauk., 1972. – T. 10. – 750 s.
- Transeau E.N. The Zygnemataceae (Fresh water conjugate algae). – Columbus: Ohio St. Univ. Press, 1951. – 327 p.

Получена 28.11.05

Подписан в печать П.М. Царенко