

RESEARCH RESULTS CONCERNING OF ATTITUDE TO GAMBLING THE YOUNG AGE PEOPLE

E.S. Osuhovskaya

The paper presents data on socio-demographic characteristics and learning behavior in youth gaming Ukraine age 17 to 25 years, students of higher educational institutions of technical and humanitarian profiles were obtained for the first time. Shown that the highest rates of participation in games associated with games that require financial costs. The results of the study of attitudes of students to the Internet, time on the Internet. Filed facts that characterize the official status of the gambling business in Ukraine.

Keywords: video game addiction, game addiction, gambling, ludomaniya, diagnostic, non-chemical addiction

УДК 616.895.8

С.И. Табачников, Е.Н. Харченко, И.И. Марценковская, Т.В. Синицкая
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕДИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ У ЛИЦ ПОДРОСТКОВОГО И МОЛОДОГО ВОЗРАСТА В
УКРАИНЕ

Украинский НИИ социальной, судебной психиатрии и наркологии МЗ Украины, г. Киев

Ключевые слова: алкогольная зависимость, подростковый, молодой возраст, сравнительная характеристика

Проблема алкогольной зависимости среди населения разных стран мира, в том числе, и в Украине – является одной из наиболее значимых в медико-социальном плане [3-5]. К сожалению, Украина в этом отношении входит в число стран с достаточно высокими показателями потребления алкоголя на душу населения. Согласно последним данным ВОЗ один украинец в среднем потребляет 15,6 литра чистого алкоголя (спирта в год). Это – пятое место после Молдовы (18,22 л), Чехии (16,45 л), Венгрии (16,27) и России (15,76) [12-17]. В связи со сложившейся неблагоприятной ситуацией в этом плане в стране особую значимость приобретает формирования алкогольной зависимости среди лиц подросткового и молодого возраста, – как будущего основного контингента трудоспособного населения страны.

Согласно тем же данным ВОЗ среди подростков 13-15 лет алкоголь употребляют около 90 %, при этом количество пьющих девушек-подростков за последний год увеличилось вдвое. Согласно данным опроса средний возраст начала употребления алкоголя среди мальчиков снизился до 12,5 лет, девочек – до 12,9. Выпивка стала одним из символов объединения подростков или молодых людей в неформальные группы, обязательным условием признания любого из ее членов. Следует отметить, что на начальных этапах среди алкогольных напитков юноши и девушки предпочитают употреблять относительно легкие алкогольные напитки (преимущественно крепкие сорта пива, джин-тоник или реже другие спиртосодержащие коктейли) [1]. Регулярность употребления алкогольных напитков у большинства достаточно частая (ежедневно или через день). При этом сами подростки не осознают всей серьезности и пагубности своих действий, считают подобное поведение «современным стилем жизни», «модным» и «общепринятым». Поэтому и возможные меры коррекции

медико-социального характера, проводимые в юном возрасте не являются эффективными. В тоже время даже эпизодическое употребление алкоголя в юном возрасте – носит чрезвычайно негативный характер, т.к. еще не сформировалась психофизиологическая устойчивость организма на воздействие спиртосодержащих веществ. В результате практически любое количество и частота употребления алкоголя нарушает состояние психики подростка, поведение, взаимоотношение с окружающими (близкими), сказывается негативно на учебе, а не редко приводит к различным правонарушениям [9]. Наиболее актуальной проблемой в юном возрасте является ранняя алкоголизация, которая и приводит к формированию алкогольной зависимости в возрасте 20-22 лет. Систематическое употребление алкоголя (на стадии пьянства) среди несовершеннолетних тесно связано с их отклоняющимся поведением. В основе этой связи лежит самая главная для подростков опасность алкоголизма – ослабление самоконтроля. Наиболее часто в состоянии опьянения совершаются насильственные преступления. Также молодые люди с большей вероятностью могут стать участниками (активными или пассивными) дорожно-транспортных происшествий или получить непреднамеренную травму в состоянии алкогольного опьянения. По данным статистики только в Киеве в 2008 году подростками в состоянии опьянения совершено 110 преступлений и число подобных случаев, к сожалению, растет.

Исходя из вышеизложенного становится очевидной актуальность возникновения, формирования и динамики алкогольной зависимости среди лиц подросткового и молодого возраста [1].

Цель нашей работы – медико-социологические особенности характеристики формирования алкогольной зависимости у лиц подросткового и молодого возраста в Украине.

Задачи исследования:

1. Рассмотреть количественные характеристики распространенности алкогольной зависимости среди лиц подросткового и молодого возраста в Украине.

2. Провести сравнение ряда параметров алкогольной зависимости (непсихотических и психотических вариантов) лиц подросткового и молодого возраста.

3. Выявить особенности характеристик алкогольной зависимости у указанных групп соответственно регионам Украины.

Для проведения работы нами были взяты 2 осново-

полагающие группы лиц с алкогольной зависимостью: 1 – подростки в возрасте 0-17лет, 2 – молодые люди в возрасте 15-35 лет. В исследовании мы использовали статистические данные МЗ Украины по распространенности алкогольной зависимости среди лиц молодого возраста в Украине за 2008-2010 гг. по разным регионам страны в расчете абсолютных чисел и, соответственно, количество лиц с данной патологией на 100 тыс. населения. Полученные данные представлены следующими таблицами.

Таблица 1

Заболееваемость хроническими алкогольными синдромами (хроническим алкоголизмом) подросткового в возрасте 0-17лет включительно населения Украины за 2008 - 2010 года

№ п/п	Административные территории	Абсолютные числа			На 100 тысяч населения		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
1	А Р Крым	3	4	3	0,9	1,18	0,89
2	Винницкая	0	2	0	0	0,64	0
3	Волынская	0	0	0	0	0,00	0
4	Днепропетровская	1	1	3	0,2	0,18	0,53
5	Донецкая	7	5	2	1,0	0,73	0,30
6	Житомирская	2	1	0	0,8	0,39	0
7	Закарпатская	0	0	1	0	0,00	0,35
8	Запорожская	3	4	2	1,0	1,34	0,68
9	Ивано-Франковская	0	0	0	0	0,00	0
10	Киевская	0	1	1	0	0,32	0,33
11	Кировоградская	1	0	1	0,5	0,00	0,56
12	Луганская	5	7	3	1,4	1,98	0,87
13	Львовская	8	3	2	1,6	0,59	0,40
14	Николаевская	3	1	0	1,4	0,46	0
15	Одесская	0	0	1	0	0,00	0,23
16	Полтавская	0	0	1	0	0,00	0,41
17	Ровенская	0	0	1	0	0,00	0,37
18	Сумская	2	3	1	1,0	1,57	0,54
19	Тернопольская	0	0	0	0	0,00	0
20	Харьковская	4	6	6	0,9	1,41	1,43
21	Херсонская	0	1	0	0	0,49	0
22	Хмельницкая	4	2	2	1,5	0,79	0,80
23	Черкаская	3	0	0	1,3	0,00	0
24	Черновецкая	0	0	0	0	0,00	0
25	Черниговская	0	1	2	0	0,56	1,14
26	г.Киев	1	0	0	0,2	0,00	0
27	г.Севастополь	1	1	0	1,7	1,68	0
Украина		48	43	32	0.6	0.53	0,40

Как видно из табл.1 количество лиц с алкогольной зависимостью (вновь выявленные) на протяжении 2008-2010 гг. в расчете на 100 тыс. населения составило соответственно 0,6; 0,53; 0,40. При этом наибольшими оказались показатели в Харьковской области –

1,43; Черниговской – 1,14; далее в Крыму – 0,89; Луганской области – 0,87 и пр.

Характеристика распространенности алкогольной зависимости среди лиц подросткового возраста представлена в таблице №2.

Таблица 2

Распространенность хронических алкогольных расстройств (хронического алкоголизма) подросткового населения в возрасте 0-17лет включительно за 2008 - 2010 года

№ п/п	Административные территории	Абсолютные числа			На 100 тысяч детского населения		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
1	А Р Крым	6	5	1	1,8	1,5	0,30
2	Винницкая	0	2	1	0	0,6	0,33
3	Волынская	1	0	0	0,4	0,0	0,00
4	Днепропетровская	5	2	3	0,9	0,4	0,53
5	Донецкая	9	10	4	1,3	1,5	0,59
6	Житомирская	2	1	0	0,8	0,4	0,00
7	Закарпатская	0	0	1	0	0,0	0,35
8	Запорожская	2	2	2	0,7	0,7	0,68
9	Ивано-Франковская	0	0	0	0	0,0	0,00
10	Киевская	0	1	2	0	0,3	0,65
11	Кировоградская	0	0	2	0	0,0	1,12
12	Луганская	7	8	4	1,9	2,3	1,16
13	Львовская	10	9	2	2,0	1,8	0,40
14	Николаевская	1	2	0	0,5	0,9	0,00
15	Одесская	0	0	1	0	0,0	0,23
16	Полтавская	0	0	1	0	0,0	0,41
17	Ровенская	1	0	0	0,4	0,0	0,00
18	Сумская	1	3	2	0,5	1,6	1,07
19	Тернопольская	0	0	0	0	0,0	0,00
20	Харьковская	6	8	7	1,4	1,9	1,67
21	Херсонская	0	1	1	0	0,5	0,49
22	Хмельницкая	4	5	3	1,5	2,0	1,20
23	Черкасская	4	0	0	1,7	0,0	0,00
24	Черновецкая	0	0	0	0	0,0	0,00
25	Черниговская	0	1	2	0	0,6	1,14
26	г.Киев	0	0	0	0	0,0	0,00
27	г.Севастополь	1	5	0	1,7	3,4	0,00
Украина		60	65	39	0,7	0,8	0,48

Как видно из таблицы в расчете на 100 тыс. населения количество больных составило соответственно 2008-2009-2010 гг. 0,7; 0,8; 0,48. Наибольшие показатели наблюдались в Харьковской (1,67); Луганской (1,16); Хмельницкой (1,20); Черниговской (1,14);

Кировоградской (1,12) и т.д. То есть, проявлялось определенное соответствие изучаемых характеристик в первой и второй таблицах по выявлению и распространенности случаев заболевания алкоголизма у подростков.

Характеристика возникновения психотических расстройств в исследуемой группе представлена в таблице №3.

Рассматривая возникновение психотических расстройств алкогольного генеза в исследуемой группе подростков, мы выявили следующее.

Таблица 3

Распространенность острых психотических алкогольных расстройств (алкогольных психозов) подросткового населения Украины в возрасте 0-17 лет включительно за 2008 - 2010 года

№ п/п	Административные территории	Абсолютные числа			На 100 тысяч детского населения		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
1	А Р Крым	0	0	0	0	0	0
2	Винницкая	0	0	0	0	0	0
3	Волынская	0	0	0	0	0	0
4	Днепропетровская	0	0	0	0	0	0
5	Донецкая	0	0	1	0	0	0,15
6	Житомирская	0	0	0	0	0	0
7	Закарпатская	0	0	0	0	0	0
8	Запорожская	0	0	0	0	0	0
9	Ивано-Франковская	0	0	0	0	0	0
10	Киевская	0	0	0	0	0	0
11	Кировоградская	0	0	0	0	0	0
12	Луганская	0	0	0	0	0	0
13	Львовская	0	0	0	0	0	0
14	Николаевская	0	0	0	0	0	0
15	Одесская	0	0	0	0	0	0
16	Полтавская	0	0	0	0	0	0
17	Ровенская	0	0	0	0	0	0
18	Сумская	0	0	0	0	0	0
19	Тернопольская	0	0	0	0	0	0
20	Харьковская	0	0	0	0	0	0
21	Херсонская	0	0	0	0	0	0
22	Хмельницкая	0	0	0	0	0	0
23	Черкаская	0	0	0	0	0	0
24	Черновецкая	0	0	0	0	0	0
25	Черниговская	0	0	0	0	0	0
26	г.Киев	0	0	0	0	0	0
27	г.Севастополь	0	0	0	0	0	0
Украина		0	0	1	0	0	0,01

Общее число алкогольных психозов в данной группе было незначительным, что говорит о преимуществе распространенности в подростковом периоде непсихотических вариантов алкогольной зависимости в силу достаточно раннего возраста.

В параллельной группе исследуемых лиц молодого (15-35 лет) возраста характеристика изучаемых данных выглядела следующим образом. В представленной таблице 4 виден значительный объем больных с алкогольной зависимостью по Украине (с тенденцией к выраженному росту).

Таблиця 4

**Распространенность хронических алкогольных расстройств (хронического алкоголизма)
среди молодежи в возрасте 15-35 лет в Украине за 2008 – 2010 года**

№ п/п	Административные территории	Абсолютные числа			На 100 тысяч соответствующего населения		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
1	А Р Крым	4711	4201	3387	791,6	712,5	581,68
2	Винницкая	6287	5683	5 692	1334,0	1218,1	1233,98
3	Волынская	2391	2773	2 811	743,8	865,2	882,08
4	Днепропетровская	8773	9900	9 945	855,8	979,3	1000,69
5	Донецкая	12787	12135	11 978	956,7	921,5	927,14
6	Житомирская	5251	5162	5 330	1393,9	1383,4	1444,37
7	Закарпатская	2546	2560	2 762	636,6	642,6	698,42
8	Запорожская	3788	3843	3 956	700,9	720,1	753,52
9	Ивано-Франковская	2180	2671	2 518	512,6	629,6	596,41
10	Киевская	9009	8893	8 537	1762,2	1758,2	1707,71
11	Кировоградская	2777	2884	3 000	958,4	1012,0	1068,58
12	Луганская	11150	9933	9 783	1600,0	1448,3	1452,52
13	Львовская	5414	5853	6 160	688,2	746,6	790,56
14	Николаевская	1880	2262	2 355	517,2	630,0	665,23
15	Одесская	11573	13779	13 942	1560,5	1871,8	1913,89
16	Полтавская	3518	4168	5 022	807,9	970,2	1187,76
17	Ровенская	3301	3619	3 733	918,4	1010,1	1047,26
18	Сумская	3098	3175	3 226	907,3	944,5	977,38
19	Тернопольская	3344	2586	2 562	1020,0	793,6	792,39
20	Харьковская	10096	11374	10 093	1165,9	1330,1	1201,49
21	Херсонская	2988	3141	3 018	900,5	959,5	934,67
22	Хмельницкая	5157	4936	4 964	1355,1	1307,8	1328,96
23	Черкасская	3433	3584	3 025	934,8	988,3	845,28
24	Черновецкая	2809	2857	2 912	993,0	1013,3	1036,69
25	Черниговская	3952	3614	3 291	1284,0	1187,5	1095,84
26	г.Киев	1643	1544	1 698	173,9	164,1	183,01
27	г.Севастополь	966	964	975	824,0	831,4	854,84
Украина		134822	138094	136675	966,9	1000,3	1003,08

Как видно из таблицы количество больных с данной патологией за период 2008-2010 гг., соответственно 966,9; 1000,3; 1003,08. При этом наибольшие показатели отмечались в Одесской области (1913,89); Киевской (1707,71); Луганской (1452,52); Житомирской

(1444,37); Хмельницкой (1328,96); и Харьковской (1201,49). Характеристика данных количества вновь выявленных больных с алкогольной зависимостью в исследуемой группе отражена в таблице №5.

Таблиця 5

**Заболеваемость хроническими алкогольными синдромами (хронический алкоголизм)
среди молодежи в возрасте 15-35 лет в Украине за 2008 – 2010 года**

№ п/п	Административные территории	Абсолютные числа			На 100 тысяч соответствующего населения		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
1	А Р Крым	636	440	361	106,9	74,6	62,00
2	Винницкая	623	500	477	132,2	107,2	103,41
3	Волынская	325	275	284	101,1	85,8	89,12
4	Днепропетровская	1237	1 195	1 327	120,7	118,2	133,53
5	Донецкая	1236	983	888	92,5	74,6	68,73
6	Житомирская	839	646	474	222,7	173,1	128,45
7	Закарпатская	506	255	306	126,5	64,0	77,38
8	Запорожская	485	519	390	89,7	97,2	74,29
9	Ивано-Франковская	447	394	362	105,1	92,9	85,74
10	Киевская	1483	1 253	1 133	290,1	247,7	226,64
11	Кировоградская	339	277	206	117,0	97,2	73,38
12	Луганская	1086	950	723	155,8	138,5	107,35
13	Львовская	762	579	617	96,9	73,9	79,18
14	Николаевская	383	370	317	105,4	103,1	89,54
15	Одесская	1000	782	553	134,8	106,2	75,91
16	Полтавская	464	415	470	106,6	96,6	111,16
17	Ровенская	616	551	460	171,4	153,8	129,05
18	Сумская	371	346	336	108,7	102,9	101,80
19	Тернопольская	435	353	324	132,7	108,3	100,21
20	Харьковская	812	734	503	93,8	85,8	59,88
21	Херсонская	433	322	269	130,5	98,4	83,31
22	Хмельницкая	907	741	627	238,3	196,3	167,86
23	Черкаская	481	445	283	131,0	122,7	79,08
24	Черновецкая	357	266	238	126,2	94,3	84,73
25	Черниговская	495	356	314	160,8	117,0	104,56
26	г.Киев	157	94	86	16,6	10,0	9,27
27	г.Севастополь	253	215	205	215,8	185,4	179,73
Украина		17168	14256	12533	123,1	103,3	91,98

Как видно из таблицы число вновь выявленных случаев алкогольной зависимости за изучаемый период составило в расчете на 100 тыс. населения соответственно 123,1; 103,3 и 91,98. При этом наибольшими были показатели в Киевской области (226,64); Хмельницкой (167,87); в Севастополе

(179,73); Днепропетровской (133,53); Житомирской (128,45) и областях.

Характеристика распространенности психотических расстройств за изучаемый период представлено в таблице №6.

Таблиця 6

Распространенность острых психотических алкогольных расстройств (алкогольных психозов) среди молодежи в возрасте 15-35 лет в Украине за 2008 – 2010 года

№ п/п	Административные территории	Абсолютные числа			На 100 тысяч соответствующего населения		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
1	А Р Крым	121	78	63	20,3	13,2	10,82
2	Винницкая	160	110	114	34,0	23,6	24,71
3	Волынская	164	75	60	51,0	23,4	18,83
4	Днепропетровская	35	22	16	3,4	2,2	1,61
5	Донецкая	1123	823	679	84,0	62,5	52,56
6	Житомирская	145	108	60	38,5	28,9	16,26
7	Закарпатская	116	76	39	29,0	19,1	9,86
8	Запорожская	199	152	142	36,8	28,5	27,05
9	Ивано-Франковская	187	128	108	44,0	30,2	25,58
10	Киевская	36	27	21	7,0	5,3	4,20
11	Кировоградская	72	111	117	24,9	39,0	41,67
12	Луганская	523	336	225	75,0	49,0	33,41
13	Львовская	219	118	80	27,8	15,1	10,27
14	Николаевская	132	84	55	36,3	23,4	15,54
15	Одесская	63	61	64	8,5	8,3	8,79
16	Полтавская	156	101	74	35,8	23,5	17,50
17	Ровенская	53	54	58	14,7	15,1	16,27
18	Сумская	30	34	21	7,8	10,1	6,36
19	Тернопольская	93	99	56	28,4	30,4	17,32
20	Харьковская	74	44	39	8,6	5,2	4,64
21	Херсонская	127	117	71	38,3	35,7	21,99
22	Хмельницкая	288	131	117	75,7	34,7	31,32
23	Черкасская	140	110	106	38,1	30,3	29,62
24	Черновецкая	84	75	37	29,7	26,6	13,17
25	Черниговская	162	81	54	52,6	26,6	17,98
26	г.Киев	374	236	222	39,6	25,1	23,93
27	г.Севастополь	64	45	26	54,6	38,8	22,80
Украина		4940	3436	2724	35,4	24,9	19,99

Как видно из таблицы количество алкогольных психозов за истекший период составило в расчете на 100 тыс. населения соответственно 35,4; 34,9 и 19,99. Наибольшее количество психозов наблюдалось в

Донецкой – 52,56; Кировоградской – 41,67; Луганской – 33,41; Хмельницкой – 31,32 областях, что соответствует в целом количественной распространенности лиц с алкогольной зависимостью по стране.

Полученные результаты исследования позволяют сделать следующие выводы:

1. Распространенность алкогольной зависимости в подростковом и особенно в молодом возрасте среди населения Украины имеет широкую распространенность.

2. Алкогольная зависимость в подростковом возрасте дает основу для перехода и стабилизации аналогичной в молодом возрасте, при этом наблюдается выраженная негативная динамика как количественная, так и качественная: рост общего числа больных, включая выявления новых, нарастания осложненных тяжелых форм алкоголизма (алкогольных психозов) и др.

3. За исследуемый период общие показатели алкогольной зависимости у лиц молодого возраста в сравнении с подростковом, продемонстрировали значительный рост; в частности, по данным 2010 года, соответственно 1003,08 (против 0,48) – на 100 тыс. населения; количество алкогольных психозов – 19,9 (против 0,01); число вновь выявленных больных – 91,98 (против 0,40). В абсолютных цифрах число лиц с алкогольной зависимостью 15-35 лет в 2010 году составила 136 675; подросткового возраста – 39.

Безусловно, реальные цифры употребления алкоголя среди лиц подросткового и молодого возраста значительно превосходят данные официальной статистики. Не высокие показатели могут быть связаны с низкой обращаемостью в официальных профильных учреждениях, а также несвоевременным врачебным выявлением данных расстройств.

4. Принимая во внимание значительное количество больных с алкогольной зависимостью указанного возраста в Украине, следует усилить медико-социальные меры по коррекции и профилактике в области данной патологии – проведение в учебных заведениях и молодежной среде соответствующие противоалкогольные информационные пропаганды (усилиями педагогов, психологов, социальных работников и семьи).

5. Корректировать воспитание молодого поколения в духе стремления к здоровому образу жизни; культивированию высоких моральных приоритетов; образовательному и духовному развитию личности.

6. При выявлении случаев систематического употребления алкоголя в подростковом и молодом возрасте – взятие на профилактически учет данных лиц профильными специалистами; при сформировавшейся алкогольной зависимости – комплексные меры по лечению.

Литература:

1. Егоров А.Ю. Алкоголизация и алкоголизм в подростково-молодежной среде: личностные особенности, клинические проявления, половые различия / А.Ю. Егоров // *Вопросы психического здоровья детей и подростков*. – 2006 – (3). – № 1. – С.10–16.
2. Линский И. В. Актуальные тенденции распространения зависимости от психоактивных веществ в Украине / И. В. Линский, А. И. Минко, Э. Б. Первомайский // *Наркология*. — 2005. — № 4. — С. 12–17.
3. Линский И.В. Три десятилетия зависимости от психоактивных веществ в Украине с точки зрения популяционной экологии / И. В. Линский, А. И. Минко, Э. Б. Первомайский [и др.] // *Психическое здоровье*. – Москва, 2006. – № 4. — С. 21–25.
4. Кошкина Е. А. Социальные аспекты, влияющие на приобщение подростков к употреблению психоактивных веществ / Е. А. Кошкина, К. В. Вышинский, Н. И. Павловская [и др.] // *Наркология*. — 2009. — № 10. — С. 10 —14.
5. Пинчук И. Я. Распространенность психических расстройств в Украине / И. Я. Пинчук // *Журнал АМН України*, — 2010, — т. 16, — № 1. — С. 168–176.
6. Приказ МЗ Украины от 02.06.2009г. № 382 «Об утверждении временных стандартов оказания медицинской помощи подросткам и молодежи».
7. Приказ МЗ Украины от 02.06.2009г. № 383«Об усовершенствовании организации оказания медицинской помощи подросткам и молодежи».
8. Психічне здоров'я населення України: інформаційно-аналітичний огляд за 1990–2007 рр. — К.: МОЗ України, — 2008. — 152 с.
9. Сирота Н. А. Профилактика наркомании и алкоголизма: учеб. пособие для студ. вузов / Н. А. Сирота, В. М. Ялтонский. М.: — «Академия», 2008. — 265 с.
10. Babor T, Caetano R, Casswell S, Edwards G, Giesbrecht N, Graham K, et al. *Alcohol: no ordinary commodity – research and public policy*. Oxford: Oxford University Press; 2010.
11. Bromet E.J., Gluzman S.F., Paniotto V.I., Webb C.P.M., Tittle N.L., Zakhosha V., Havenaar J.M., Gutkovich Z., Kostyuchenko S., Schwartz J.E. *Epidemiology of psychiatric and alcohol disorders in Ukraine Findings from the Ukraine World Mental Health Survey // Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol*. – 2005. – Vol. 40. – P. 681-690.
12. Bromet E. J., Havenaar J. M., Tittle N. et al. *Suicide ideation, plans and attempts in Ukraine: 13. findings from the Ukraine World Mental Health Survey // Psychol. Med*. — 2007. — 37. — P.807–819.
13. Degenhardt L, Chiu WT, Conway K, Dierker L, Glantz M, Kalaydjian A, Merikangas K, Sampson N, Swendsen J, Kessler RC. *Does the “-gateway” matter? Associations between the order of drug use initiation and the development of drug dependence in the National Comorbidity Study Replication. Psychol. Med*. 2009;39:157–167. [PMC free article] [PubMed]
14. Kessler RC, Abelson J, Demler O, Escobar JJ, Gibbon M, Guyer ME, Howes MJ, Jin R, Vega WA, Walters EE, Wang P, Zaslavsky A, Zheng H. *Clinical calibration of DSM-IV diagnoses in the World Mental Health (WMH) version of the World Health Organization (WHO) Composite International Diagnostic Interview (WMH CIDI) Int. J. Methods Psychiatr. Res*. 13:122–139. [PubMed]
15. Webb C.P.M., Bromet E.J., Gluzman S., Tittle N.L., Schwartz J.E., Kostyuchenko S., Havenaar J.M. *Epidemiology of heavy alcohol use in Ukraine. Alcohol & Alcoholism*. – 2005. – Vol. 40. – № 4. – P. 327-335.
16. WHO Expert Committee on Problems Related to Alcohol Consumption. *2nd report (WHO Technical Report Series 944)*. Geneva: World Health Organization; 2007. Available from: http://www.who.int/substance_abuse/expert_committee_alcohol_trs944.pdf [accessed 3 August 2010].
17. World Bank. 2009. *World Development Indicators Online*. Washington, DC: World Bank, Electronic version. <http://www.worldbank.org/>

**ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕДИКО-СОЦІОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ
У ОСІБ ПІДЛІТКОВОГО І МОЛОДОГО ВІКУ В УКРАЇНІ**

С.І. Табачников, Є.М. Харченко, І.І. Марценковська, Т.В. Синьська

Проведене медико-соціологічне дослідження поширеності алкогольної залежності серед підліткового та молодого населення України за 2008-2010 роки. Виявлено певні характеристики взаємозв'язку формування вікової алкогольної залежності, представлені статистичні дані, відповідні рекомендації.

Ключові слова: алкогольна залежність, підлітковий, молодий вік, порівняльна характеристика

**COMPARATIVE CHARACTERISTIC MEDICAL SOCIOLOGICAL ASPECTS OF ALCOHOL ADDICTION AMONG TEENAGERS
AND YOUNG PERSONS IN UKRAINE**

S.I. Tabachnikov, E.M. Kharchenko, I.I. Marcenkovskaya, T.V. Synitska

Medical sociological research of prevalence of alcohol addiction among teenagers and young citizens of Ukraine during 2008-2010 was made. The certain characteristics of mutual connection of age alcohol addiction forming were determined, the statistic data and appropriate recommendations are represented.

Keywords: alcohol addiction, teenagers', young age, comparative characteristic

УДК 616.895

О.М.Зінченко

**ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕНОСТІ ПСИХІЧНИХ ТА ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ,
УНАСЛІДОК ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ В УКРАЇНІ**

Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

Ключові слова: алкогольна залежність, алкогольні психози, захворюваність, поширеність, наркологічна допомога

Психічне благополуччя за визначенням ВООЗ є важливою складовою поняття здоров'я. На сьогодні психічні та поведінкові розлади, внаслідок вживання психоактивних речовин, в рейтингу соціальних проблем, що стоять перед суспільством займають третє місце після злочинності і безробіття [3, 26]. Результати епідеміологічних досліджень, проведених в багатьох країнах світу свідчать про те, що серед пацієнтів з наркологічними розладами переважають хворі алкоголізмом [1, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 24].

Так, згідно даним Міністерства охорони здоров'я і соціального розвитку в Росії у 2009 році зареєстровано 3,25 млн. хворих з психічними та поведінковими розладами, внаслідок вживання психоактивних речовин, з яких близько 81,8% (2658302) – хворі алкоголізмом, 17% (555272) - хворі наркоманією і 1,2% (37090) - пацієнти з токсикоманією [22].

Алкогольна залежність є складною медико-соціальною проблемою сучасного суспільства. Збиток від алкоголю є значним тягарем для окремих осіб, сімей, держави в цілому, і пов'язаний з медичними витратами, зниженням продуктивності праці і, як результат, - підвищенням показників захворюваності [7, 8, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 25]. Вживання алкоголю є причиною майже 2 млн. смертельних випадків і 4% хвороб у всьому світі [22].

Одним із індикаторів (складових) алкогольної ситуації як в нашій країні, так і у всьому світі, є вжиток алкоголю. За оцінками експертів ВООЗ, підвищення допустимого рівня споживання алкоголю (із розрахунку 8 л абсолютного алкоголю (безводного спирту) в

рік на душу населення) є надзвичайно небезпечним для здоров'я нації [2].

До «країн-лідерів» по кількості алкоголю, що вживається, на душу населення відносяться Росія (15,6), Ірландія (13,5), Угорщина (13,2), Франція (13,0), Чехія (12,0) [22].

Динаміка вжитку алкогольних напоїв на душу населення в Україні останніми роками свідчить про стабілізацію показника. Проте ця величина відображає лише «вжиток з державних ресурсів». В той же час за даними наукових досліджень значна питома вага при вжитку складає неврахований алкоголь.

У структурі вживаної в Україні алкогольної продукції (в перерахунку на абсолютний алкоголь) більш ніж половина припадає на горілку та міцні напої. У молодіжному середовищі починаючи з 2000 р. спостерігається щорічне збільшення споживання слабоалкогольних напоїв [14, 21].

Настільки ж значимим показником, що характеризує поширеність зловживання алкоголем серед населення, є показники захворюваності та поширеності на алкогольну залежність та алкогольні психози.

Проведений аналіз захворюваності населення України на розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю [16] свідчить про щорічні коливання показника захворюваності на хронічні алкогольні синдроми (таблиця 1).

Протягом 2000-2008 рр. захворюваність на розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю залишалася на високому рівні (2008 р. - 109,8 на 100 тис. населення). Разом з тим, в останні 2 роки наміти-