

УДК 597/599 : 630*27(477.53-25)

М.В. Слюсар

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
вул. Остроградського, 2, Полтава, 36003, Україна
Sl.n.vl2017@gmail.com

ФАУНА ХРЕБЕТНИХ ПОЛТАВСЬКОГО МІСЬКОГО ПАРКУ

Наведено оригінальні дані багаторічних фауністичних досліджень хребетних тварин Полтавського міського парку. Подається характеристика ландшафтно-екологічних умов території парку та відзначаються їх зміни протягом багатьох десятиліть спостережень. Перераховано основні біотопи, що визначають видову різноманітність фауни хребетних.

Проаналізовано літературні дані та усні повідомлення місцевих природознавців, що відбивають стан фауни даної місцевості у період до розбудови парку.

Встановлено, що у складі сучасної фауни хребетних Полтавського міського парку можна зустріти 169 видів тварин із 121 роду, 62 родин, 29 рядів та 5 класів, в тому числі риб – 9 видів, земноводних – 6 видів, плазунів – 3 види, птахів – 129 видів та ссавців – 22 види. По кожному класу складені списки видів, де вказано дані щодо особливостей поширення тварин на території парку, їх екологічної приуроченості, а для деяких видів – і відомості щодо характеру міграції, стану популяції тощо.

За екологічними особливостями вивчена фауна (окрім риб як виключно водних тварин) репрезентована представниками чотирьох фауністичних комплексів. Найбагатше представлена фауна хребетних у лісовому комплексі, що нараховує загалом 81 вид – 72 види птахів (у т.ч. 44 гніздуючих), 6 видів ссавців та 3 види земноводних. Лучно-степовий фауністичний комплекс нараховує всього 17 видів хребетних – 13 видів птахів (у т.ч. 5 гніздових), 2 види ссавців та по 1 виду амфібій і рептилій. Біляводний комплекс нараховує 32 види птахів (із них 9 гніздуючих), по 2 види земноводних і плазунів та 1 вид ссавців – разом 37 видів. Синантропний фауністичний комплекс містить у своєму складі 12 видів птахів, а також 4 види ссавців. Вагомий внесок у біологічне різноманіття парку вносять також 9 видів евритопних ссавців.

Созологічну цінність фауни Полтавського міського парку складають 2 види, занесені до Європейського Червоного списку, 11 видів – до Червоної книги України та 19 регіонально рідкісних видів.

Констатовано головні зміни фауни хребетних тварин на території Полтавського міського парку, що полягають у скороченні видового різноманіття лучно-степового фауністичного комплексу та зростанні різноманіття лісового та біляводного комплексів. Це обумовлене трансформацією місць існування на території парку від природних переважно лучно-степових угруповань до створених людиною деревних насаджень та штучних водойм.

Ключові слова: фауна хребетних, риби, земноводні, плазуни, птахи, ссавці, фауністичні комплекси, рідкісні види, Полтавський міський парк.

Автор мав можливість більш-менш регулярно спостерігати за місцевістю, яку займає зараз Полтавський міський парк, протягом майже 60 років. **Метою** даної **роботи** було вивчення фауни хребетних тварин Полтавського міського парку та її багаторічної динаміки.

У 1950-60-ті рр. тривершинна балка між селищами Яківці і Павленки, яку місцеві жителі називали Зрубом, мала цілком степовий вигляд. По її днищу протікав струмок, на якому побудовано кілька ставків. Два з них мали досить значну площину, а решта дрібні, причому, два з останніх і ставками назвати було важко – це були невеликі ковбані, але теж підперті греблями. Ставки мали змішане наповнення за рахунок джерел та талих і дощових вод.

Стосовно історії каскаду ставків можна сказати наступне. На картах Генерального штабу армії Російської імперії середини XIX ст. жодних ознак ставків найти не вдалося; на картах Генерального штабу Червоної армії станом на 1940 р. є лише один ставок на струмку, що витікає з південно-західного відрогу. Його створення людським поголосом приписується М.В. Скліфософському, маєток якого розташовувався на території майбутнього парку. Решта водойм, очевидно, створені невдовзі після Другої світової війни. Причому, останній, нижній ставок був закладений відразу після утворення дендропарку в 1962 р. Він найбільший за площею і найневдаліший – вже під час його створення був допущений брак, внаслідок якого вода постійно витікає попід греблею, а не через «монах», який для цього мав би слугувати. В літню пору баланс води у водоймі стає негативним і рівень води в ній сильно знижується, причому, з кожним роком все сильніше. У 70-ті рр. ХХ століття в одне із засушливих літ дно цього ставу було повністю сухим. До речі, означений «монах» за весь час існування ставка ніколи не виконував функцію регулятора води, а бовванів над плесом пам'ятником неякісній роботі і безгospодарності.

Через достатнє зволоження днища балки тут сформувалися лучні рослинні асоціації і навіть невеличкі ділянки надводної рослинності із рогозу та очерету, а більшу частину посушливих схилів займала степова рослинність із окремими ділянками пустыщ. Невелику найменш круту частину східного схилу головного русла балки розорювали під сільськогосподарські культури. Південний схил південно-західного відрогу займав невеличкий молодий гай із широколистяних порід дерев та чагарників. Між західним і північним відрогами знаходилася ділянка зрілого, навіть старого лісу, який місцеві жителі називали Тамарівським. Цей ліс, за переказами старих людей, у свій час належав родині Скліфософських і був перетворений господарем на парк, залишки вимощених цеглою алей якого можна спостерігати й сьогодні. Тамарівський ліс є останцем відомого в історії Полтавської битви Яківчанського лісу, який колись покривав і балку, але був вирубаній ще в давні часи (звідси і назва «Зруб»), принаймні, на картах Генерального штабу Російської імперії в середині XIX ст. він займав таку ж саму площину, що й тепер.

Міський парк був закладений у квітні 1962 р. після багатотисячного мітингу в річницю польоту у космос Ю.О. Гагаріна і в подальшому досить тривалий час носив його ім'я. Становлення парку було непростим – протягом наступного майже десятиліття доводилося здійснювати полив і підсаджувати рослини на місці загиблих. Виходжували парк всією громадою міста – його територія була розподілена на ділянки, останні були закріплені за різними установами, заводами, школами тощо, які їх і доглядали.

Історію вивчення фауни хребетних парку логічно розділити на два етапи, межею між якими слугують роки його створення.

Про хребетних тварин першого періоду маємо фрагментарні відомості з робіт М.І. Гавриленка, особистих повідомлень Б.О. Голова та дитячих вражень автора.

На степових схилах численним був ховрах крапчастий (*Spermophilus suslicus* Guld.) та досить звичайним – хом’як європейський (*Cricetus cricetus* L.). Навесні, після сходження снігового покриву, вражала уяву велика кількість наземних гнізд і мереживо доріжок полівки європейської (*Microtus arvalis*²). Заєць сірий (*Lepus europaeus*) взимку набивав на снігу торні доріжки. До 1950-х років ХХ ст. на прилеглих до майбутнього парку територіях ще зустрічалися кріль європейський (*Oryctolagus cuniculus* L.) та строкатка степова (*Lagurus lagurus* Pall.) [3], а в 1951 р. була здобута перегузня степова (*Vormela peregusna* Gueld.) [3], таємниця появі якої тут до цих пір залишається не з’ясованою. В 1944 р. М.І. Гавриленко неподалік майбутнього парку відмітив рясоніжку малу (*Neomys anomalus* Cabr.) [1]. Ця знахідка до наших днів залишається єдиною для Полтавської області.

Із птахів звичайними тут були перепілка (*Coturnix coturnix*) та жайворонок польовий (*Alauda arvensis*). В той час впадала в очі відсутність біляводних птахів на ставках у гніздовий період.

Рептилії були представлені 3 видами, причому ящірка прудка (*Lacerta agilis*) була чисельною, вуж звичайний (*Natrix natrix*) – звичайним а черепаха болотна європейська (*Emys orbicularis*) траплялася зрідка.

Води ставків населяли 2 види карасів – звичайний (*Carassius gibelio*) і золотий (*C. carassius*), а також пічкур звичайний (*Gobio gobio* L.), щука звичайна (*Esox lucius*) та окунь звичайний (*Perca fluviatilis*).

Другий, сучасний, період становлення фауни хребетних відбувався на тлі докорінних змін біотопів парку. Практично зникли степові угруповання, а з ними швидко зникли ховрах крапчастий і хом’як європейський, а перепілка зараз зрідка зустрічається тільки на прилеглих полях.

З часом ставки почали заростати водою та надводною рослинністю, що зумовило інтенсивне зростання видового різноманіття хребетних біляводного комплексу. З’явилися на гніздуванні крижень (*Anas platyrhynchos*), лиска (*Fulica atra*), бугайчик (*Ixobrychus minutus*), очеретянка велика (*Acrocephalus arundinaceus*). Ще ряд птахів прилітають на ставки на годівлю регулярно або зрідка. Це, зокрема, такі види, як квак (*Ncticorax ncticorax*), чапля сіра (*Ardea cinerea*), мартин звичайний (*Larus ridibundus*). Відмічені окремі зальоти чаплі великої білої (*Ardea alba*), баклана великого (*Phalacrocorax carbo*) – 1 однорічний птах (23.08.2015 р.), мородунки (*Xenus cinereus*) – 1 птах кормився на мілині нижнього ставка (11.04.2004 р.); брижача (*Philomachus pugnax*) – одноочна самка на березі нижнього ставка (20.05.2016 р.), широконіски (*Anas clypeata*) – пару птахів спостерігали на другому ставку (28.04.2015 р.).

Частина видів проходить територію парку під час сезонних міграцій транзитом: часто можна бачити гусок сіру (*Anser anser*), білолобу (*A. albifrons*), гуменника (*A. fabalis*), журавля сірого (*Grus grus* L., 1758) та інших. Навесні 2016 р. на верхній ставок були випущені для весняно-літнього утримання пара лебедів-шипунів (*Cygnus olor*) та пара лебедів чорних (*C. atratus*), а наступної весни туди ж поселили 6 особин мандаринки (*Aix galericulata*) та пару каролінських качок (*Aix sponsa*).

Ссавці у цьому фауністичному комплексі представлени всього одним досить звичайним видом – ондатрою мускусною (*Ondatra zibethicus*).

У всіх водоймах парку численною є жаба озерна (*Rana ridibunda*), а нечисленною – джерелянка червоночерева (*Bombina bombina*). Із плазунів тут можна зустріти черепаху болотну європейську та зрідка трапляється вуж звичайний.

Всього ж біляводний комплекс нараховує 32 види птахів (9 із них тут і гнізduють), 1 вид ссавців, по 2 види земноводних і плазунів.

² автори назв видів, що належать до сучасної фауни парку, наведено далі у таблицях-списках.

Із іхтіофауни парку зник пічкур, натомість вона збагатилася коропом звичайним (*Cyprinus carpio*), краснопіркою звичайною (*Scardinius erythrophthalmus*), дуже рідко трапляється лин (*Tinca tinca*), були спроби підпускати у ставки товстолобика білого (*Hypophthalmichthys molitrix*) та сома європейського (*Silurus glanis*). Отже, на сьогодні у водах парку можна зустріти 9 видів риб, що належать до 8 родів, 4 родин та 4 рядів (табл. 1).

Таблиця 1

Видовий склад і відносна чисельність риб Полтавського міського парку

Вид	Відносна чисельність
<i>Ряд КОРОПОПОДІБНІ – CYPRINIFORMES</i>	
Родина КОРОПОВІ – CYPRINIDAE	
Рід Какарь – <i>Carassius</i>	
1. Какарь звичайний – <i>Carassius gibelio</i> Bloch	++
2. Какарь золотистий – <i>Carassius carassius</i> L.**	+
Рід Короп – <i>Cyprinus</i>	
3. Короп звичайний – <i>Cyprinus carpio</i> L.	++
Рід Товстолобик – <i>Hypophthalmichthys</i>	
4. Товстолобик білий – <i>Hypophthalmichthys molitrix</i> Valenc.	p
Рід Краснопірка – <i>Scardinius</i>	
5. Краснопірка звичайна – <i>Scardinius erythrophthalmus</i> L.	+++
Рід Лин – <i>Tinca</i>	
6. Лин – <i>Tinca tinca</i> L.	p
<i>Ряд СОМОПОДІБНІ – SILURIFORMES</i>	
Родина СОМОВІ – SILURIDAE	
Рід Сом – <i>Silurus</i>	
7. Сом європейський – <i>Silurus glanis</i> L.	p
<i>Ряд ЩУКОПОДІБНІ – ESOCIFORMES</i>	
Родина ЩУКОВІ – ESOCIDAE	
Рід Щука – <i>Esox</i>	
8. Щука звичайна – <i>Esox lucius</i> L.	++
<i>Ряд ОКУНЕПОДІБНІ – PERCIFORMES</i>	
Родина ОКУНЕВІ – PERCIDAE	
Рід Окунь – <i>Perca</i>	
9. Окунь звичайний – <i>Perca fluviatilis</i> L.	+++

Пояснення до таблиць 1–4:

Охоронний статус видів: * – вид занесений до регіонального червоного списку; ** – вид занесений до Червоної книги України; *** – вид занесений до Європейського Червоного списку.

Відносна чисельність видів: +++ – вид численний; ++ – вид звичайний; + – вид нечисленний; p – вид рідкісний.

Еколого-фауністичний комплекс: б/в – біляводний; л – лісовий; л/с – лучно-степовий; с – синантропний; е/т – вид евритопний.

Найбагатше представлена фауна хребетних у лісовому комплексі, що нараховує 72 види птахів, в тому числі 44 гніздуючих, 6 видів ссавців та 3 види земноводних.

Найбільш звичайними лісовими гніздовими птахами парку є припутень (*Columba palumbus*), дятел великий строкатий (*Dendrocopos major*), вивільга (*Oriolus oriolus*), сойка (*Garrulus glandarius*), синиця велика (*Parus major*), повзик (*Sitta europaea*), вільшанка (*Erithacus rubecula*), соловей східний (*Luscinia luscinia*), дрозди чорний (*Turdus merula*), співочий (*T. philomelos*), вівчарики ковалик (*Phylloscopus collybita*), жовтобрюхий (*Phylloscopus sibilatrix*) та ряд інших.

Заслуговує на увагу зустріч вокалізуючого самця вівчарика зеленого (*Phylloscopus trochiloides*) 24.05.2007 р. на південному березі нижнього ставка. Птах тримався на тому ж місці до 06.06.2007 р. За весь час спостереження самку виявити не вдалося. Цей вид на Полтавщині відмічався двічі М.І Гавриленком [2] у 1951 та 1954 рр. Тоді теж довести гніздування зеленого вівчарика у Полтавській області не вдалося.

Ще один краєреальний вид – мухоловка строката (*Ficedula hypoleuca*) – з'явився в парку наприкінці 70-х – на початку 80-х рр. ХХ ст. і невдовзі став досить звичайним (як і в інших місцях Полтавщини) видом [4]. На початку 2000-х рр. ця мухоловка знову стала у нас рідкісною. На сьогодні мухоловка строката зустрічається на території парку зрідка і не кожного року. Так, із 6 по 16.05.2014 спостерігався самець, а потім він же у парі із самкою; 2.05.2016 р. відмічено вокалізуючого самця.

Із лісових ссавців тільки мідиці звичайна (*Sorex araneus*) та мала (*S. minutus*) і вивірка лісова (*Sciurus vulgaris*) проживають на території парку постійно. Куниця лісова (*Martes martes*) тут регулярно зимує, а навесні відкочовує. Для сарни європейської (*Capreolus capreolus*) та лося (*Alces alces*) відомі дуже рідкісні весняні заходи.

Жаба гостроморда (*Rana arvalis*) та тритон звичайний (*Triturus vulgaris*) у парку є нечисленними, а тритон гребінчастий (*Triturus cristatus*) – рідкісним.

Лучно-степовий фауністичний комплекс нараховує 13 видів птахів, в тому числі 5 гніздових, 2 види ссавців та по 1 виду амфібій і рептилій.

Найбільш звичайним у комплексі є жайворонок польовий, а нечисленними можна вважати чекана чорноголового (*Saxicola torquata*), кам'янку звичайну (*Oenanthe oenanthe*) та плиску жовту (*Motacilla citreola*).

Заєць сірий та полівка європейська (*Microtus arvalis*) для парку є звичайними видами, тоді як ропуха зелена (*Pseudoepeidalea viridis*) та ящірка прудка стали рідкісними.

Синантропний фауністичний комплекс містить у своєму складі 12 видів птахів, причому всі вони використовують біотопи парку майже виключно як кормову територію, а гніzdують у прилеглих населених пунктах. Серед птахів-синантропів лише сич хатній (*Athene noctua*) зустрічається рідко та галка (*Corvus monedula*) є нечисленною, решта ж птахів є звичайними.

Із 4 видів синантропних ссавців нечисленним і навіть рідкісним можна вважати кажана пізнього (*Vespertilio serotinus*), тоді як пацюк мандрівний (*Rattus norvegicus*), миша домова (*Mus musculus*) та куница кам'яна (*Martes foina*) є звичайними мешканцями парку. Крім того, практично всі чотири фауністичні комплекси збагачуються ще й за рахунок 9 видів евритопних ссавців.

Земноводні нараховують 7 видів із 5 родів, 5 родин, 2 рядів. Найбіднішим є населення плазунів – у парку їх зустрічається всього 3 види із 3 родів, 3 родин та 2 рядів (табл. 2).

Таблиця 2

**Видовий склад, відносна чисельність та екологічна приуроченість
земноводних і плазунів Полтавського міського парку**

Вид	Відносна чисель- ність	Еколо- фауністичний комплекс
Клас ЗЕМНОВОДНІ (АМФІБІЇ) – AMPHIBIA		
<i>Ряд БЕЗХВОСТИ – ANURA (ECAUDATA)</i>		
Родина КРУГЛОЯЗИЧНІ – DISCOGLOSSIDAE		
Рід Джерелянки – Bombina		
1. Джерелянка червоночерева – <i>Bombina bombina</i> L.	++	б/в
Родина РОПУХОВІ – BUFONIDAE		
Рід Ропуха зелена – <i>Pseudoepeidalea</i>		
2. Ропуха зелена – <i>Pseudoepeidalea viridis</i> Laur.	++	л/с
Родина СПРАВЖНІ ЖАБИ – RANIDAE		
Рід Жаби – <i>Rana</i>		
3. Жаба озерна – <i>Rana ridibunda</i> Pall.	+++	б/в
4. Жаба гостроморда – <i>Rana arvalis</i> Nilss.	+	л
<i>Ряд ХВОСТАТИ – URODELA (CAUDATA)</i>		
Родина СПРАВЖНІ САЛАМАНДРИ – SALAMANDRIDAE		
Рід Тритони – <i>Triturus</i>		
5. Тритон звичайний – <i>Triturus vulgaris</i> L.	++	л
6. Тритон гребінчастий – <i>Triturus cristatus</i> Laur.*	р	л
Клас ПЛАЗУНИ – REPTILIA		
<i>Ряд ЧЕРЕПАХИ – CHELONIA (TESTUDINES)</i>		
Родина ПРІСНОВОДНІ ЧЕРЕПАХИ – EMIDIDAE		
Рід Еміси – <i>Emys</i>		
1. Черепаха болотна європейська – <i>Emys orbicularis</i> L.	++	б/в
<i>Ряд ЛУСКАТИ – SQUAMATA</i>		
Родина СПРАВЖНІ ЯЩІРКИ – LACERTIDAE		
Рід Ящірки – <i>Lacerta</i>		
2. Ящірка прудка – <i>Lacerta agilis</i> L.	+	л/с
Родина ВУЖЕВІ – COLUBRIDAE		
Рід Вужі – <i>Natrix</i>		
3. Вуж звичайний – <i>Natrix natrix</i> L.	+	б/в

Найбільш помітним і численним фауністичним елементом цієї території є птахи – їх відмічено 129 видів, об'єднаних у 87 родів, 42 родини та 16 рядів (табл. 3). Із них 70 видів відмічені на гніздуванні, а ще для 16 літуючих видів гніздування не встановлено. У періоди сезонних міграцій видове різноманіття птахів збільшується до 100 видів. Зимовий список птахів дендропарку нараховує 42 види.

Таблиця 3

**Видовий склад і екологічна приуроченість птахів Полтавського міського парку
та характер їх перебування на території об'єкту**

Вид	Статус				Еколого-фауністичний комплекс	
	Гніздування	міграція		зимівля		
		весняна	осіння			
<i>Ряд НОРЦЕПОДІБНІ – PODICIPEDIFORMES</i>						
Родина НОРЦЕВІ – PODICIPITIDAE						
Рід Норці – Podiceps						
1. Норець великий – <i>Podiceps cristatus</i> L.		p	p		б/в	
<i>Ряд ВЕСЛОНОГІ – PELECANIFORMES</i>						
Родина БАКЛНОВІ – PHALACROCORACIDAE						
Рід Баклани – Phalacrocorax						
2. Баклан великий – <i>Phalacrocorax carbo</i> L.*				p	б/в	
<i>Ряд ЛЕЛЕКОПОДІБНІ – CICONIIFORMES</i>						
Родина ЧАПЛЄВІ – ARDEIDAE						
Рід Бугайчики – Ixobrychus						
3. Бугайчик – <i>Ixobrychus minutus</i> L.	++	++	++		б/в	
Рід Кваки – Ncticorax						
4. Квак – <i>Ncticorax ncticorax</i> L.				++	б/в	
Рід Чаплі – Ardea						
5. Чапля сіра – <i>Ardea cinerea</i> L.		p	p	p	б/в	
6. Чапля велика біла (чепура велика) – <i>Ardea alba</i> L.*				p	б/в	
<i>Ряд ГУСЕПОДІБНІ – ANSERIFORMES</i>						
Родина КАЧИНІ – ANATIDAE						
Рід Лебеді – Cygnus						
7. Лебідь-шипун – <i>Cygnus olor</i> Gm				1 пара	б/в	
8. Лебедь чорний – <i>Cygnus atratus</i> Latham				1 пара	б/в	
Рід Гуси – Anser						
9. Гуска сіра – <i>Anser anser</i> L.	++	++			б/в	
10. Гуска білолоба – <i>Anser albifrons</i> Scopoli	++	++			б/в	
11. Гуменник – <i>Anser fabalis</i> Latham	++	++			б/в	
Рід Лісові качки – Aix						
12. Мандаринка – <i>Aix galericulata</i> L.				6 птахів	б/в	
13. Качка каролінська – <i>Aix sponsa</i> L.				1 пара	б/в	
Рід Качки – Anas						
14. Крижень – <i>Anas platyrhynchos</i> L.	++	++	++		б/в	
15. Чирянка велика – <i>Anas querquedula</i> L.		+			б/в	
16. Широконіска – <i>Anas clypeata</i> L.*				p	б/в	
17. Шилохвіст – <i>Anas acuta</i> L.*				p	б/в	

Ряд СОКОЛОПОДІБНІ – FALCONIFORMES					
Родина ЯСТРУБИНІ – ACCIPITRIDAE					
Рід Яструби – Accipiter					
18. Яструб великий – <i>Accipiter gentilis</i> L.		++	++	++	++ л
19. Яструб малий – <i>Accipiter nisus</i> L.	+	++	++	++	++ л
Рід Канюки – Buteo					
20. Зимняк – <i>Buteo lagopus</i> Pontopp.				++	л/с
21. Канюк звичайний – <i>Buteo buteo</i> L.	+	++	++		л
Рід Луні – Circus					
22. Лунь лучний – <i>Circus pygargus</i> L. **			p		л/с
23. Лунь болотний – <i>Circus aeruginosus</i> L.			p		б/в
Родина СОКОЛИНІ – FALCONIDAE					
Рід Чеглоки – Hypotriorchis					
24. Чеглок – <i>Hypotriorchis subbuteo</i> L.		++	++		л
Ряд КУРОПОДІБНІ – GALLIFORMES					
Родина ФАЗАНОВІ – PHASIANIDAE					
Рід Куріпки – Perdix					
25. Куріпка сіра – <i>Perdix perdix</i> L. *	+				л/с
Рід Перепілка – Coturnix					
26. Перепілка – <i>Coturnix coturnix</i> L.	+	++			л/с
Ряд ЖУРАВЛЕПОДІБНІ – GRUIFORMES					
Родина ПАСТУШКОВІ – RALLIDAE					
Рід Деркачі – Crex					
27. Деркач – <i>Crex crex</i> L. ***		++	++		л/с
Рід Водяні курочки – Gallinula					
28. Курочка водяна – <i>Gallinula chloropus</i> L.	+	++	++		б/в
Рід Лиски – Fulica					
29. Лиска – <i>Fulica atra</i> L.	++	++	++		б/в
Родина ЖУРАВЛІНІ – GRUIDAE					
Рід Журавлі – Grus					
30. Журавель сірий – <i>Grus grus</i> L. **		++	++		б/в
Ряд СИВКОПОДІБНІ – CHARADRIIFORMES					
Родина СИВКОВІ – CHARADRII					
Рід Чайки – Vanellus					
31. Чайка – <i>Vanellus vanellus</i> L.		++	++		л/с

Рід Мородунки – <i>Xenus</i>					
32. Мородунка – <i>Xenus cinereus</i> Guld.*		p			б/в
Рід Турухтани – <i>Philomachus</i>					
33. Брижач – <i>Philomachus pugnax</i> L.*		p			б/в
Рід Вальдшнепи – <i>Scolopax</i>					
34. Вальдшнеп – <i>Scolopax rusticola</i> L.*		++	++		л
Родина МАРТИНОВІ – LARIDAE					
Рід Мартини – <i>Larus</i>					
35. Мартин звичайний – <i>Larus ridibundus</i> L.		++	++		б/в
Рід Болотяні крячки – <i>Chlidonias</i>					
36. Крячок білощокий – <i>Chlidonia hybrida</i> Pall. *				p	б/в
37. Крячок чорний – <i>Chlidonia nigra</i> L.				p	б/в
Ряд ГОЛУБОПОДІБНІ – COLUMBIIFORMES					
Родина ГОЛУБИНІ – COLUMBIDAE					
Рід Голуби – <i>Columbus</i>					
38. Голуб сизий – <i>Columba livia</i> L.	++				с
39. Голуб-синяк – <i>Columba oenas</i> L.**		p			л
40. Припутень – <i>Columba palumbus</i> L.	++	++	++		л
Рід Горлиці – <i>Streptopelia</i>					
41. Горлиця звичайна – <i>Streptopelia turtur</i> L.	+	+	+		л
42. Горлиця кільчаста – <i>Streptopelia decaocto</i> Frivald.	++			++	с
Ряд ЗОЗУЛЕПОДІБНІ – CUCULIFORMES					
Родина ЗОЗУЛЕВІ – CUCULIDAE					
Рід Зозулі – <i>Cuculus</i>					
43. Зозуля звичайна – <i>Cuculus conorus</i> L.	++	++	++		л
Ряд СОВОПОДІБНІ – STRIGIFORMES					
Родина СПРАВЖНІ СОВИ – STRIGIDAE					
Рід Совки – <i>Otus</i>					
44. Совка – <i>Otus scops</i> L.**	p				л
Рід Білі сови – <i>Nyctea</i>					
45. Сова біла – <i>Nyctea scandiaca</i> L.				p	л/с
Рід Хатні сичі – <i>Athene</i>					
46. Сич хатній – <i>Athene noctua</i> Scop.	p			p	с
Рід Вухаті сови – <i>Asio</i>					
47. Сова вухата – <i>Asio otus</i> L.	p	++	++	++	л

Ряд ДРІМЛЮГОПОДІБНІ – CAPRIMULGIFORMES					
Родина СПРАВЖНІ ДРІМЛЮГИ – CAPRIMULGIDAE					
Рід Дрімлюги – <i>Caprimulgus</i>					
48. Дрімлюга – <i>Caprimulgus europaeus</i> L.	++	++			л
Ряд ДОВГОКРИЛІ – APODIFORMES					
Родина СПРАВЖНІ СЕРПОКРИЛЬЦІ – APODIDAE					
Рід Серпокрильці – <i>Apus</i>					
49. Серпокрилець чорний – <i>Apus apus</i> L.	++	++	++		с
Ряд РАКШЕПОДІБНІ – CORACIFORMES					
Родина РИБАЛОЧКОВІ – ALCEDINIDAE					
Рід Голубі рибалочки – <i>Alcedo</i>					
50. Рибалочка звичайний – <i>Alcedo atthis</i> L.	+	++	++		б/в
Родина БДЖОЛОЇДКОВІ – MEROPIDAE					
Рід Бджолоїдки – <i>Merops</i>					
51. Бджолоїдка звичайна – <i>Merops apiaster</i> L.	++	++			л/с
Родина СПРАВЖНІ РАКШІ – CORACIIDAE					
Рід Сиворакші – <i>Coracias</i>					
52. Сиворакша – <i>Coracias garrulus</i> L.**	++	++			л
Родина ОДУДОВІ – UPUPIDAE					
Рід Одуди – <i>Upupa</i>					
53. Одуд – <i>Upupa epops</i> L.	++	++			л
Ряд ДЯТЛОПОДІБНІ – PICIFORMES					
Родина СПРАВЖНІ ДЯТЛИ – PICIDAE					
Рід Крутиголовки – <i>Iynx</i>					
54. Крутиголовка – <i>Iynx forquilla</i> L.	+	++	++		л
Рід Зелені дятли – <i>Picus</i>					
55. Дятел сивий – <i>Picus canus</i> L.	+	++	++	p	л
Рід Строкаті дятли – <i>Dendrocopos</i>					
56. Дятел великий строкатий – <i>Dendrocopos major</i> L.	++	++	++		л
57. Дятел сирійський – <i>Dendrocopos syriacus</i> Hempr. et Ehr.	++			++	с
58. Дятел малий – <i>Dendrocopos minor</i> L.		+	+		л
59. Дятел середній – <i>Dendrocopos medius</i> L.*					л

Ряд ГОРОБЦЕПОДІБНІ – PASSERIFORMES					
Родина ЖАЙВОРОНКОВІ – ALAUDIDAE					
Рід Чубаті жайворонки – Galerida					
60. Посмітюха – <i>Galerida cristata</i> L.		+	+	+	л/с
Рід Лісові жайворонки – Lullula					
61. Жайворонок лісовий – <i>Lullula arborea</i> L.		+	+		л
Рід Польові жайворонки – Alauda					
62. Жайворонок польовий – <i>Alauda arvensis</i> L.	++	+++	+++		л/с
Родина ЛАСТІВКОВІ – HIRUNDINIDAE					
Рід Берегові ластівки – Riparia					
63. Ластівка берегова (щурик) – <i>Riparia riparia</i> L.		++	++		б/в
Рід Сільські ластівки – Hirundo					
64. Ластівка сільська – <i>Hirundo rustica</i> L.	++	+++	+++		с
Рід Міські ластівки – Delichon					
65. Ластівка міська – <i>Delichon urbica</i> L.	++	+++	+++		с
Родина ІВОЛГОВІ – ORIOLIDAE					
Рід Іволги – Oriolus					
66. Іволга – <i>Oriolus oriolus</i> L.	++	++	++		л
Родина ВОРОНОВІ – CORVIDAE					
Рід Сойки – Garrulus					
67. Сойка – <i>Garrulus glandarius</i> L.	++	++	++	++	л
Рід Сороки – Pica					
68. Сорока – <i>Pica pica</i> L.	+			+++	л
Рід Круки – Corvus					
69. Галка – <i>Corvus monedula</i> L.	+	++	++	++	с
70. Грак – <i>Corvus frugilegus</i> L.		++	++	++	++
71. Ворона сіра – <i>Corvus cornix</i> L.	+	++	++	++	л
72. Крук – <i>Corvus corax</i> L.	+			++	л
Родина ТОВСТОДЗЬОБІ СИНИЦІ – PARADOXORNITHIDAE					
Рід Ополовники – Aegithalos					
73. Синиця довгохвоста – <i>Aegithalos caudatus</i> L.	p	++	++		л
Родина РЕМЕЗОВІ – REMIZIDAE					
Рід Ремези – Remiz					
74. Ремез – <i>Remiz pendulinus</i> L.	+	++	++		б/в

Родина СИНИЦЕВІ – PARIDAE					
Рід Синиці – Parus					
75. Гаїчка болотяна – <i>Parus palustris</i> L.	+	+	+	+	л
76. Синиця чорна, або московка – <i>Parus ater</i> L.		++	++	++	л
77. Синиця велика – <i>Parus major</i> L.	+++	+++	+++	+++	л
78. Синиця блакитна – <i>Parus caeruleus</i> L.	++	++	++	++	л
Родина ПОВЗИКОВІ – SITTIDAE					
Рід Повзики – Sitta					
79. Повзик – <i>Sitta europaea</i> L.	++	++	++	++	л
Родина ПІДКОРИШНИКОВІ – CERTHIIDAE					
Рід Підкоришники – Certhia					
80. Підкоришник – <i>Certhia familiaris</i> L.	+	+	+	+	л
Родина КРОПИВНИКОВІ – TROGLODYTIDAE					
Рід Кропивники – Troglodytes					
81. Волове очко (кропивник) – <i>Troglodytes troglodytes</i> L.*		+	+	+	л
Родина ДРОЗДОВІ – TURDIDAE					
Рід Малинівки – Erithacus					
82. Вільшанка – <i>Erithacus rubecula</i> L.	++	++	++	+	л
Рід Солов’ї – Luscinia					
83. Соловей східний – <i>Luscinia luscinia</i> L.	++	++	++		л
Рід Горихвістки – Phoenicurus					
84. Горихвістка чорна – <i>Phoenicurus ochruros</i> Gm.	++	++	++		с
85. Горихвістка звичайна – <i>Phoenicurus phoenicurus</i> L.			+++		л
Рід Чекани – Saxicola					
86. Чекан чорноголовий – <i>Saxicola torquata</i> L.	+	++	++		л/с
Рід Камінки – Oenanthe					
87. Кам’янка звичайна – <i>Oenanthe oenanthe</i> L.	+	++	++		л/с
Рід Дрозди – Turdus					
88. Дрізд чорний – <i>Turdus merula</i> L.	++	++	++	+	л
89. Дрізд-чикотень (горобинник) – <i>Turdus pilaris</i> L.	+	+++	+++	++	л
90. Дрізд співочий – <i>Turdus philomelos</i> Brehm	++	++	++		л
91. Дрізд-омелюх – <i>Turdus viscivorus</i> L.*		p	p		л

Родина СЛАВКОВІ – SYLVIIDAE					
Рід Кобилочки – Locustella					
92. Кобилочка солов'їна – <i>Locustella lusciniooides</i> Savi.		+	+		б/в
93. Очеретянка велика – <i>Acrocephalus arundinaceus</i> L.	++	++	++		б/в
Рід Берестянки – Hippolais					
94. Берестянка – <i>Hippolais icterina</i> Vieill.	p	+	+		л
Рід Славки – Sylvia					
95. Кропив'янка рябогруда – <i>Sylvia nisoria</i> Bechst.	+	++	++		л
96. Кропив'янка садова – <i>Sylvia borin</i> Bodd.		++	++		л
97. Кропив'янка чорноголова – <i>Sylvia atricapilla</i> L.	++	++	+++		л
98. Кропив'янка сіпа – <i>Sylvia communis</i> Lath.	+	++	+++		л
99. Кропив'янка прудка – <i>Sylvia curruca</i> L.	+	++	++		л
Рід Вівчарики – Phylloscopus					
100. Вівчарик весняний – <i>Phylloscopus trochilus</i> L.*		+	+		л
101. Вівчарик-ковалик – <i>Phylloscopus collybita</i> Vieill.	++	++	+++		л
102. Вівчарик жовтобрюхий – <i>Phylloscopus sibilatrix</i> Bechst.	++	++	++		л
103. Вічарик зелений – <i>Phylloscopus trochiloides</i> Sund.				p	л
Родина КОРОЛЬКОВІ – REGULIDAE					
Рід Корольки – Regulus					
104. Золотомушка жовтоголова – <i>Regulus regulus</i> L.		++	++	++	л
Родина МУХОЛОВКОВІ – MUSCICAPIDAE					
Рід Мухоловки – Muscicapa					
105. Мухоловка сіпа – <i>Muscicapa striata</i> Pall.	+	++	++		л
Рід Строкаті мухоловки – Ficedula					
106. Мухоловка строката – <i>Ficedula hypoleuca</i> Pall.*	+	++	++		л
107. Мухоловка-білошийка – <i>Ficedula albicollis</i> Temm.	++	++	++		л
Рід Малі мухоловки – Sipha					
108. Мухоловка мала – <i>Sipha parva</i> Bechst.*		p	++		л
Родина ПЛИСКОВІ – MOTACILIDAE					
Рід Плиски – Motacilla					
109. Плиска жовта – <i>Motacilla flava</i> L.	+	++	++		л/с
110. Плиска біла – <i>Motacilla alba</i> L.	+	++	++		б/в

Рід Щеврики – <i>Anthus</i>					
111. Щеврик лісовий – <i>Anthus trivialis</i> L.	+	++	++		л
Родина ОМЕЛЮХОВІ – BOMBYCILLIDAE					
Рід Омелюхи – <i>Bombycilla</i>					
112. Омелюх – <i>Bombycilla garrulus</i> L.		+++	+	++	л
Родина СОРОКОПУТИ – LANIIDAE					
Рід Сорокопуди – <i>Lanius</i>					
113. Сорокопуд-жулан – <i>Lanius collurio</i> L.	+	++	++		л
114. Сорокопуд сірий – <i>Lanius excubitor</i> L.*		p	p	p	л
Родина ШПАКОВІ – STURNIDAE					
Рід Шпаки – <i>Sturnus</i>					
115. Шпак – <i>Sturnus vulgaris</i> L.	++	++	+++		с
Родина ТКАЧИКОВІ – PLOCEIDAE					
Рід Горобці – <i>Passer</i>					
116. Горобець хатній – <i>Passer domesticus</i> L.	++			++	с
117. Горобець польовий – <i>Passer montanus</i> L.	++	++	++	++	с
Родина В'ЮРКОВІ – FRINGILLIDAE					
Рід В'юрки – <i>Fringilla</i>					
118. Зяблик – <i>Fringilla coelebs</i> L.	+++	+++	+++	p	л
119. В'юрок – <i>Fringilla montifringilla</i> L.		+	+	+	л
Рід Зеленяки – <i>Chloris</i>					
120. Зеленяк – <i>Chloris chloris</i> L.	++	++	++	+	л
Рід Чижі – <i>Spinus</i>					
121. Чиж – <i>Spinus spinus</i> L.*		++	++	++	л
Рід Щиглики – <i>Carduelis</i>					
122. Щиглик – <i>Carduelis carduelis</i> L.	++	++	++	+++	л
Рід Чечітки – <i>Acanthis</i>					
123. Чечітка звичайна – <i>Acanthis flammea</i> L.		+	+	+	л
Рід Коноплянки – <i>Cannabina</i>					
124. Коноплянка – <i>Cannabina cannabina</i> L.	+	+	+	p	л
Рід Шишкари – <i>Loxia</i>					
125. Шишкар ялиновий – <i>Loxia curvirostra</i> L.*					л
Рід Снігурі – <i>Pyrrhula</i>					
126. Снігур – <i>Pyrrhula pyrrhula</i> L.		++	++	++	л
Рід Костогризи – <i>Coccothraustes</i>					
127. Костогриз – <i>Coccothraustes coccothraustes</i> L.	++	++	++	+	л
Родина ВІВСЯНКОВІ – EMBERIZINAE					
Рід Вівсянки – <i>Emberiza</i>					
128. Вівсянка звичайна – <i>Emberiza citrinella</i> L.	++	++	++	+	л
129. Вівсянка садова – <i>Emberiza hortulana</i> L.*		p			л

Другою за видовим різноманіттям групою хребетних Полтавського міського парку є ссавці, яких на сьогодні тут відмічено 22 види із 19 родів, 9 родин та 5 рядів (табл. 4).

Таблиця 4

Видовий склад і екологічна приуроченість ссавців Полтавського міського парку

Вид	Відносна чисельність	Еколого-фауністичний комплекс
<i>Ряд КОМАХОЇДНІ – INSECTIVORA</i>		
Родина ЇЖАКОВІ – ERINACEIDAE		
Рід Їжаки – <i>Erinaceus</i>		
1. Їжак звичайний – <i>Erinaceus europaeus</i> L.	++	е/т
Родина ЗЕМЛЕРИЙКОВІ – SORICIDAE		
Рід Бурозубки – <i>Sorex</i>		
2. Мідиця звичайна (бурозубка звичайна) – <i>Sorex araneus</i> L.	++	л
3. Мідиця мала – <i>Sorex minutus</i> L.	++	л
Рід Білоузубки – <i>Crocidura</i>		
4. Білоузубка мала – <i>Crocidura suaveolens</i> Pall.	++	е/т
<i>Ряд РУКОКРИЛІ – CHIROPTERA</i>		
Родина ГЛАДКОНОСІ – VESPERTILIONIDAE		
Рід Вухані – <i>Plecotus</i>		
5. Вухань звичайний – <i>Plecotus auritus</i> L. **, ***	++	е/т
Рід Вечірниці – <i>Nyctalus</i>		
6. Вечірниця руда – <i>Nyctalus noctula</i> Schr. **	++	е/т
Рід Кажани – <i>Vespertilio</i>		
7. Кажан пізній – <i>Vespertilio serotinus</i> Schr. **	+	с
<i>Ряд ЗАЙЦЕПОДІБНІ – LAGOMORFA</i>		
Родина ЗАЙЦЕВІ – LEPORIDAE		
Рід Зайці – <i>Lepus</i>		
8. Заєць сірий – <i>Lepus europaeus</i> Pall.	++	л/с
<i>Ряд ГРИЗУНИ – RODENTIA</i>		
Родина БІЛКОВІ – SCIURIDAE		
Рід Білки – <i>Sciurus</i>		
9. Вивірка лісова – <i>Sciurus vulgaris</i> L.	++	л
Рід Ондатри – <i>Ondatra</i>		
10. Ондатра мускусна – <i>Ondatra zibethicus</i> L.	++	б/в
Рід Сірі полівки – <i>Microtus</i>		
11. Полівка європейська – <i>Microtus arvalis</i> Pall.	++	л/с

Родина МИШАЧІ – MURIDAE		
Рід Пацюки – <i>Rattus</i>		
12. Пацюк мандрівний – <i>Rattus norvegicus</i> Berken.	++	с
Рід Миша – <i>Mus</i>		
13. Миша домова – <i>Mus musculus</i> L.	++	с
Рід Мишак – <i>Sylvaemus</i>		
14. Мишак європейський (лісовий) – <i>Sylvaemus sylvaticus</i> L.	++	е/т
Рід Житник – <i>Apodemus</i>		
15. Житник пасистий (польова миша) – <i>Apodemus agrarius</i> Pall.	++	е/т
Ряд ХИЖІ – CARNIVORA		
Родина СОБАЧІ – CANIDAE		
Рід Лисиці – <i>Vulpes</i>		
16. Лисиця звичайна – <i>Vulpes vulpes</i> L.	регулярні кормові заходи	е/т
Родина КУНЯЧІ – MUSTELIDAE		
Рід Куниці – <i>Martes</i>		
17. Куница кам'яна – <i>Martes foina</i> Erxl.	++	с
18. Куница лісова – <i>Martes martes</i> L.	регулярно зимуючий вид	л
Рід Ласки та тхори – <i>Mustela</i>		
19. Ласиця – <i>Mustela nivalis</i> L.	+	е/т
20. Горностай – <i>Mustela erminea</i> L.**	р	е/т
Ряд ПАРНОКОПІТНІ – ARTIODACTYLA		
Родина ОЛЕНЕВІ – CERVIDAE		
Рід Козулі – <i>Capreolus</i>		
21. Сарна європейська – <i>Capreolus capreolus</i> L.	рідкісні весняні заходи	л
Рід Лосі – <i>Alces</i>		
22. Лось – <i>Alces alces</i> L.	рідкісні весняні заходи	л

Таким чином, на території Полтавського міського парку можна зустріти 170 видів хребетних, які належать до 122 родів, 63 родин, 29 рядів та 5 класів, в тому числі риб – 9 видів, земноводних – 7 видів, плазунів – 3 види, птахів – 129 видів та ссавців – 22 види.

Созологічну цінність фауни Полтавського міського парку складають 2 види, занесені до Європейського Червоного списку, 11 видів – до Червоної книги України та 19 регіонально рідкісних видів.

Отже, як показало зіставлення результатів сучасних досліджень із ретроспективними даними, зміни фауни хребетних тварин на території Полтавського міського парку полягають у скороченні різноманіття лучно-степового фауністичного комплексу та зростанні різноманіття лісового та біляводного комплексів. Це обумовлене трансформацією місць існування на території парку від природних переважно лучно-степових угруповань до створених людиною деревних насаджень та штучних водойм.

Список використаної літератури:

1. Гавриленко М.І. Нові види звірів і птахів для Полтавщини і їх біологія / М.І. Гавриленко // Наукові записки Полтавського державного педагогічного інституту. – Полтава, 1946. – Т. 6. – С. 121–128.
2. Гавриленко Н.І. Находки арктических и бореальных птиц на Полтавщине / Н.І. Гавриленко // Орнітологія. – 1960. – Вип. 3. – С. 436–439.
3. Гавриленко Н.І. Позвоночные животные и урбанизация их в условиях города Полтавы / Николай Иванович Гавриленко. – Харьков : Изд-во ХГУ, 1970. – 139 с.
4. Слюсар М.В. Мухоловка строката (*Ficedula hypoleuca* Pall.) – новий гніздуючий вид Полтавської області / М.В. Слюсар // Треті Каришинські читання : зб. наук. пр. – Полтава, 1995. – С. 62–63.

Рекомендую до друку В.М. Писаренко
Отримано 26.10.2017 р.

Н.В. Слюсарь

Полтавский национальный педагогический университет имени В. Г. Короленко

ФАУНА ПОЗВОНОЧНЫХ ПОЛТАВСКОГО ГОРОДСКОГО ПАРКА

Приведены оригинальные данные многолетних фаунистических исследований позвоночных животных Полтавского городского парка. Даётся характеристика ландшафтно-экологических условий территории парка и отмечаются их изменения на протяжении многих десятилетий наблюдений. Перечислены основные биотопы, определяющие видовое разнообразие фауны позвоночных. Проанализированы литературные данные и устные сообщения местных исследователей природы, которые освещают состояние фауны данной местности в период до создания парка.

Установлено, что в составе современной фауны позвоночных Полтавского городского парка можно встретить 169 видов животных из 121 рода, 62 семейств, 29 отрядов и 5 классов, в том числе рыб – 9 видов, земноводных – 6 видов, пресмыкающихся – 3 вида, птиц – 129 видов и млекопитающих – 22 вида. По каждому классу составлены списки видов, где указаны данные относительно особенностей распространения животных на территории парка, их экологической приуроченности, а для некоторых видов – и сведения касательно характера миграции, состояния популяций и т.д.

По экологическим особенностям изученная фауна (кроме рыб как исключительно водных животных) представлена представителями четырех фаунистических комплексов. Наиболее богата фауна позвоночных в лесном комплексе, который насчитывает в общей сложности 81 вид – 72 вида птиц (в т.ч. 44 гнездящихся), 6 видов млекопитающих и 3 вида земноводных. Луго-степной фаунистический комплекс насчитывает итого 17 видов позвоночных – 13 видов птиц (в т.ч. 5 гнездовых), 2 вида млекопитающих и по 1 виду амфибий и рептилий. Околоводный комплекс насчитывает 32 вида птиц (из них 9 гнездящихся), по 2 вида земноводных и пресмыкающихся и 1 вид млекопитающих – вместе 37 видов. Синантропный фаунистический комплекс содержит в своем составе 12 видов птиц, а также 4 вида млекопитающих. Существенный вклад в биологическое разнообразие парка вносят также 9 видов эвритопных млекопитающих. Созологическую ценность фауны Полтавского городского парка составляют 2 вида из Европейского Красного списка, 11 видов – из Красной книги Украины и 19 регионально редких видов.

Констатированы главные изменения фауны позвоночных животных на территории Полтавского городского парка, которые проявляются в сокращении видового разнообразия луго-степного фаунистического комплекса и возрастании разнообразия лесного и околоводного комплексов. Это обусловлено трансформацией мест проживания на территории парка от природных преимущественно луго-степных сообществ к созданным человеком древесным насаждениям и искусственным водоемам.

Ключевые слова: *фауна позвоночных, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие, фаунистические комплексы, редкие виды, Полтавский городской парк.*

M.V. Slusar

Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University

VERTEBRATE FAUNA OF THE POLTAVA CITY PARK

The original data of the long-term faunistic studies of vertebrate animals of the Poltava city park are listed. The characteristic of landscape-ecological conditions of park territory is given and their changes are marked during many decades of observations. The main biotopes that determine the species diversity of vertebrate fauna are noted.

It was analyzed data from the literature and oral reports of local researchers of nature that highlight the state of the fauna of this area before the establishment of the park. It is established that 169 species of animals from 121 genera, 62 families, 29 orders and 5 classes can be found in the modern fauna of the vertebrates of the Poltava City Park, including 9 species of fish, 6 ones of amphibians, 3 species of reptiles, 129 ones of birds and 22 species of mammals. For each class, lists of species have been compiled, which indicate data on the distribution patterns of animals in the park area, their confinement to habitat and for some animals it was specified data on the nature of their migration, population status, etc.

According to ecological features, the fauna studied (except fish as exclusively aquatic animals) is represented by components of four faunal complexes. The most rich fauna of vertebrates in the forest complex, which totals in total 81 species – 72 species of birds (including 44 nesting), 6 species of mammals and 3 species of amphibians. Meadow-steppe faunal complex consists of 17 species of vertebrates – 13 species of birds (including 5 nesting species), 2 species of mammals and by 1 species of amphibians and reptiles. The near-water complex includes 32 species of birds (9 of them are nesting), by 2 species of amphibians and reptiles and 1 species of mammals – together 37 species. The synanthropic faunal complex contains 12 species of birds, as well as 4 species of mammals. A significant contribution to the biological diversity of the park is also made by 9 species of eurytopic mammals.

Sozological value of vertebrate fauna of the Poltava City Park caused by 2 species from the European Red List, 11 species from the Red Book of Ukraine and 19 local rare species.

The main changes in the fauna of vertebrate animals on the territory of the Poltava City Park have been noted, which appear in the reduction of the species diversity of the meadow-steppe faunal complex and the increase in the diversity of forest and near-water complexes. This is due to the transformation of biotops in the park from natural mainly meadow-steppe communities to man-made tree plantations and artificial ponds.

Key words: *vertebrate fauna, fish, amphibians, reptiles, birds, mammals, fauna complexes, rare species, Poltava city park.*