



УДК 582.29

## ***STIGMIDIUM GYROPHORARUM* (ARNOLD) D. HAWKSW. – НОВИЙ ВІД ЛІХЕНОФІЛЬНИХ ГРИБІВ ДЛЯ УКРАЇНИ**

**В. В. Дармостук, Л. М. Гавриленко**

Херсонський державний університет, вул. Університетська, 27, Херсон 73000, Україна  
e-mail: valeriy\_d@i.ua

Наведено дані про новий вид ліхенофільних грибів для території України – *Stigmidium gyrophorarum* (Arnold) D. Hawksw., що вражає слань *Umbilicaria cylindrica* (L.) Delise, яка росте на горизонтальній поверхні пісковиків. Цей ліхенофільний гриб характеризується напівзануреними чорними розсіяними кулястими псевдотеціями, стінкою псевдотеція, що складається з 4–6 шарів параплектичімінних клітин, наявністю розсіяного поверхневого коричневого вегетативного міцелію, бітунікатними яйцеподібними 8-споровими сумками та безбарвними двоклітинними спорами, що звужені біля септи, верхня клітина яких вужча за нижню, з 1–2 олійними краплями у кожній клітині. У статті наведено опис, екологічні особливості, місцевонаходження та поширення для нового виду.

**Ключові слова:** Петрос, Горгани, Карпати, новий вид.

Рід *Stigmidium* Trevis. характеризується чорними напівзануреними кулястими псевдотеціями, коричневою стінкою пседотеція, що складається з псевдопаренхіматозних клітин, бітунікатними сумками з двоклітинними гіаліновими (рідше коричневими зрілими) спорами. На сьогоднішній день відомо 84 види ліхенофільних грибів роду *Stigmidium* [20].

В Україні відомо 11 представників цього роду: *Stigmidium congestum* (Körb.) Triebel [15, 22], *S. glebarum* (Arnold) Hafellner [1], *S. fuscatae* (Arnold) R. Sant. [4, 14], *S. mycobilimbiae* Cl. Roux, Triebel & Etayo [13], *S. microspilum* (Körb.) D. Hawksw. [11], *S. peltideaे* (Vainio) R. Sant. [18], *S. pumilum* (Lettau) Matzer et Hafellner [5], *S. rouxianum* Calatayud & Triebel [2], *S. tabacinae* (Arnold) Triebel [2], *S. schaeereri* (A. Massal.) Trevis. [16], *S. squamariae* (B. de Lesd.) Cl. Roux & Triebel [23], *S. xanthoparmeliacarum* Hafellner [22].

Знахідка *Stigmidium gyrophorarum* (Arnold) D. Hawksw. виявилася новою для території України. Нижче для вказаного виду наводимо опис, місцевонаходження, екологічні особливості, поширення в Україні та світі.

### **МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ**


Зразки ліхенофільного гриба зібрани авторами під час експедиційних досліджень території природного заповідника “Горгани” (1–5 травня 2015 р.) та під час

навчально-польової практики з фізіології та екології рослин на г. Петрос (6–11 червня 2016 р.). Ідентифікацію виду проводили у лабораторії біорізноманіття й екологічного моніторингу ім. Й.К. Пачоського Херсонського державного університету. Для визначення ліхенофільного гриба використовували тимчасові мікроскопічні зрізи лезом, які виготовляли під бінокулярним мікроскопом МБС-1. Деталі будови плодових тіл вивчали під мікроскопом LOMO MICROMED-2. Виміри проводили у воді з точністю до 0,25 мкм для аскоспор, сумок, парафізоїд і клітин псевдотеїя та 5 мкм для інших структур. Цифрові значення представлені як  $(\text{min}) - x \pm \text{SD} (\text{max}) [n]$ , де  $x$  – середнє значення, а  $\text{SD}$  – стандартне відхилення,  $n$  – кількість вимірювань. Фотографії робили за допомогою мікроскопічної кольорової камери “Levenhuk C510 NG”.

Зібрани зразки ліхенофільних грибів зберігають у ліхенологічному гербарії Херсонського державного університету (KHER). Назва виду та прізвища авторів при таксонах подано згідно з Index Fungorum [12].

## РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ І ЇХНЕ ОБГОВОРЕННЯ

*Stigmadium gyrophorarum* (Arnold) D. Hawksw., Kew Bull. 30(1): 201 (1975) (див. рисунок).



*Stigmadium gyrophorarum* (Arnold) D. Hawksw.: А – загальний вигляд (штрих 1 мм); Б – зріз псевдотеїя (штрих 50 мкм); В – стінка псевдотеїя (штрих 10 мкм); Г – вегетативний міцелій (штрих 10 мкм); Д – сумки (штрих 50 мкм); Е – молоді спори (штрих 10 мкм); Ж – зріла спора (штрих 10 мкм)

*Stigmadium gyrophorarum* (Arnold) D. Hawksw.: А – habitat (bar 1 μm); Б – section through pseudothecium (bar 50 μm); В – pseudothecial wall (bar 10 μm); Г – vegetative mycelium (bar 10 μm); Д – asci (bar 50 μm); Е – young spores (bar 10 μm); Ж – mature spore (bar 10 μm)

Вегетативний міцелій поверхневий, коричневий, розгалужений,  $(4,5)-5,75 \pm 0,75(-7,75)$  [n = 20] мкм завтовшки. Псевдотеїї сферичні до напівсферичних, напів-

занурені, поодинокі, темно-коричневі,  $(75\text{--}90)\pm10\text{--}110$  [n = 15] мкм у діаметрі. Стінки псевдотеція темно-коричневі у верхній частині й оливкові у нижній частині, пігмент аморфний, відкладається більш-менш рівномірно у клітинних оболонках,  $(13\text{--}16)\pm5\text{--}20$  [n=15] мкм завтовшки, складається з 4–6 шарів параплектичін-хімічних клітин розмірами  $(5,25\text{--}6,5)\pm1,0\text{--}8,75$  на  $(2,75\text{--}4,0)\pm0,5\text{--}5,25$  [n = 20] мкм. Сумки бітунікатні, яйцеподібні, 8-спорові,  $(50\text{--}55)\pm5\text{--}65\times(15\text{--}20)\pm2\text{--}25$  [n = 10] мкм. Аскоспори безбарвні, рідше оливкові, коли дозрілі, еліпсоїдні, дво-клітинні, звужені біля септи, верхня клітина ширша за нижню, з 1–2 олійними краплями в кожній клітині, молоді спори з безбарвним епіспорієм,  $(14,75\text{--}16,5)\pm0,75\text{--}17,75\times(6,75\text{--}7,5)\pm0,5\text{--}8,5$  [n = 25] мкм. Відношення довжини до ширини становить  $(1,8\text{--}2,1)\pm0,15\text{--}2,4$ . Піknіди не виявлені.

**Екологія.** Вид утворює чорні розсіяні напівзанурені псевдотеції на слані *Umbilicaria cylindrica* (L.) Delise, що росте на пісковиках разом з *Rhizocarpon lecanorinum* Anders та *Lecanora polytropa* s. lat.

**Місцевонаходження.** Україна. Закарпатська обл.: Рахівський р-н, південно-західний схил г. Петрос, на *Umbilicaria cylindrica*, на пісковиках, 08.06.2016, leg. Гавриленко Л.М., det. Дармостук В.В. (KHER 10021, 10022); Івано-Франківська обл.: Надвірнянський р-н, природний заповідник "Горгани", квартал 11, виділ 3, кам'яні розсипи,  $48^{\circ}47'19.7''$  N,  $24^{\circ}29'42.2''$  E, alt. 1070 м н.р.м., на *Umbilicaria cylindrica*, на пісковиках, 03.05.2015, leg. & det. Ходосовцев О.Є., Дармостук В.В., Громакова А.Б. (KHER 8941).

**Поширення.** Ліхенофільний гриб відомий з Австрії [7], Болівії [6], Великої Британії [10], Індії [25], Ісландії [3], Німеччини [21], Норвегії [24], Польщі [19], Росії [26], США [8], Таджикистану [17], Туреччини [9].

Автори щиро вдячні проф. І.І. Мойсієнку, канд. пед. наук І.І. Карташовій, канд. біол. наук Р.П. Мельник, канд. біол. наук А.Б. Громаковій за дружню підтримку під час проведення експедиційних досліджень і проф. О.Є. Ходосовцеву за цінні зауваження щодо статті.

1. Boyko T.O. The lichens and lichenicolous fungi of limestone outcrops of the nature reserve "Yelanetsky step". **Chornomorski Botanical Journal**, 2008; 4(1): 84–88. (In Ukrainian).
2. Bielczyk U., Bylinska E., Czarnota P. et al. Contribution to the knowledge of lichens and lichenicolous fungi of western Ukraine. **Polish Botanical Journal**, 2005; 50(1): 39–64.
3. Brackel W. v. Some lichenicolous fungi and lichens from Iceland, including *Lichenopeltella uncialicola* sp. nov. **Herzogia**, 2010; 23: 93–109.
4. Fedorenko N.M. New and rare lichenicolous fungi from Ukraine. **Ukr. Botan. Zhurn**, 2006; 63(2): 190–195. (In Ukrainian).
5. Fedorenko N.M., Nadeina O.V., Kondratyuk S.Ya. New and rare lichenicolous fungi from Ukraine. **Ukr. Botan. Zhurn**, 2007; 64(1): 47–56. (In Ukrainian).
6. Flakus A., Kukwa M. New records of lichenicolous fungi from Bolivia. **Opuscula Philolichenum**, 2012; 11: 36–48.
7. Hafellner J., Sancho L.G. Über einige lichenicole Pilze und Flechten aus den Gebirgen Zentralspaniens und den Ostalpen. **Herzogia**, 1990; 8: 363–382.
8. Hafellner J., Triebel D., Ryan B., Nash III T. On lichenicolous fungi from North America. II. **Mycotaxon**, 2002; 84: 293–329.
9. Halici M.G., Candan M., Türk A.O. New records of lichenicolous and lichenized fungi from Turkey. **Mycotaxon**, 2007; 100: 255–260.

10. Hawksworth D.L. Notes on British lichenicolous fungi, I. *Kew Bulletin*, 1975; 30: 183–203.
11. Hawksworth D.L. Nine lichenicolous fungi from Transcarpathians new for Ukraine. *Ukr. Botan. Zhurn.*, 1992; 49(3): 99–101.
12. **Index Fungorum.** <http://www.indexfungorum.org/names/names.asp>
13. Khodosovtsev A.Ye., Darmostuk V.V., Nazarchuk Yu.S. Lichens and lichenicolous fungi of the Regional Landscape Park "Tiligulskiy" (Odessa region, Ukraine). *Chornomorski Botanical Journal*, 2016; 12 (2): 165–177. (In Ukrainian).
14. Khodosovtsev A.Ye., Darmostuk V.V., Gromakova A.B., Shpilchak M.B. A first contribution to lichens and lichenicolous fungi of the Nature Reserve "Gorgany" (Ukraine). *Chornomorski Botanical Journal*, 2015; 12 (1): 51–63. (In Ukrainian).
15. Khodosovtsev A., Dymytrova L., Nadyeina O. et al. A contribution to beech forest-associated epiphytic lichen-forming and lichenicolous fungi in Crimean Mts (Ukraine). *Fl. Medit.*, 2013; 23: 57–68.
16. Kondratyuk S.Ya., Khodosovtsev A.Ye. The new for Ukraine species of lichenicolous fungi. *Ukr. Botan. Zhurn.*, 1997; 54(6): 588–590. (In Ukrainian).
17. Kondratyuk S.Ya., Kudratov I. New for Tajikistan lichenicolous and lichen-forming fungi. *Ukr. Botan. Zhurn.*, 2002; 59(2): 165–170.
18. Kondratyuk S.Ya., Popova L.P., Lackovicova A., Pisut I. 2003. **A catalogue of the Eastern Carpathian Lichens.** Kyiv; Bratislava: M.H. Kholodny Institute of Botany, 2003. 264 p.
19. Kukwa M., Flakus A. New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland VII. Species mainly from Tatra Mountains. *Herzogia*, 2009; 22: 191–211.
20. Lawrey J.D., Diederich P. **Lichenicolous fungi – worldwide checklist, including isolated cultures and sequences available.** 2016. available at: <http://www.lichenicolous.net>
21. Lettau G. Flechten aus Mitteleuropa XIV. (Schluss). *Feddes Repert.*, 1958; 61/2: 105–171.
22. Naumovich A.O., Darmostuk V.V. Lichenicolous fungi the valley of river Ingulets. *Chornomorski Botanical Journal*, 2015; 11(4): 512–520. (In Ukrainian).
23. Pirogov M.V. Lichenicolous fungi of the Ukrainian Roztochya. *Visnyk of the Lviv University. Series Biology*, 2012; 59: 73–81. (In Ukrainian).
24. Santesson R. Svampar som leva på lavar. *Svensk Bot. Tidskr.*, 1949; 43: 141–143.
25. Zhurbenko M.P. A first list of lichenicolous fungi from India. *Mycobiotika*, 2013; 3: 19–34.
26. Zhurbenko M.P., Santesson R. Lichenicolous fungi from the Russian Arctic. *Herzogia*, 1996; 12: 147–161.

## **STIGMIDIUM GYROPHORARUM (ARNOLD) D. HAWKSW. IS A NEW SPECIES OF LICHENICOLOUS FUNGI FOR UKRAINE**

**V. V. Darmostuk, L. M. Gavrylenko**

*Kherson State University, 27, Universitetska St., Kherson 73000, Ukraine*

e-mail: valeriy\_d@i.ua

Data about *Stigmidiump gyrophorarum* (Arnold) D. Hawksw. as a new species of lichenicolous fungi for Ukraine are presented. Growth of this lichenicolous fungus on thallus of *Umbilicaria cylindrica* (L.) Delise on the horizontal surface of the sandstone. This species is characterized by brown vegetative mycelium, black globose semi-immersed perithecioid ascomata, pale brown ascomatal wall that is composed of 4–6 layers of cells, subcylindrical, bitunicate, 8-spored asci and 1-septate ascospores, hyaline at first but becoming olivaceous with age. Each spore has an upper cell larger than the lower cell and contained a few oil drops. The descriptions, illustrations, localities, ecological and distribution data for new species are provided.

**Keywords:** Petros, Gorgany, Carpathians, new species.

**STIGMIDIUM GYROPHORARUM (ARNOLD) D. HAWKSW. – НОВЫЙ ВИД  
ЛИХЕНОФИЛЬНЫХ ГРИБОВ ДЛЯ УКРАИНЫ****В.В. Дармостук, Л.Н. Гавриленко**Херсонський державний університет  
ул. Університетська, 27, Херсон 73000, Україна  
e-mail: valeriy\_d@i.ua

Представлены данные о новом виде лихенофильных грибов для территории Украины – *Stigmidiump gyrophorarum* (Arnold) D. Hawksw., развивающемся на таломе *Umbilicaria cylindrica* (L.) Delise, которая растет на горизонтальной поверхности песчаников. Данный лихенофильный гриб характеризуется наличием черных полу-погруженных рассеянных псевдотециев, стенка которых состоит из 4–6 слоев коричневых параплектических клеток, наличием поверхностного коричневого вегетативного мицелия, битуникатными яйцевидными 8-споровыми сумками и бесцветными двухклеточными спорами, суженными возле септы, верхняя клетка которых уже чем нижняя, с 1–2 масляными каплями в каждой клетке. В статье представлено описание вида, местонахождения в Украине, экологические особенности и общее распространение данного вида.

**Ключевые слова:** Пэтрос, Горганы, Карпаты, новый вид.

Одержано: 10.11.2016