

Львівський національний університет імені Івана Франка,  
Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача  
НАН України, Львів

## НЕЛОКАЛЬНА ОБЕРНЕНА ЗАДАЧА ДЛЯ РІВНЯННЯ ДИФУЗІЇ В ОБЛАСТІ З ВІЛЬНОЮ МЕЖЕЮ

Встановлено умови однозначної розв'язності оберненої задачі для нелокального рівняння дифузії в області з вільною межею.

We establish unique solvability conditions for the inverse problem to the nonlocal diffusion equation in a free boundary domain.

Завдяки можливостям визначення параметрів різноманітних за своєю природою процесів шляхом математичних розрахунків без проведення фізичних експериментів, обернені задачі набули широкого практичного застосування у багатьох галузях науки і техніки. Вагоме місце серед цих задач займають коефіцієнтні обернені задачі, в яких до невідомих належить один або декілька коефіцієнтів рівняння. Задачі такого типу в областях з відомими межами достатньо повно вивчені. Зокрема, в роботах [1]–[5] вивчались обернені задачі визначення залежного від часу старшого коефіцієнта в одновимірних параболічних рівняннях. У [6] встановлено умови однозначної розв'язності оберненої задачі визначення коефіцієнта  $a(s)$  параболічного рівняння

$$u_t = a \left( \int_0^h u(x, t) dx \right) u_{xx} + f(x, t),$$

$$(x, t) \in (0, h) \times (0, T).$$

Така задача є математичною моделлю міграції популяції у випадку, коли швидкість міграції є невідомою. Задачі, в яких коефіцієнт  $a(s)$  відомий, розглядалися в роботах [7, 8].

Багато практично важливих задач моделюється задачами з вільними межами. Такі задачі можна звести до коефіцієнтних обернених задач в областях з фіксованими межами, в яких невідомим параметром є межа

області або її частина. Тому розгляд задач з вільними межами разом з оберненими задачами є природним. У роботах [9]–[11] досліджено обернені задачі визначення залежного від часу старшого коефіцієнта в одновимірних параболічних рівняннях в області, частина або вся межа якої є невідомою.

У даній роботі розглядається обернена задача для нелокального рівняння дифузії з невідомим старшим коефіцієнтом в області з вільною межею.

**1. Формулювання задачі.** В області  $\Omega_T = \{(x, t) : 0 < x < h(t), 0 < t < T\}$ , де  $h = h(t)$  – невідома функція, розглядаємо обернену задачу визначення коефіцієнта  $a(s) > 0$  параболічного рівняння

$$u_t = a \left( \int_0^{h(t)} u(x, t) dx \right) u_{xx} + f(x, t),$$

$$(x, t) \in \Omega_T, \quad (1)$$

з початковою умовою

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad x \in [0, h(0)], \quad (2)$$

крайовими умовами

$$u(0, t) = \mu_1(t), \quad u(h(t), t) = \mu_2(t),$$

$$t \in [0, T], \quad (3)$$

та умовами перевизначення

$$a \left( \int_0^{h(t)} u(x, t) dx \right) u_x(0, t) = \mu_3(t),$$

$$h'(t) = -u_x(h(t), t) + \mu_4(t), \quad t \in [0, T], \quad (4)$$

$$h(0) = h_0, \quad (5)$$

де  $h_0 > 0$  – задане число.

Увівши нову змінну  $y = \frac{x}{h(t)}$ , задачу (1)–(5) зводимо до оберненої задачі з невідомими  $(h(t), a(s), v(y, t))$  в області з відомою межею  $Q_T = \{(y, t) : 0 < y < 1, 0 < t < T\}$  :

$$v_t = \frac{1}{h^2(t)} a \left( h(t) \int_0^1 v(y, t) dy \right) v_{yy} +$$

$$+ \frac{yh'(t)}{h(t)} v_y + f(yh(t), t), \quad (y, t) \in Q_T, \quad (6)$$

$$v(y, 0) = \varphi(yh_0), \quad y \in [0, 1], \quad (7)$$

$$v(0, t) = \mu_1(t), \quad v(1, t) = \mu_2(t), \quad t \in [0, T], \quad (8)$$

$$a \left( h(t) \int_0^1 v(y, t) dy \right) v_y(0, t) = h(t) \mu_3(t),$$

$$t \in [0, T], \quad (9)$$

$$h'(t) = -\frac{v_y(1, t)}{h(t)} + \mu_4(t), \quad t \in [0, T], \quad (10)$$

$$h(0) = h_0, \quad (11)$$

де  $v(y, t) = u(yh(t), t)$ .

## 2. Існування розв'язку задачі (6)–(11).

**Теорема 1.** Припустимо, що виконуються умови:

$$1) f \in C^{1,0}([0, \infty) \times [0, T]), \quad \varphi \in C^1[0, h_0],$$

$$\mu_i \in C^1[0, T], \quad i = 1, 2, \quad \mu_j \in C[0, T],$$

$$j = 3, 4;$$

$$2) f(x, t) \geq 0, \quad (x, t) \in ([0, \infty) \times [0, T]),$$

$$\varphi'(x) > 0, \quad x \in [0, h_0], \quad \mu_2(t) < 0,$$

$$\mu_3(t) > 0, \quad \mu_2(t)\mu_4(t) - \mu_3(t) > 0,$$

$$t \in [0, T];$$

$$3) \varphi(0) = \mu_1(0), \quad \varphi(h_0) = \mu_2(0).$$

Тоді можна вказати таке число  $T_0$ ,  $0 < T_0 \leq T$ , що існує розв'язок  $(h, a, v) \in C^1[0, T_0] \times C[0, S] \times C^{2,1}(Q_{T_0}) \cap C^{1,0}(\overline{Q_{T_0}})$  задачі (6)–(11), такий що  $h(t) > 0$ ,  $t \in [0, T_0]$ ,  $a(s) > 0$ ,  $s \in [0, S]$ ,

де числа  $T_0, S$  визначаються вихідними даними задачі.

**Доведення.** Існування розв'язку задачі (6)–(11) доводиться шляхом зведення задачі до системи рівнянь відносно невідомих та застосування до неї теореми Шаудера про нерухому точку цілком неперервного оператора. Припустимо тимчасово, що функції  $h(t) > 0$ ,  $a(s) > 0$  відомі. Позначимо

$$b(t) = a \left( h(t) \int_0^1 v(y, t) dy \right), \quad w(y, t) = v_y(y, t).$$

Пряма задача (6)–(8) еквівалентна системі рівнянь

$$v(y, t) = v_0(y, t) + \int_0^t \int_0^1 G_1(y, t, \eta, \tau) \times$$

$$\times \frac{\eta h'(\tau)}{h(\tau)} w(\eta, \tau) d\eta d\tau, \quad (y, t) \in \overline{Q_T},$$

$$w(y, t) = v_{0y}(y, t) + \int_0^t \int_0^1 G_{1y}(y, t, \eta, \tau) \times$$

$$\times \frac{\eta h'(\tau)}{h(\tau)} w(\eta, \tau) d\eta d\tau, \quad (y, t) \in \overline{Q_T}, \quad (12)$$

де  $v_0(y, t)$ ,  $v_{0y}(y, t)$  визначаються формулами

$$v_0(y, t) = \int_0^1 G_1(y, t, \eta, 0) \varphi(\eta h_0) d\eta +$$

$$+ \int_0^t G_{1\eta}(y, t, 0, \tau) \frac{b(\tau)}{h^2(\tau)} \mu_1(\tau) d\tau -$$

$$- \int_0^t G_{1\eta}(y, t, 1, \tau) \frac{b(\tau)}{h^2(\tau)} \mu_2(\tau) d\tau +$$

$$+ \int_0^t \int_0^1 G_1(y, t, \eta, \tau) f(\eta h(\tau), \tau) d\eta d\tau,$$

$$v_{0y}(y, t) = h_0 \int_0^1 G_2(y, t, \eta, 0) \varphi'(\eta h_0) d\eta -$$

$$\begin{aligned}
& - \int_0^t G_2(y, t, 0, \tau) \mu'_1(\tau) d\tau + \\
& + \int_0^t G_2(y, t, 1, \tau) \mu'_2(\tau) d\tau + \\
& + \int_0^t \int_0^1 G_{1y}(y, t, \eta, \tau) f(\eta h(\tau), \tau) d\eta d\tau. \quad (13)
\end{aligned}$$

Через  $G_k(y, t, \eta, \tau)$ ,  $k = 1, 2$ , позначено функції Гріна першої ( $k = 1$ ) та другої ( $k = 2$ ) крайових задач для рівняння

$$v_t = \frac{b(t)}{h^2(t)} v_{yy}, \quad (y, t) \in Q_T.$$

Вони визначаються формулами

$$\begin{aligned}
G_k(y, t, \eta, \tau) &= \frac{1}{2\sqrt{\pi(\theta(t) - \theta(\tau))}} \times \\
&\times \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left( \exp\left(-\frac{(y - \eta + 2n)^2}{4(\theta(t) - \theta(\tau))}\right) + \right. \\
&\left. + (-1)^k \exp\left(-\frac{(y + \eta + 2n)^2}{4(\theta(t) - \theta(\tau))}\right) \right), \\
k = 1, 2, \quad \theta(t) &= \int_0^t \frac{b(\tau)}{h^2(\tau)} d\tau.
\end{aligned}$$

З умови (10) отримуємо

$$h'(t) = -\frac{w(1, t)}{h(t)} + \mu_4(t), \quad t \in [0, T]. \quad (14)$$

Використавши (14), подамо (12) у вигляді

$$\begin{aligned}
w(y, t) &= v_{0y}(y, t) + \int_0^t \int_0^1 G_{1y}(y, t, \eta, \tau) \times \\
&\times \left( \frac{\eta \mu_4(\tau)}{h(\tau)} - \frac{\eta w(1, \tau)}{h^2(\tau)} \right) w(\eta, \tau) d\eta d\tau, \\
&\quad (y, t) \in \bar{Q}_T. \quad (15)
\end{aligned}$$

З умови (9), врахувавши введені позначення, отримуємо

$$b(t)w(0, t) = h(t)\mu_3(t), \quad t \in [0, T]. \quad (16)$$

Проінтегрувавши (14) за змінною  $t$ , одержуємо

$$\begin{aligned}
h(t) &= h_0 + \int_0^t \mu_4(\tau) d\tau - \int_0^t \frac{w(1, \tau)}{h(\tau)} d\tau, \\
t &\in [0, T]. \quad (17)
\end{aligned}$$

Отже, задачу (6)–(11) зведено до системи рівнянь (15)–(17) відносно невідомих  $(w(y, t), b(t), h(t))$ . Для доведення існування розв'язку системи рівнянь (15)–(17) застосуємо теорему Шаудера про нерухому точку цілком неперервного оператора. Для цього встановимо апіорні оцінки розв'язків системи рівнянь. Оскільки

$$\int_0^1 G_2(y, t, \eta, 0) d\eta = 1,$$

то згідно з умовами теореми перший доданок (13) додатний, всі інші доданки (13), (12) прямують до 0 при  $t \rightarrow 0$ . Отже, можна вказати таке число  $t_1, 0 < t_1 \leq T$ , що

$$\begin{aligned}
w(y, t) &\geq \frac{h_0}{2} \min_{y \in [0, 1]} \varphi'(yh_0) := M_0 > 0, \\
&\quad (y, t) \in \bar{Q}_{t_1}. \quad (18)
\end{aligned}$$

Число  $t_1$  визначається нерівністю

$$\begin{aligned}
& \left| - \int_0^t G_2(y, t, 0, \tau) \mu'_1(\tau) d\tau + \right. \\
& + \int_0^t G_2(y, t, 1, \tau) \mu'_2(\tau) d\tau + \\
& + \int_0^t \int_0^1 G_{1y}(y, t, \eta, \tau) \left( f(\eta h(\tau), \tau) + \right. \\
& \left. + \left( \frac{\eta \mu_4(\tau)}{h(\tau)} - \frac{\eta w(1, \tau)}{h^2(\tau)} \right) w(\eta, \tau) \right) d\eta d\tau \left| \leq \right. \\
& \leq M_0 \quad (y, t) \in \bar{Q}_{t_1}.
\end{aligned}$$

Тоді для розв'язків рівнянь (17), (16) виконуються оцінки

$$h(t) \leq H_1 < \infty, \quad t \in [0, T], \quad (19)$$

$$b(t) \leq \frac{H_1}{M_0} \max_{[0, T]} \mu_3(t) := B_1 < \infty, \quad t \in [0, t_1]. \quad (20)$$

Оскільки всі доданки (17), крім першого, прямують до нуля при  $t \rightarrow 0$ , то існує таке число  $t_2, 0 < t_2 \leq T$ , яке визначається нерівністю

$$\left| \int_0^t \mu_4(\tau) d\tau - \int_0^t \frac{w(1, \tau)}{h(\tau)} d\tau \right| \leq \frac{h_0}{2}, \quad t \in [0, t_2],$$

що

$$h(t) \geq \frac{h_0}{2} \equiv H_0 > 0, \quad t \in [0, t_2]. \quad (21)$$

Позначимо  $W(t) = \max_{y \in [0, 1]} w(y, t)$ . Врахувавши (21), з (16) отримуємо

$$b(t) \geq \frac{H_0}{W(t)} \min_{[0, T]} \mu_3(t), \quad t \in [0, t_2]. \quad (22)$$

Використавши (19) та оцінки функції Гріна

$$|G_2(y, t, \eta, \tau)| \leq C_1 \left( 1 + \frac{1}{\sqrt{\theta(t) - \theta(\tau)}} \right),$$

$$\int_0^1 |G_{1y}(y, t, \eta, \tau)| d\eta \leq \frac{C_2}{\sqrt{\theta(t) - \theta(\tau)}},$$

з (15) отримуємо нерівність

$$W(t) \leq C_3 + C_4 \int_0^t \frac{d\tau}{\sqrt{\theta(t) - \theta(\tau)}} + C_5 \int_0^t \frac{(1 + W(\tau))W(\tau) d\tau}{h^2(\tau) \sqrt{\theta(t) - \theta(\tau)}}, \quad t \in [0, t_3],$$

де  $t_3 = \min\{t_1, t_2\}$ .

Врахувавши (18), (22) і позначивши  $W_1(t) = W(t) + 1$ , попередню нерівність зведемо до вигляду

$$W_1(t) \leq C_6 + C_7 \int_0^t \frac{b(\tau)W_1^4(\tau) d\tau}{h^2(\tau) \sqrt{\theta(t) - \theta(\tau)}}, \quad t \in [0, t_3]. \quad (23)$$

Піднесемо обидві частини нерівності до четвертого степеня і застосуємо нерівність Гельдера

$$W_1^4(t) \leq C_8 + C_9 \int_0^t \frac{b(\tau)W_1^{16}(\tau) d\tau}{h^2(\tau) \sqrt{\theta(t) - \theta(\tau)}}.$$

Замінивши  $t$  на  $\sigma$ , домножимо попередню нерівність на  $\frac{b(\sigma)}{h^2(\sigma) \sqrt{\theta(t) - \theta(\sigma)}}$  та проінтегруємо від 0 до  $t$ :

$$\int_0^t \frac{b(\sigma)W_1^4(\sigma) d\sigma}{h^2(\sigma) \sqrt{\theta(t) - \theta(\sigma)}} \leq C_{10} + C_9 \times \int_0^t \frac{b(\sigma) d\sigma}{h^2(\sigma) \sqrt{\theta(t) - \theta(\sigma)}} \int_0^\sigma \frac{b(\tau)W_1^{16}(\tau) d\tau}{h^2(\tau) \sqrt{\theta(\sigma) - \theta(\tau)}}.$$

Змінивши порядок інтегрування у другому доданку правої частини нерівності та використавши рівність

$$\int_\tau^t \frac{b(\sigma) d\sigma}{h^2(\sigma) \sqrt{(\theta(t) - \theta(\sigma))(\theta(\sigma) - \theta(\tau))}} = \pi,$$

одержуємо

$$\int_0^t \frac{b(\sigma)W_1^4(\sigma) d\sigma}{h^2(\sigma) \sqrt{\theta(t) - \theta(\sigma)}} \leq C_{10} + C_{11} \int_0^t \frac{b(\tau)W_1^{16}(\tau) d\tau}{h^2(\tau)},$$

або, з урахуванням (20), (21),

$$\int_0^t \frac{b(\sigma)W_1^4(\sigma) d\sigma}{h^2(\sigma) \sqrt{\theta(t) - \theta(\sigma)}} \leq C_{10} + C_{12} \int_0^t W_1^{16}(\tau) d\tau. \quad (24)$$

Підставивши (24) в (23), отримуємо

$$W_1(t) \leq C_{13} + C_{14} \int_0^t W_1^{16}(\tau) d\tau.$$

Позначимо  $K(t) = C_{13} + C_{14} \int_0^t W_1^{16}(\tau) d\tau$ . Тоді

$$K'(t) \leq C_{14} K^{16}(t).$$

Проінтегрувавши це співвідношення від 0 до  $t$ , знаходимо

$$K(t) \leq \frac{C_{13}}{\sqrt[15]{1 - 15C_{13}^{15}C_{14}t}} \leq C_{15}, \quad t \in [0, T_0],$$

де число  $T_0, 0 < T_0 \leq t_3$ , задовольняє умову  $1 - 15C_{13}^{15}C_{14}T_0 > 0$ .

Звідси отримуємо оцінки

$$W(t) \leq M_1 < \infty, \quad t \in [0, T_0],$$

$$b(t) \geq \frac{H_0}{M_1} \min_{[0, T]} \mu_3(t) := B_0 > 0, \quad t \in [0, T_0].$$

Подамо систему рівнянь (15)–(17) у вигляді операторного рівняння

$$\omega = P\omega,$$

де  $\omega = (w(y, t), b(t), h(t))$ , а оператор  $P = (P_1, P_2, P_3)$  визначається правими частинами рівнянь (15)–(17).

Позначимо  $N = \{(w, b, h) \in C(\overline{Q}_{T_0}) \times (C[0, T_0])^2 : M_0 \leq w(y, t) \leq M_1, B_0 \leq b(t) \leq B_1, H_0 \leq h(t) \leq H_1\}$ . З наведених вище оцінок випливає, що множина  $N$  задовольняє умови теореми Шаудера про нерухому точку, а оператор  $P$  переводить  $N$  в себе. Компактність множини  $PN$  у просторі неперервних функцій доведено в [12].

Отже, за теоремою Шаудера про нерухому точку існує розв'язок  $(w, b, h) \in C(\overline{Q}_{T_0}) \times (C[0, T_0])^2, b(t) > 0, h(t) > 0, t \in [0, T_0]$  системи рівнянь (15)–(17).

Позначимо

$$q(t) = h(t) \int_0^1 v(y, t) dy.$$

Тоді

$$b(t) = a(q(t)), \quad t \in [0, T].$$

Знайдемо похідну функції  $q(t)$

$$q'(t) = h'(t) \int_0^1 v(y, t) dy + h(t) \int_0^1 v_t(y, t) dy.$$

Використавши рівняння (5) і введені позначення, отримуємо

$$q'(t) = \frac{b(t) - \mu_2(t)}{h(t)} v_y(1, t) + \mu_2(t) \mu_4(t) - \mu_3(t) + h(t) \int_0^1 f(yh(t), t) dy.$$

Згідно з (18) та умовами теореми маємо

$$q'(t) > 0, \quad t \in [0, T_0].$$

Отже, існує неперервна функція  $q^{-1}(s)$ , визначена на  $[0, S]$ , така що

$$q(q^{-1}(s)) := s, \quad s \in [0, S], \quad S = \max_{[0, T]} q(t).$$

Звідси

$$a(s) = b(q^{-1}(s)), \quad s \in [0, S].$$

Отже, існує розв'язок  $(h, a, v) \in C^1[0, T_0] \times C[0, S] \times C^{2,1}(Q_{T_0}) \cap C^{1,0}(\overline{Q}_{T_0}), h(t) > 0, t \in [0, T_0], a(s) > 0, s \in [0, S]$  задачі (6)–(11).

**Зауваження.** Якщо в теоремі 1  $\varphi \in C^2[0, h_0]$ , то існує розв'язок  $(h, a, v) \in C^1[0, T_0] \times C[0, S] \times C^{2,1}(\overline{Q}_{T_0}), h(t) > 0, t \in [0, T_0], a(s) > 0, s \in [0, S]$  задачі (6)–(11).

### 3. Єдиність розв'язку задачі (6)–(11).

**Теорема 2.** За умов

$$f \in C^{1,0}([0, \infty) \times [0, T]), \quad \varphi \in C^2[0, h_0],$$

$$\mu_3(t) \neq 0, \quad t \in [0, T]$$

задача (6)–(11) не може мати двох різних розв'язків  $(h, a, v) \in C^1[0, T] \times C[0, S] \times C^{2,1}(\overline{Q}_T), h(t) > 0, t \in [0, T], a(s) > 0, s \in [0, S]$ , де число  $S$  визначається вихідними даними задачі.

**Доведення.** Припустимо, що  $(h_i(t), a_i(s), v_i(y, t)), i = 1, 2$ , – два розв'язки задачі (6)–(11). Позначимо

$$b_i = a_i \left( h_i(t) \int_0^1 v_i(y, t) dy \right),$$

$$\frac{b_i(t)}{h_i^2(t)} = s_i(t), \quad \frac{h'_i(t)}{h_i(t)} = p_i(t), \quad i = 1, 2,$$

$$s(t) = s_1(t) - s_2(t), \quad p(t) = p_1(t) - p_2(t), \\ v(y, t) = v_1(y, t) - v_2(y, t).$$

Функції  $s(t), p(t), v(y, t)$  задовольняють рівняння

$$v_t = s_1(t)v_{yy} + yp_1(t)v_y + s(t)v_{2yy} + \\ + yp(t)v_{2y} + f(yh_1(t), t) - \\ - f(yh_2(t), t), \quad (y, t) \in Q_T, \quad (25)$$

та умови

$$v(y, 0) = 0, \quad y \in [0, 1], \quad (26)$$

$$v(0, t) = v(1, t) = 0, \quad t \in [0, T], \quad (27)$$

$$s(t)v_{2y}(0, t) + s_1(t)v_y(0, t) = \\ = \mu_3(t) \left( \frac{1}{h_1(t)} - \frac{1}{h_2(t)} \right), \quad t \in [0, T], \quad (28)$$

$$p(t) = -\frac{v_y(1, t)}{h_1^2(t)} - v_{2y}(1, t) \left( \frac{1}{h_1^2(t)} - \frac{1}{h_2^2(t)} \right) + \\ + \mu_4(t) \left( \frac{1}{h_1(t)} - \frac{1}{h_2(t)} \right), \quad t \in [0, T]. \quad (29)$$

За допомогою функції Гріна  $G_1^*(y, t, \eta, \tau)$  першої крайової задачі для рівняння

$$v_t = s_1(t)v_{yy} + yp_1(t)v_y$$

з урахуванням умов (26), (27) функцію  $v(y, t)$  подамо у вигляді

$$v(y, t) = \int_0^t \int_0^1 G_1^*(y, t, \eta, \tau) (s(\tau)v_{2\eta\eta}(\eta, \tau) + \\ + \eta p(\tau)v_{2\eta}(\eta, \tau) + f(\eta h_1(\tau), \tau) - \\ - f(\eta h_2(\tau), \tau)) d\eta d\tau, \quad (y, t) \in \bar{Q}_T. \quad (30)$$

Продиференціювавши (30) за змінною  $y$ , одержуємо

$$v_y(y, t) = \int_0^t \int_0^1 G_{1y}^*(y, t, \eta, \tau) (s(\tau)v_{2\eta\eta}(\eta, \tau) + \\ + \eta p(\tau)v_{2\eta}(\eta, \tau) + f(\eta h_1(\tau), \tau) - \\ - f(\eta h_2(\tau), \tau)) d\eta d\tau, \quad (y, t) \in \bar{Q}_T. \quad (31)$$

Виразимо  $h_i(t)$  через  $p_i(t)$

$$h_i(t) = h_i(0) \exp\left(\int_0^t p_i(\tau) d\tau\right), \quad i = 1, 2,$$

де  $h_1(0) = h_2(0) = h_0$ . Звідси, використовуючи рівність

$$e^x - e^y = (x - y) \int_0^1 e^{y+\tau(x-y)} d\tau,$$

отримуємо

$$\frac{1}{h_1(t)} - \frac{1}{h_2(t)} = -\frac{1}{h_0} \int_0^t p(\tau) d\tau \times \\ \times \int_0^1 \exp\left(-\int_0^t (\sigma p(\tau) + p_2(\tau)) d\tau\right) d\sigma. \quad (32)$$

Рівність (32) можемо аналогічно використати для зображення різниць  $h_1(t) - h_2(t)$ ,  $\frac{1}{h_1^2(t)} - \frac{1}{h_2^2(t)}$ .

Припущення теореми забезпечують правильність рівності

$$f(yh_1(t), t) - f(yh_2(t), t) = y(h_1(t) - h_2(t)) \times \\ \times \int_0^1 f_x(y(h_2(t) + \sigma(h_1(t) - h_2(t))), t) d\sigma. \quad (33)$$

Підставивши (31)–(33) в (28), (29), одержимо систему однорідних інтегральних рівнянь Вольтерра другого роду відносно невідомих  $s(t), p(t)$  з ядрами, які мають інтегровні особливості. Таким чином,

$$p(t) = 0, \quad s(t) = 0, \quad t \in [0, T].$$

Звідси отримуємо, що

$$p_1(t) = p_2(t), \quad s_1(t) = s_2(t), \quad t \in [0, T],$$

а, отже,

$$h_1(t) = h_2(t), \quad b_1(t) = b_2(t).$$

Використавши це в задачі (25)–(27), одержуємо

$$v_1(y, t) = v_2(y, t), \quad (y, t) \in \bar{Q}_T.$$

---

## СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. *Jones B.F.* The determination of a coefficient in a parabolic differential equation. I. Existence and uniqueness // *J. Math. Mech.* – 1962. – **11**, № 5. – P. 907–918.
2. *Cannon J.R., Rundell W.* Recovering a time dependent coefficient in a parabolic differential equation // *J. Math. Anal. Appl.* – 1991. – **160**. – P. 572–582.
3. *Иванчов Н.И.* Об определении зависящего от времени старшего коэффициента в параболическом уравнении // *Сиб. мат. журнал.* – 1998. – **39**, № 3. – С. 539–550.
4. *Ivanchov M.I.* Inverse problem for finding a major coefficient in a parabolic equation // *Мат. студії.* – 1997. – **8**, № 2. – С. 212–220.
5. *Пабури́вська Н.В., Власов В.А.* Визначення старшого коефіцієнта у параболічному рівнянні // *Мат. методи та фіз.-мех. поля.* – 2006. – **49**, № 3. – С. 18–25.
6. *Ivanchov M.* A nonlocal inverse problem for the diffusion equation // *Вісн. Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат.* – 2012. – Вип. 77. – С. 103–108.
7. *Chipot M., Lovat B.* On the asymptotic behaviour of some nonlocal problems // *Positivity.* – 1999. – **3**. – P. 65–81.
8. *Chipot M., Molinet L.* Asymptotic behaviour of some nonlocal diffusion problems // *Applicable Analysis.* – 2001. – **80**. – P. 279–315.
9. *Иванчов М.И.* Обернена задача з вільною межею для рівняння теплопровідності // *Укр. мат. журн.* – 2003. – **55**, № 7. – С. 901–910.
10. *Баранська І.* Визначення старшого коефіцієнта у параболічному рівнянні в області з невідомими межами // *Вісн. Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат.* – 2005. – Вип. 64. – С. 20–38.
11. *Иванчов М.И., Снітко Г.А.* Визначення залежних від часу коефіцієнтів параболічного рівняння в області з вільною межею // *Нелінійні граничні задачі.* – 2011. – **20**. – С. 28–44.
12. *Ivanchov M.* Inverse problems for equations of parabolic type // *Lviv: VNTL Publ., 2003.* – 238 p. – (Math. Studies: Monograph Ser. – Vol. 10.)