

СПАДКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПСОРІАЗУ НА ПРИКАРПАТТІ

Вірстюк Н.Г.¹, Данчук У.І.², Цідило І.Г.²

¹ДВНЗ "Івано-Франківський
національний медичний університет"

²КЗ "Івано-Франківський обласний
клінічний шкірно-венерологічний
диспансер"

Псоріаз відноситься до багатофакторного захворювання. Важливу роль в розвитку псоріазу відіграє спадковий чинник. **Метою** роботи було вивчення ефекту антиципації при дослідженні хворих на псоріаз на Прикарпатті.

Матеріал і методи дослідження.

Була відібрана генеалогічна інформація про 201 хворого на псоріаз, серед них 74 особи жіночої статі у віці 15-81 рік та 127 – чоловічої статі у віці 9-84 років. Фенотипи пробандів та родичів оцінювали на основі медичної документації та зі слів пацієнтів. У 49 родах була наявна інформація про вік маніфестації захворювання у пробандів та у батьків. У всіх випадках спостерігався розповсюджений псоріаз, бляшковидна форма. При вивченні маніфестації псоріазу за однаковий вік маніфестації у батька і нащадка був прийнятий співпадаючий вік ($x \pm 1$) рік. Статистичне опрацювання отриманих результатів проводили з використанням програми "Statistica 10.0 for Windows" ("Stat Soft", США).

Результати дослідження. Порівняння віку маніфестації у пробандів та у їх хворих батьків показало, що в більшості випадків (87,76 %) захворювання у нащадків розпочалося у більш ранньому віці, тобто спостерігається ефект антиципації. У 8,16 % випадків захворювання у нащадка розпочиналося у тому ж віці, що і у батьків, а в 4,08 % нащадок захворів пізніше, ніж хтось із батьків.

Явище антиципації частіше спостерігалось у дочок (95,24 %), ніж у синів (82,14 %), ($p < 0,05$). Виявлена залежність антиципації у хворих на псоріаз від статі батьків: серед дочок антиципація відзначалася у 90,0%, якщо хвора мати, у 100,0% випадків – якщо хворий батько; серед синів антиципація відзначалася у 83,33%, якщо хвора мати, у 81,25 % випадків – якщо хворий батько. Середнє значення показника відносної антиципації складає ($20,40 \pm 1,12$)%. У різних випадках успадкування цей показник варіює від ($9,09 \pm 0,75$) % до ($32,14 \pm 2,07$) %.

Висновки. 1. Серед хворих на псоріаз у (87,76 %) випадків спостерігається ефект антиципації незалежно від типу успадкування.

2. Середнє значення показника відносної антиципації складає ($20,40 \pm 1,12$) %.

УДК 616.36-002+616.36-003.826:616.379-008.9-056.7

ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЛЕПТИНУ У ХВОРИХ НА ПСОРИАЗ НА ТЛІ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ

Вірстюк Н.Г.¹, Никифорок М.М.²

¹ДВНЗ "Івано-Франківський
національний медичний університет"

²КЗ "Івано-Франківський обласний
клінічний шкірно-венерологічний
диспансер"

Метою роботи було вивчення змін вмісту лептину в крові хворих на псоріаз на тлі метаболічного синдрому (МС).

Матеріали і методи дослідження. Обстежено 74 хворих на неускладнений бляшковий псоріаз. Тривалість захворювання складала ($9,51 \pm 3,43$) років. Для оцінки важкості псоріазу використовували індекс PASI (Psoriatic Area and Severity