

МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ІЗ МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДІАГНОСТИЧНИХ, ЛІКУВАЛЬНИХ ТА ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ В ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЇ ТА МЕТОДИ І СТАН ЇХНЬОГО ВПРОВАДЖЕННЯ», 11-12 листопада 2016 року, м. Харків

Дерматологія

УДК 616.595-002.828

ДОСВІД МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ ОНІХОМІКОЗУ

Р.Ф. Айзятулов

*Донецький національний медичний
університет ім. М. Горького, м.Лиман*

В останні роки частота оніхомікозу набула масштабного характеру, і багато авторів називають цю ситуацію повсюдної епідемією. Лікування пов'язано з великими труднощами, що пояснюється в більшості випадків не вірулентністю гриба, який викликає захворювання, а зниженою реактивністю організму людини на впровадження патогенного гриба.

Мета роботи. Провести аналіз ефективності зовнішнього лікування оніхомікозу протигрибковим препаратом «Естезіфін» (нафтифіна гідрохлорид; в 1 мл розчину міститься нафтифіна гідрохлориду 10 мг).

Результати роботи. Хороші клінічні результати отримані при лікуванні оніхомі-

козу препаратом «Естезіфін» - протигрибковий засіб класу аліламінів, механізм дії якого пов'язаний з інгібуванням дії ергостеролу. Володіє високою активністю проти дерматофітів (трихофітон, епідермофітон, мікроспорум), грибів *Candida*, цвілевих грибів *Aspergillus* і інших грибів (*Sporothrix Schenckii*). Естезіфін швидко проникає в осередки ураження з утворенням стійких протигрибкових концентрацій. Слід зазначити унікальні переваги препарату «Естезіфін» в зв'язку з наявністю в комплекті крапельниці з піпеткою, що дає можливість пацієнту зручно і дозовано наносити препарат на уражений ніготь і під ноготеву пластинку, сприяє економії препарату - великий флакон 15 мл дозволяє пацієнтові отримати тривалий курс лікування. При оніхомікозі «Естезіфін» наноситься на уражені нігтьові пластинки 2 рази на добу протягом 6 місяців. Перед першим застосуванням рекомендується мильно-содова ванночка з наступною механічною чисткою уражених нігтьових пластинок. В процесі місцевої терапії необхідно проводити обов'язкове механічне чищення уражених нігтьових пластинок 1 раз на тиждень

до відростання нових нігтьових пластинок. Для попередження рецидивів лікування слід продовжувати не менше 1 місяця після зникнення основних симптомів захворювання.

Висновок. Препарат «Естезіфін» можна вважати ефективним засобом для монотерапії онихомікоза стоп і кистей рук. Необхідно рекомендувати «Естезіфін» широко впроваджувати при лікуванні онихомікозу в амбулаторних умовах, що призведе до клінічного лікування і поліпшенню якості життя пацієнтів.

УДК 615.282.07

ТОПИЧЕСКИЕ АНТИМИКОТИКИ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА

**Р.Ф. Айзятупов, Я.А. Полях,
М.Э. Скородед, О.С. Пойманова**

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Лиман

Существует большое количество антимикотиков местного действия, однако, несмотря на это с каждым годом отмечается существенный рост количества больных, что вызывает обоснованную озабоченность у врачей здравоохранения.

Цель работы. Проанализировать результаты лечения микотической инфекции с применением топических препаратов крем 1 % Ламикон и спрей 1 % Ламикон.

Результаты. При местной терапии микозов хорошо зарекомендовали себя крем 1 % Ламикон и спрей 1 % Ламикон. 1 % крем Ламикон (1 г крема содержит тербинафина гидрохлорида в пересчёте на 100% безводное вещество 0,01 г). Тербинафин – аллиламин с широким спектром противогрибкового действия. Угнетает ранний этап биосинтеза стерина в клеточной мембране гриба. Вызывает дефицит эргостерола, что приводит к внутриклеточному накоплению сквалена и ведет к гибели клетки гриба. Тербинафин оказывает фунгицидное действие про-

тив грибковых инфекций кожи, вызванных - *Trichophyton rubrum*, *T. mentagrophytes*, *T. verrucosum*, *T.v. violaceum*, *Microsporum canis* и *Epidermophyton floccosum*. Крем 1 % Ламикон наносится тонким слоем на пораженную кожу и прилегающие участки 2 раза в день (7-10 дней). При наружном лечении микозов широкое применение нашёл спрей 1 % Ламикон (действующее вещество тербинафина во флаконах с распылителем по 25 г). Обладает фунгицидным действием на дерматофиты, плесневые и некоторые диморфные грибы. При нанесении спрея в очагах поражения создается максимальная концентрация действующего вещества, а орошаемые участки покрываются защитной плёнкой, которая изолирует очаг микоза, хорошо удерживает антимикотик и не нарушает функции кожи и сальных желез. Спрей 1 % Ламикон применяется 1 раз в сутки (7 дней), не вызывает раздражения даже при нанесении на эритематозно-экссудативные очаги поражения.

Выводы. Крем 1 % Ламикон и спрей 1 % Ламикон - высокоэффективные препараты при лечении различных клинических форм микотической инфекции, не имеют побочных явлений, хорошо переносятся больными. В зависимости от особенностей клинических форм заболевания сроки клинического и микологического излечения наступают в течение 7-10 дней.

УДК 616.34:616.5-002.2

РОЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО- КИШЕЧНОГО ТРАКТА ПРИ АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ

**Р.Ф. Айзятупов, Я.А. Полях,
М.Э. Скородед, О.С. Пойманова**

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Лиман

Актуальность темы. Одним из наиболее часто встречающихся хронических рециди-