

Эспумизан®

незаменимый помощник в лечении кислотозависимых заболеваний ЖКТ

Европейское сообщество гастроэнтерологов назвало начавшееся столетие «веком гастроэзофагеальной рефлюксной болезни» (ГЭРБ). Распространенность ГЭРБ сравнивают с айсбергом с подводной и надводной частями. Большинство пациентов, которые эпизодически отмечают симптомы заболевания, не склонны обращаться к специалистам. Они составляют более 50% всех больных — «подводную часть айсберга» — и являются потенциальными пациентами не только терапевтов и гастроэнтерологов, но и хирургов

ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ

В основе патогенеза ГЭРБ лежит недостаточная барьерная функция нижнего пищеводного сфинктера с увеличением частоты эпизодов обратного забрасывания кислого желудочного содержимого в пищевод (другими словами — эпизодов изжоги), а также нарушение моторной функции желудка и пр.

Наиболее характерным симптомом ГЭРБ является изжога, которая отмечается более чем у 80% больных и возникает вследствие длительного контакта кислого желудочного содержимого со слизистой оболочкой пищевода. Изжога усиливается при погрешностях в диете, употреблении алкоголя и газированных напитков, физическом напряжении, наклонах туловища, а также в горизонтальном положении.

Другое распространенное проявление заболевания — болевой синдром (чувство дискомфорта, боль в эпигастрии и/или за грудиной, возникающие вскоре после еды и усиливающиеся при наклонах). Еще пациентов часто беспокоят отрыжка воздухом или пищей и срыгивание, а также нарушение глотания, чувство инородного тела за грудиной в виде комка пищи. Почти у всех больных наблюдается нарушение эвакуаторной функции желудка, проявляющееся чувством быстрого насыщения, вздутием живота, тошнотой и рвотой.

НЮАНСЫ ТЕРАПИИ

ГЭРБ — коварная своими осложнениями, но вместе с тем не представляющая особых трудностей в диагностике патология, которую может просто и эффективно лечить каждый врач общей практики. В терапии ГЭРБ используют антацидные препараты, антисекреторные средства и прокинетики.

В то же время данные клинических исследований указывают на важность включения в схемы комплексной терапии пациентов с ГЭРБ антифлатулентов. Препараты этой группы снижают внутрибрюшное давление, которое наряду со снижением тонуса нижнего пищеводного сфинктера, повышением кислотности и нарушением моторики желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) является одним из основных факторов развития изжоги.

Один из наиболее изученных представителей антифлатулентов — **Эспумизан®**.



Действующее вещество препарата — симетикон — изменяет поверхностное натяжение пузырьков газа, находящихся в содержимом желудка и кишечника, в результате чего они разрушаются. Действие симетикона имеет физический характер: он инертен, не всасывается в желудочно-кишечном тракте, не ферментируется микроорганизмами, выводится в неизменном виде и не участвует в биохимических процессах пищеварения и всасывания. При этом симетикон не адсорбирует лекарственные средства и не взаимодействует с ними.

СФЕРА ЭСПУМИЗАНА

Эспумизан® — эффективный и безопасный препарат для лечения метеоризма, а также других заболеваний ЖКТ, при которых присутствует повышение внутрибрюшного давления (ГЭРБ, функциональная диспепсия, синдром раздраженного кишечника).

Безопасность **Эспумизана** обусловлена исключительно его физическим механизмом действия, отсутствием взаимодействия и всасывания.

Применение **Эспумизана** в комплексной терапии кислотозависимых заболеваний позволяет достичь более быстрого уменьшения основных клинических проявлений — изжоги, абдоминальной боли (колик), диспептического синдрома — и, соответственно, повысить качество жизни пациентов. Противопоказаниями к применению **Эспумизана** являются только повышенная чувствительность к компонентам препарата и кишечная непроходимость.

Проблемы с изжогой бывают и у маленьких пациентов, однако в большинстве случаев детям сложно принимать капсулы. Куда более удобной является эмульсия для приема внутрь **Эспумизан® L**. Высокая эффективность и благоприятный профиль безопасности позволяют назначать **Эспумизан® L** детям при возникновении каких-либо неприятных ощущений в подложечной области. **Эспумизан® L** улучшает течение основного заболевания, сон, аппетит и уменьшает проявления метеоризма.



BERLIN-CHEMIE
MENARINI

Реклама лекарственного средства. Информация для специалистов в области здравоохранения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. P.C. № UA/0152/02/01 от 19.01.11, № UA/0152/01/01 от 27.11.08.