

СТОМАТИТ ГИНГИВИТ ПАРОДОНТИТ

Инфекционно-воспалительные заболевания слизистой оболочки ротовой полости и тканей пародонта, удерживающих и питающих зуб, проявляются целым рядом симптомов: покраснение, отечность, болезненность, кровоточивость, неприятный запах изо рта. Для лечения необходим комплексный подход, который может обеспечить один препарат

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ГЕЛЬ ХОЛИСАЛ

быстро устраняет боль, снимает воспаление и уничтожает патогенные микроорганизмы, не нарушая при этом баланс нормальной микрофлоры ротовой полости. Комплексное действие препарата обусловлено уникальной комбинацией активных веществ^{1,2,3}

- **Холина салицилат** — нестероидное противовоспалительное средство — быстро проникает в зону воспаления и удерживается там долгое время, устраняет отек, покраснение, боль.
- **Цеталкония хлорид** — антисептик, действующий на бактерии (*Staph. aureus*, *Strep. mutans*, *E. coli*, *Ps. aeruginosa*, *Proteus mirabilis*, *Bac. fragilis*), грибы рода *Candida* и вирус *Herpes simplex*.
- **Гелевая основа** повышает проникающую способность активных веществ и усиливает антибактериальный эффект. Эфирное анисовое масло придает приятный вкус и потенцирует противовоспалительное и антисептическое действие.

БЛАГОДАря КОМПЛЕКСНОМУ ДЕЙСТВИЮ ХОЛИСАЛ

- избавляет от боли быстро за 3 минуты и на длительный период — до 8 часов;
- санирует ротовую полость от патогенной микрофлоры;
- за 4 дня применения заживляет эрозии слизистой оболочки полости рта, возникшие после ношения зубных протезов;
- за 5 дней применения устраняет кровоточивость десен и неприятный запах изо рта

КАК ПРИМЕНЯТЬ ХОЛИСАЛ

Столбик геля длиной 1 см (для взрослых) и 0,5 см (для детей старше 1 года) выдавливают на чистый палец и втирают в течение нескольких минут в пораженный участок слизистой оболочки рта или десны. Для обезболивания — 3 раза в день, для лечения болезней пародонта — 2 раза в день после чистки зубов. В течение 30 минут после нанесения геля не следует полоскать рот водой и употреблять пищу. Длительность лечения зависит от тяжести заболевания: гингивит и пародонтит легкой степени — 10–14 дней, средней и тяжелой степени — 1 месяц. Для профилактики обострений хронического пародонтита гель применяется 1–2 раза в день при легкой степени заболевания — 10–14 дней, средней и тяжелой степени — 1 месяц.

ХОЛИСАЛ — компетентная рекомендация фармацевта, которая поможет пациенту решить его проблемы с деснами и слизистой оболочкой полости рта, а также повысит авторитет и прибыль аптеки.
ХОЛИСАЛ необходим в каждой домашней аптечке!

ХОЛИСАЛ

Надійний інструмент професіонала для здоров'я ротової порожнини

Гель комплексної дії
✓ протизапальний
✓ знеболюючий
✓ антисептичний



Усуває запалення та біль у ротовій порожнині при^{1,2}:

- тупнбу у (д ср у опн , лбоє епипон , бод м сопн)
- додг у , рбсπεου у
- о г м л пр сбуго гус боо
- усбгнб тм игпг пвпмпло

Діє на патогенну мікрофлору порожнини рта: бактерії, гриби, віруси^{1–3}

Дозволений дітям з 1 року¹

Інформація про лікарський засіб. Інформація для використання у професійній діяльності медичників та фармацевтичних працівників. Повна інформація міститься в інструкції для медичного застосування препарату. Виробник: Фармзавод Ельфа АТ, Польща. РП. № UA/7298/01/01 від 13.11.2007.
Склад: 1 г гелю містить холину салицилату 87,1 мг і хлориду цеталконію 0,1 мг; допоміжні речовини: гідроксіетилцелюлоза, метилпарагідроксибензоат, пропілпарагідроксибензоат, гліцерол, олія анісова, етанол, вода очищена. Лікарська форма. Гель зубний. Фармакотерапевтична група. Засоби для місцевого застосування у стоматології. Код АТС А01А D. Показання. Стomatити різної етіології; гінгівіти різної етіології; гострий і хронічний пародонтит; перидонтальний абсцес; травми слизової оболонки порожнини рота (у т. ч. внаслідок носіння зубних протезів); невеликі оперативні втручання; хейліти різної етіології; молочниці; зубний біль при інфекційно-запальних процесах у ротовій порожнині; у складі комплексної терапії при захворюваннях, які супроводжуються висипаннями в ротовій порожнині (вітряна віспа, червоний плоский лишай). Протипоказання. Підвищена чутливість до салицилатів та інших компонентів лікарського засобу. Дітячий вік до 1 року, вагітність (III тримістр), лактація. Побічні ефекти. У місці застосування можлива поява нетривалого печіння, згодом — алергічні реакції. Категорія відпуску. Без рецепта.

1. Інструкція для медичного застосування препарату Holisal. 2. Леонова Л.Е. Медикаментозна терапія у больных пародонтитом с использованием препарата «Холисал», методические рекомендации, 2008. 3. Shiraishi T. Review of disinfectant susceptibility of bacteria isolated in hospital to commonly used disinfectants. Postgrad. Med. J., 69 (Suppl. 3), 1993, pp. S70-77.



Представництво в Україні:
03040, Україна, м. Київ, вул. Васильківська, 1, офіс 207.
Тел./факс: (044) 461-91-96