


ВСЯ ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ

Жизнь человека от рождения до глубокой старости наполнена движением. В процессе физической нагрузки вырабатываются эндорфины, которые вызывают ощущение радости. «Живы, пока двигаемся», — говорят старики, и они совершенно правы. Но что делать, если каждое движение доставляет мучения? Неужели боль в суставах должна лишать человека таких простых и естественных радостей?!



КОГДА МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ ГЕЛЬ ДОЛОБЕНЕ?

- Травмы и их последствия
- Воспаление суставов
- Острая невралгия

КОГДА ДВИЖЕНИЕ ПРИЧИНАЕТ БОЛЬ

Боль в суставах и спине может возникать в результате чрезмерных физических нагрузок, спортивных и бытовых травм, при воспалительных заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Как правило, болят не только суставы, но и околосуставные мягкие ткани: мышцы, связочный аппарат, капсула сустава и синовиальные сумки. В крестцово-поясничном отделе боль может появиться не только из-за физических нагрузок, но и в результате долгого статического положения — сидения за компьютером или за рулем автомобиля.

Лечение с помощью топикальных противовоспалительных кремов и гелей позволяет создать терапевтические концентрации препарата непосредственно в месте нанесения. Для локальной терапии при боли в мышцах и суставах рекомендован современный лекарственный препарат с комплексным механизмом действия — наружный гель **Долобене**. Препарат характеризуется оптимальным сочетанием действующих веществ, быстрым началом воздействия и комплексным лечебным эффектом при широком спектре пока-

заний. В его состав входят три активных компонента (диметилсульфоксид, гепарин и декспантенол), которые дополняют и усиливают действие друг друга, купируя основные звенья развития боли и воспаления.

- **Диметилсульфоксид** оказывает противовоспалительное, обезболивающее, антимикробное и противоотечное действие. Это вещество повышает эффективность лечения, обеспечивая глубокое и быстрое проникновение других компонентов препарата через кожу в пораженные ткани.
- **Гепарин** проявляет противовоспалительную активность, улучшает местный кровоток, тем самым способствуя регенерации соединительной ткани и препятствуя тромбообразованию.
- **Декспантенол** снижает чувствительность кожи к раздражителям и усиливает регенерацию поврежденных тканей, стимулируя их эпителизацию.

ЭФФЕКТИВНО И УДОБНО

Гель **Долобене** наносят тонким слоем на сухую и чистую кожу в области поражения. Терапевтическая концентрация активных веществ создается непосредственно в месте нанесения. Гель удобен в применении, быстро

впитывается и не оставляет пятен на одежде. Эффективность препарата коррелирует с тяжестью исходного состояния: в одних случаях возможно быстрое и полное восстановление, в других — улучшение состояния наступает через несколько дней после начала лечения. Если состояние не улучшится, необходимо обратиться за консультацией к специалисту.

Гель Долобене поможет справиться с болью и вернуть активный образ жизни! С Долобене жизнь только начинается!

ЭФФЕКТ НЕ ЗАСТАВИТ СЕБЯ ДОЛГО ЖДАТЬ!

ТРИ КОМПОНЕНТА ГЕЛЯ ДОЛОБЕНЕ

- **быстро всасываются**
- **глубоко проникают**
- **концентрируются непосредственно в зоне поражения**



Формула з 3-х компонентів

Швидка дія саме в місці болю*

Усуває біль, запалення, набряки*



TEVA

Долобене гель

Зняти біль допомагає, радість руху повертає!

* «Місце Долобене в лікуванні ревматичних хвороб», Шуба Н. М./ НМАПО

[†] Художнє зображення органів. Долобене гель - Діюча речовина: 100 г гелю містить гепарину натрію 50000 МО; диметилсульфоксиду 15 г; декспантенолу 2,5 г; допоміжні речовини. Форма випуску. Гель. Фармакотерапевтична група. Засоби для місцевого застосування при болю у суглобах та м'язях. Код АТС M02A X. Показання для застосування. Долобене гель застосовують з метою лікування: травм (у тому числі спортивних), гематом, ушкоджень м'язів, періартрикулярних структур або суглобів (без ураження шкіри); тендинітів та тендовагінітів, бурситу, плечолопаткового періартриту та епіконділіту плеча (патологічна основа клінічного синдрому «елітний тенісиста»); гострої невралгії. Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату; виражені порушення функції печінки та/або нирок; бронхіальна астма; виражених порушеннях з боку серцево-судинної системи (виражена стенокардія, інфаркт міокарда, інсульт, виражений загальний атеросклероз); трофічні виразки ніг, що кровоточать, відкриті та/або інфіковані рани, геморагічний діатез, пурпура, тромбоцитопенія, гемофілія, схильність до кровотеч; коматозні стани, глаукома, катаракта. Побічні реакції. Зумовлені дією диметилсульфоксиду: запаморочення, безсоння, динамія, дерматити, бронхоспазм, нудота блювання. Також можливі тимчасові реакції у вигляді почервоніння, свербіж, відчуття печіння у ділянці аплікації, незначного запаху часнику з рота. Зміна смакових відчуттів, що іноді спостерігається одразу після застосування гелю, як правило, минає за кілька хвилин після його застосування. Зумовлені дією декспантенолу: контактний дерматит, алергічний дерматит, екзема, висипання, подразнення шкіри та пухирі. Зумовлені дією гепарину: припухлість шкіри, шкірний висип, геморагії, іноді – виникнення невеликих пустул, пухирців або пухирів, що швидко минають після припинення застосування препарату. При нанесенні на великі ділянки шкіри можливі системні побічні реакції. В окремих випадках можуть виникнути алергічні реакції (наприклад, кропив'янка та набряк Квінке). Умова відпуску. Без рецепта. РЛД. МОЗ України. №ЦА/5565/01/01 від 11.10.2011. Виробник. Меркле ГмБХ, Німеччина (Заявник: ратіофарм Інтернешнл ГмБХ, Німеччина). Реклама лікарського засобу. Інформація для професійної діяльності спеціалістів охорони здоров'я. Інформація призначена для розповсюдження на спеціалізованих семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики для медичних та фармацевтичних працівників. Повна інформація міститься в інструкції для медичного застосування препарату. Затверджено: вересень, 2012 р. ТОВ «ТЕВА УКРАЇНА»: вул. Фізкультури, 30-В, м. Київ, 03680 · www.teva.ua