

ГИНГИВИТ ПАРОДОНТИТ

Заболевания тканей пародонта, удерживающих и питающих зуб, проявляются такими признаками, как **покраснение, отечность, болезненность, кровоточивость десен, неприятный запах изо рта**. Прогрессирующий пародонтит может привести к потере зубов.

КОГДА ВОЗНИКАЕТ ЗАБОЛЕВАНИЕ

только чистка зубов, даже специальной зубной пастой от пародонтита, не гарантирует выздоровления. Для лечения необходим комплексный подход, который может обеспечить лекарственный препарат. При возникновении первых же неблагоприятных симптомов гингивита или пародонтита следует незамедлительно начать действовать. Причем действовать комплексно — устранять воспаление, купировать боль и уничтожать патогенные микроорганизмы.

С этими задачами отлично справляется стоматологический гель **ХОЛИСАЛ** — комбинированный препарат тройного действия, имеющий противовоспалительный, обезболивающий и антисептический эффект. Комплексное действие **ХОЛИСАЛА** обусловлено уникальной комбинацией активных веществ^{1,2,3}.

- **Холина салицилат** — нестероидное противовоспалительное средство — быстро проникает в зону воспаления и удерживается там долгое время, устраняет отек, покраснение и боль.
- **Цеталкония хлорид** — антисептик, действующий на бактерии (*Staph. aureus*, *St. mutants*, *E. coli*, *Ps. aeruginosa*, *Proteus mirabilis*, *Bac. Fragilis*), грибы рода *Candida* и вирус *Herpes simplex*.
- **Гелевая основа** повышает проникающую способность активных веществ и усиливает антибактериальный эффект. Эфирное анисовое масло придает приятный вкус и потенцирует противовоспалительное и антисептическое действие.

БЛАГОДАРЯ КОМПЛЕКСНОМУ ДЕЙСТВИЮ ХОЛИСАЛ

- избавляет от боли быстро (за 3 минуты) и на длительный период (до 8 часов);
- saniрует ротовую полость от патогенных микроорганизмов, не нарушая баланса нормальной микрофлоры;
- устраняет кровоточивость десен и неприятный запах изо рта за 5 дней применения

КАК ПРИМЕНЯТЬ ХОЛИСАЛ

Столбик геля длиной 1 см (для взрослых) и 0,5 см (для детей старше 1 года) выдавливают на чистый палец и втирают в течение нескольких минут в пораженный участок десны.

Для обезболивания — 3 раза в день, для лечения и профилактики болезней пародонта — 2 раза в день после чистки зубов.

В течение 30 минут после нанесения геля не следует полоскать рот водой и употреблять пищу.

Рекомендуя ХОЛИСАЛ как в качестве монотерапии гингивита или пародонтита, так и совместно с профилактическими зубными пастами, вы помогаете пациенту решить его проблему с деснами, а также повышаете авторитет и прибыль аптеки.

ХОЛИСАЛ необходим в каждой домашней аптечке!

ХОЛИСАЛ

Для здоров'я всього рота!

СТОМАТИТ



ГИНГИВИТ



ПАРОДОНТИТ



Гель комплексної дії!
✓ протизапальний
✓ знеболюючий
✓ антисептичний



Усуває запалення та біль у ротовій порожнині при^{1,2}:

- стоматиті (герпетичному, кандидозному, ангулярному)
- гінгівіті, пародонтиті
- невеликих оперативних втручаннях
- травмах слизової оболонки

Діє на патогенну мікрофлору порожнини рота: бактерії, гриби, віруси¹⁻³

Дозволений дітям з 1 року¹

Інформація про лікарський засіб. Інформація для використання у професійній діяльності медичних та фармацевтичних працівників. Повна інформація міститься в інструкції для медичного застосування препарату. Виробник: Фармазвод Ельфа А.Т., Польща. РІТ. № UA/7298/01/01.

Склад. 1 г гелю містить холину салицилату 87,1 мг і хлориду цеталконію 0,1 мг; допоміжні речовини: гідроксипропілцелюлоза, метилпарагідроксибензоат, пропілпарагідроксибензоат, гліцерол, олія анисова, етанол, вода очищена. Лікарська форма. Гель зубний. Фармакотерапевтична група. Засоби для місцевого застосування у стоматології. Код АТС A01A D. Показання. Стоматити різної етіології; гінгівіті різної етіології; гострий і хронічний пародонтит; перидонтальний абсцес; травми слизової оболонки порожнини рота (у т.ч. внаслідок носіння зубних протезів); невеликі оперативні втручання; хейліти різної етіології; молочниця; зубний біль при інфекційно-запальних процесах у ротовій порожнині; у складі комплексної терапії при захворюваннях, які супроводжуються висипаннями в ротовій порожнині (вітряна віспа, червоний плоский лишай). Протипоказання. Підвищена чутливість до салицилатів та інших компонентів лікарського засобу. Дитячий вік до 1 року, вагітність (III тримістр), лактація. Побічні ефекти. У місці застосування можлива поява нестривалого печіння, згодом — алергічні реакції. Категорія відпуску. Без рецепта.

1. Інструкція для медичного застосування препарату Xolisal. 2. Леонова Л.Е. Медикаментозна терапія у больных пародонтитом с использованием препарата «Xolisal», методические рекомендации, 2008. 3. Shiraishi T. Review of disinfectant susceptibility of bacteria isolated in hospital to commonly used disinfectants. Postgrad. Med. J., 69 (Suppl. 3), 1993, pp. S70-77.



Представництво в Україні:
03040, м. Київ, вул. Васильківська, 1, офіс 207.
Тел./факс: (044) 461-91-96