


КАК ГРАМОТНО РЕКОМЕНДОВАТЬ КРЕОН®

Креон® — эффективный ферментный препарат нового поколения с доказано высоким уровнем безопасности. Его можно назначать как грудным детям, так и людям пожилого возраста. В связи с этим важное значение имеет режим дозирования препарата у пациентов разных возрастных групп



Креон® выпускается в специально разработанной лекарственной форме — желатиновая капсула содержит кишечнорастворимые минимикросферы с защитным покрытием. Капсулы быстро растворяются в желудке, высвобождая сотни минимикросфер, что позволяет препарату работать эффективно и физиологично.

Дозируем правильно


Дозирование Креона основывается на индивидуальной потребности больного и зави-

сит от тяжести заболевания и состава пищи. Как правило, начальная доза для взрослого составляет от 10 000 до 25 000 ЕД липазы во время каждого основного приема пищи.

Препарат рекомендуется принимать во время еды

Капсулы и минимикросферические гранулы нужно глотать целиком, не разламывая и не разжевывая, и запивать достаточным количеством жидкости.

Однако если пациенту тяжело проглотить капсулу, ее можно раскрыть и смешать содержимое с жидкой пищей или жидкостью с нейтральной или слабокислой средой (яблочное пюре, йогурт). Такую смесь нужно съесть сразу же после приготовления.



NB!

Во время лечения Креоном необходимо употреблять достаточное количество жидкости (2–2,5 литра в день)

Оптимальные схемы дозирования

Возраст	Средняя доза
Дети младше одного года ^{1,2}	Креон 10 000 1/4–1/3 капсулы на каждые 120 мл молочной смеси или грудного молока
Дети старше одного года ^{1,2}	Креон 10 000 1–2 капсулы во время основного приема пищи
Взрослые ^{3,4}	Креон 10 000 или 25 000 1–2 капсулы (зависит от принимаемой пищи) во время основного приема



Литература:

1. Литтлевуд Д.М., Волф С.П.; Paediatric Drugs 2000 May-June; 2(3); 205–222.
2. Шадрин О.Г., Абатуров А.Е.; Здоровье Украины. – 2011, Ноябрь.
3. Инструкция для медицинского применения препарата Креон®.
4. Кучерявый Ю.В., Маев И.В.// Клинические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии. – 2005. – № 5.



Р.С. № UA/9842/01/01, № UA/9842/01/02, № UA/9842/01/03.
Реклама лекарственного средства. Для специалистов здравоохранения.
Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.