

# Nota bene: лечим кашель с Амбробене

Осенью в аптеку часто обращаются с просьбой: «Дайте что-нибудь от кашля». Если со стороны пациента такая формулировка вполне оправданна, то для провизора абсолютно недопустимо предложить на выбор несколько препаратов с различным действием

Важной характеристикой кашля для оценки подхода к его терапии является продуктивность. При сухом навязчивом и изнуряющем кашле применяют препараты с противокашлевым компонентом. При продуктивном кашле с вязкой мокротой показаны отхаркивающие лекарственные средства. Как правило, это фитопрепараты, увеличивающие объем мокроты и усиливающие кашель путем стимуляции гастропульмонального рефлекса. Однако в силу своего действия они могут вызывать такие побочные эффекты, как тошнота, рвота, а также развитие синдрома «заболованных бронхов»<sup>1</sup>. Если же реологические свойства мокроты изменены и вязкость ее повышена, целесообразно применять муколитики. При этом следует отдавать предпочтение тем из них, которые, разжижая мокроту, не увеличивают ее объем в значительной степени. Ведь это, как и в случае с отхаркивающими препаратами, может привести к синдрому «заболованных бронхов».

## КАЖДЫЙ ПРОВИЗОР ДОЛЖЕН ЗНАТЬ...

Как известно, при развитии воспалительного процесса в дыхательных путях происходит нарушение синтеза сурфактанта, препятствующего «спадению» альвеол при дыхании. Его недостаток может вызвать нарушение дыхания. Сурфактант часто называют главным защитником легких. Поэтому, рекомендуя препарат от кашля, сле-

дует отдавать предпочтение тем средствам, которые влияют на синтез сурфактанта.

Также нужно учитывать, что в терапии инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей часто используют антибиотики. Поэтому важно, чтобы муколитик был совместим с ними.

## АМБРОБЕНЕ СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

Всем описанным требованиям соответствует препарат Амбробене, который содержит амброксол. Важно, что, разжижая мокроту, он практически не увеличивает ее объем<sup>2</sup>. Это минимизирует вероятность развития синдрома «заболованных бронхов». Также Амбробене способствует выведению мокроты, увеличивает продукцию сурфактанта и совместим с антибиотиками<sup>3</sup>.

Разнообразие лекарственных форм Амбробене удовлетворит вкусы самых разных пациентов.

- Амбробене сироп 100 мл (амброксола гидрохлорид — 15 мг/5 мл). Не содержит сахара<sup>4</sup>, но имеет сладкий вкус и малиновый запах. Показан взрослым и детям с 2 лет. Можно рекомендовать для «вкусного лечения».
- Амбробене раствор 100 мл и 40 мл (амброксола гидрохлорид — 7,5 мг/1 мл). Высокое содержание действующего вещества в 1 мл позволяет снизить объем принимаемой дозы, поэтому флакона хватает на более продолжительный период лечения. Не содержит ароматизаторов<sup>5</sup>. Без запаха. Показан взрослым и детям с 2 лет. Можно рекомендовать пациентам, предпочитающим принимать лекарства без запаха.
- Амбробене таблетки 30 мг. Рекомендован взрослым и детям с 12 лет — по 1 таблетке 3 раза в день.
- Амбробене капсулы пролонгированного действия 75 мг. Рекомендован взрослым и детям с 12 лет — по 1 капсуле 1 раз в сутки.

Проявите внимание к своему клиенту. Задав несколько дополнительных вопросов, вы сможете не только оказать квалифицированную помощь в выборе эффективного лекарственного средства, но и подобрать наиболее удобную для пациента лекарственную форму. Это повысит лояльность посетителя к вашей аптеке и укрепит ее имидж.



TEVA

## Амбробене

Переможіть кашель!

Реклама лікарського засобу. Інформація для спеціалістів у галузі охорони здоров'я. Фармакотерапевтична група. Муколітичні засоби. Протипоказання. Алергія до компонентів препарату; виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки; перший тримістр вагітності; лактація. **Умови та строки зберігання.** Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25–30 °С. Термін придатності – 5 років. **Умови відпуску.** Без рецепта. **Виробник.** Меркле ГмБХ, вул. Людвіга Меркле, 3, 89143, Блаубойрен, Німеччина, (капсули: Мефа АГ, Швейцарія; сироп: Меркле ГмБХ, Німеччина (виробник кінцевого продукту), Мефа АГ, Швейцарія (виробник in bulk)). **Заявник.** Ратіофарм ГмБХ, вул. Граф-Арко, 3, 89079, Ульм, Р.П. **МОЗ України** № ЦА/1853/01/01 від 25.02.2009, № ЦА/1853/02/01 від 13.10.2009, № ЦА/1853/03/01 від 30.12.2009, № ЦА/1611/01/01 від 25.02.2009. **Повна інформація про застосування препаратів міститься в інструкціях для медичного застосування.** Макет затверджено: вересень 2012. **ТОВ «ТЕВА УКРАЇНА»:** вул. Фізкультури, 30-В, м. Київ, 03680 [www.teva.ua](http://www.teva.ua)

1. Руденко Н.Н., Томаш О.В. Мукорегуляція в терапевтичній практиці: що доказано? [www.edicusamicus.com](http://www.edicusamicus.com) 2. Мизерницький Ю.Л., Ермакова І.Н. Тактика вибору мукоактивного препарату [www.consilium-medicum.com](http://www.consilium-medicum.com) 3. Інструкція для медичного застосування препарату Амбробене сироп. 4. В складі допоміжних речовин Амбробене в формі сиропу входить сорбіта розтвор 70%, пропіленгліколь, сахарин натрій, ароматизатор малиновий, вода очищена. 5. В складі допоміжних речовин Амбробене в формі розчину входить калія сорбат, кислота хлористоводородна 25%, вода очищена.