

Кларитин®

20 лет доверия в Украине



По статистике, от аллергии страдает от 20 до 40% населения планеты. При этом эксперты ВОЗ утверждают, что количество аллергиков ежегодно увеличивается на 4–5%. Аллергия снижает качество жизни и отрицательно сказывается на социальной активности, доставляя физические и душевные страдания

ВЕКТОР ДЛЯ ИННОВАЦИЙ

История создания и применения антигистаминных препаратов началась в 30-х гг. XX ст. Практически все средства первого поколения для лечения аллергии обладают широким спектром побочных эффектов, что существенно ограничивает их применение. Поэтому на определенном этапе задачей ученых стало создание эффективного антигистаминного препарата с благоприятным профилем безопасности, важной составляющей которого было бы отсутствие снотворного действия. В отличие от своих предшественников, антигистаминные препараты второго поколения практически не обладают седативным и холинолитическим эффектами, не проникают через гематоэнцефалический барьер, не снижают умственную и физическую активность, не адсорбируются с пищевыми продуктами в желудочно-кишечном тракте, имеют высокое сродство к H₁-рецепторам и отличаются быстрым терапевтическим воздействием. Одним из наиболее успешных представителей этой группы препаратов стал Кларитин®, который в течение 20 лет дарит нашим соотечественникам свободу от аллергии.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

- Кларитин® — оригинальный препарат лоратадина, выпускаемый компанией-разработчиком¹.
- Компания «Шеринг-Плау» начала исследования по созданию неседативного антигистаминного препарата еще в начале 60-х гг. прошлого века — на разработку Кларитина ушло более 20 лет².
- День рождения препарата — 31 октября 1986 г., когда Кларитин® (лоратадин) был подан на регистрацию в Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA)².
- Стоимость разработки молекулы действующего вещества Кларитина — лора-

тадина — составила, по оценкам экспертов, более 200 млн долларов США².

- Процесс первой регистрации Кларитина в США длился 77 месяцев (6,5 лет). На протяжении этого времени были проведены многочисленные плацебо-контролируемые исследования. Таким образом, Кларитин® был глубоко изучен еще до того момента, как впервые попал на аптечный прилавок².

- Эффективность Кларитина продемонстрирована в 94 исследованиях, в которых приняли участие 32 700 пациентов, проживающих на 5 континентах³.

- Кларитин® — популярный антигистаминный препарат среди населения, высокая степень доверия к которому обусловлена проверенной эффективностью и минимальным риском побочных эффектов⁴.

- Выраженный антигистаминный эффект развивается через 1–3 часа после приема Кларитина и сохраняется в течение суток⁴.

- Кларитин® — первый в мире антигистаминный препарат, рекомендованный к применению пилотам и водителям, страдающим аллергией. Использование Кларитина обеспечивает лицам с аллергией такую же внимательность и сосредоточенность, как у тех, кто не страдает этим заболеванием⁵.

- Кларитин® — один из самых покупаемых антигистаминных препаратов второго поколения. По итогам 2012 г. Кларитин признан брендом № 1 в денежном выражении (исследования проводились в 58 странах мира)¹.

- Более 400 млн таблеток Кларитина продано в мире за 2012 г.¹

- Более 60 млн человек принимали Кларитин® в течение 2012 г.¹

- Кларитин® — первый антигистаминный препарат второго поколения, который появился в Украине.

- На фармацевтическом рынке Украины Кларитин® присутствует 20 лет. За это время он завоевал безупречную репутацию среди

специалистов и потребителей, благодаря чему и сегодня остается инновационным препаратом, качество и безопасность которого проверены временем.

К 20-ЛЕТИЮ КЛАРИТИНА В УКРАИНЕ

К юбилею появления Кларитина на фармрынке Украины приурочен ряд мероприятий как для специалистов, так и для потребителей:

- *будут проведены тренинги для сотрудников крупнейших аптечных сетей Украины на тему «Навыки продаж премиум-бренда на примере Кларитина», в которых примут участие около 1000 фармацевтов из Киева, Львова, Харькова, Донецка, Днепропетровска, Одессы и Симферополя;*
- *потребители смогут получить актуальную информацию о жизни без аллергии на обновленном сайте www.claritime.com.ua;*
- *будет проведена самая длинная в истории Кларитина TV-кампания;*
- *Кларитин® получил «в подарок» новый дизайн упаковки*

Литература

1. Internal DATA.
2. S. HALL. The Claritin Effect. NYTM, 2001.
3. U.S. National Institutes of Health, 2012.
4. Кларитин®. Інструкція для медичного застосування препарату.
5. ATCS Therapeutic drug guidelines. — 2009; rev. 13: 1–24.

Дивовижні факти про Кларитин®

Лоратадин



- ! Кларитин® — перший антигістамінний препарат 2-го покоління, який з'явився в Україні³.
- ! Кларитин® популярний у 60 країнах світу².
- ! Ефективність Кларитину продемонстрована у 94 дослідженнях (32 700 пацієнтів на 5 континентах)⁵.
- ! Понад 400 мільйонів таблеток Кларитину продано у всьому світі за 2012 рік. Понад 60 мільйонів людей приймали Кларитин® протягом цього року².
- ! Компанія «Шерінг-Плау» почала дослідження щодо створення неседативного антигістамінного препарату ще на початку 1960-х років. Більше ніж 20 років пішло на створення Кларитину!³
- ! День народження Кларитину — 31 жовтня 1986 року, коли Кларитин® (лоратадин) був поданий на реєстрацію в Управління з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (FDA)³.
- ! Процес першої реєстрації Кларитину в США тривав 77 місяців (6,5 року). Протягом цього часу були проведені численні плацебо-контрольовані дослідження. Препарат був глибоко вивчений ще до моменту, коли він вперше потрапив на полиці аптек³.
- ! Вартість розробки молекули діючої речовини Кларитину — лоратадину — становила, за оцінками експертів, більше ніж 200 млн дол. США!³
- ! Кларитин® — перший антигістамінний препарат у світі, рекомендований для застосування у пілотів літаків та водіїв⁴.



Авторські права ©ТОВ «МД Україна 2013. Усі права захищено. 03038, Київ, вул. Амосова, 12, буд. 1, 3-й поверх. Тел./факс: (044) 393 74 80/81. www.msd.ua Виробник: Шерінг-Плау Лабо Н. В., Бельгія. Кларитин® — зареєстрована торговельна марка MSD Consumer Care, Inc. PC. Таблетки: Наказ МОЗ України № 680 від 21.09.2009 р., № UA/10060/01/01. МСС-UKR-CLA-060-31.01/14. Сироп: Наказ МОЗ України № 3 від 06.01.11 р., № UA/2171/02/01. Відпускається без рецепта.

¹ Kaiser H., Gopalan G., Chung W. Allergy Asthma Proc 29:654–658, 2008. ² Internal data.

³ Hall S. The Claritin Effect. NYTM, 2001. ⁴ ATCS Therapeutic drug guidelines, 2009; rev.#13:1–24.

⁵ U.S. National Institutes of Health, 2012.

Інформація для професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників.

КЛАРИТИН®. Р.п. №UA/10060/01/01 від 19.07.2012 р. Склад. 1 таблетка містить лоратадину 10 мг. Виробник. Шерінг-Плау Лабо Н.В., Бельгія. **Фармакотерапевтична група.** Антигістамінні засоби для системного застосування. **Код АТС.** R06A X13. **Показання до застосування.** Симптоматичне лікування алергічного риніту та хронічної ідіопатичної кропив'янки. **Протипоказання.** Протипоказаний пацієнтам з підвищеною чутливістю до активної речовини або будь-якого іншого компонента препарату. Таблетки Кларитин® містять лактозу, тому препарат не застосовують у людей з рідкісною спадковою непереносимістю галактози, лакто-лактазної недостатності або глюкозо-галактозної мальабсорбції. Не рекомендується застосування препарату в період годування груддю. Препарат у формі таблеток призначають при масі тіла більше 30 кг. Діти з масою тіла менше 30 кг застосовують препарат у формі сиропу. **Побічні ефекти.** З боку імунної системи – анафілаксія; з боку нервової системи – запаморочення; з боку серцево-судинної системи – тахікардія, відчуття серцебиття; з боку ШКТ – нудота, сухість у роті, гастрит; з боку печінки – порушення печінкових функцій; з боку шкіри та підшкірної тканини – висипи, алергічні прояви та прояви у місцях введення – втомля. **Категорія відпуску.** Без рецепта. **Повна інформація про лікарський засіб** міститься в інструкції для медичного застосування препарату.

