

# Как бороться с острой инфекцией?

Применяют с 1 года при:

- воспалительных процессах различной локализации
- инфекционных заболеваниях
- нервном возбуждении



Препарат Вибуркол не оказывает прямого жаропонижающего эффекта, но оптимизирует температуру тела до показателей, при которых работа иммунной системы остается эффективной<sup>1</sup>

Оказывает действие:

- дезинтоксикационное
- противовоспалительное
- седативное
- обезболивающее
- спазмолитическое

**ИНТОКСИКАЦИЯ, ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА — ЧАСТЫЙ СИМПТОМ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ<sup>1</sup>**

(преимущественно инфекционной этиологии)

**ПРИЗНАКИ:** вялость, слабость, ломота в мышцах, головная боль, нарушение аппетита и сна, тошнота, рвота)

В комплексном лечении при:

- вирусных инфекциях<sup>3, 4</sup>
- аллергических заболеваниях<sup>3, 4</sup>

Оказывает:

- непрямоe противовирусное действие<sup>1, 2, 3</sup>
- дезинтоксикационное действие<sup>1, 2, 3</sup>
- активирует неспецифические защитные механизмы организма<sup>1, 2, 3</sup>



Применяют у детей с рождения, беременных или кормящих (по назначению врача)<sup>2, 3</sup>



Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников.

Полная информация о препаратах содержится в инструкциях по медицинскому применению.

**ВИБУРКОЛ (VIBURCOL®).** Состав. Действующие вещества: 1 суппозиторий 1,1 г содержит: *Atropa belladonna D2* — 1,1 мг, *Calcium carbonicum Hahnemanni D8* — 4,4 мг, *Matricaria recutita D1* — 1,1 мг, *Plantago major D3* — 1,1 мг, *Pulsatilla pratensis D2* — 2,2 мг, *Solanum dulcamara D4* — 1,1 мг. Показания. Воспалительные процессы различной локализации: ЛОР-органов, половых органов у женщин, инфекционные заболевания (ОРВИ, острые заболевания верхних дыхательных путей, инфекционно-воспалительные процессы внутренних органов), нервное возбуждение, состояние судорожной готовности. Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам препарата, ромашке лекарственной или другим растениям семейства сложноцветных. Побочные эффекты. В очень редких случаях возможны аллергические реакции, включая сыпь, зуд. Р.С. МЗ Украины № UA/6662/01/01 от 15.06.2012.

**ЭНГИСТОЛ (ENGYSTOL®)** Состав. 1 таблетка содержит: *Sulfur D4* — 37,5 мг, *Sulfur D10* — 37,5 мг, *Vincetoxicum hirundinaria D6* — 75 мг, *Vincetoxicum hirundinaria D10* — 75 мг, *Vincetoxicum hirundinaria D30* — 75 мг. Показания. В комплексном лечении гриппа и других вирусных заболеваний. Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Побочные эффекты. В отдельных случаях возможны реакции гиперчувствительности, включая сыпь, зуд, ангионевротический отек. Если возникли такие реакции, необходимо временно прекратить применение препарата. Р.С. МЗ Украины № UA/2053/02/01 от 07.03.2013 г.

Производитель. Биологиче Хайльмиттель Хеель ГмбХ, Германия.