

Как справиться с интоксикацией во время воспалительных заболеваний ?

Способствует устранению интоксикации^{1,3}

Оказывает дезинтоксикационное и противовоспалительное действие

Оптимизирует повышенную температуру тела до показателей, при которых работа иммунной системы остается эффективной^{1,2}



Применяют с 1 года

ИНТОКСИКАЦИЯ — ЧАСТЫЙ СИМПТОМ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ^{1,3}

(преимущественно инфекционной этиологии)

Признаки: вялость, слабость, ломота в мышцах, головная боль, нарушение аппетита и сна, тошнота, рвота

Активирует неспецифические защитные механизмы организма^{1,2}

Способствует завершению воспаления^{1,4}

Оказывает действие:

- дезинтоксикационное^{1,2}
- не прямое противовирусное^{1,2}



Применяют с рождения

Оказывает действие:

- противовоспалительное
- иммунокорректирующее
- противоотечное



Применяют с рождения

-Heel
Healthcare designed by nature

1. Крамарев С.А. Палатная Л.А., Шаумгия Б.К. Альтернативные методы лечения и профилактики гриппа и ОРВИ у детей // Методические рекомендации МОЗ Украины, — 2006 г. — 37 с.

2. Engistol an antiviral immunostimulator. Product Monograph. // Biologische Heilmittel Heel GmbH. — 2008 г. — 24 с.

3. Самойленко И.Г., Бухтияров Э.В. Использование антигомотоксических препаратов в лечении обструктивного бронхита у детей // Тезисы докладов VIII Всеукраинской научно-практической конференции «Актуальные вопросы педиатрии», посвященной памяти проф. В.М. Сидельникова. — г. Киев. — 16-18 ноября 2006 года. — с. 79.

4. Монография на препарат Траумель С // Монография по препарату Траумель С / Пер. с англ. М.: Арнебия, 2011. — 53 с.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ. ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПАРАТАХ СОДЕРЖИТСЯ В ИНСТРУКЦИЯХ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ.

ВИБУРКОЛ (VIBURCOL®). Состав. Действующие вещества: 1 суппозиторий 1,1 г содержит: *Atropa bella-donna* D2 — 1,1 мг, *Calcium carbonicum Hahnemanni* D8 — 4,4 мг, *Matricaria recutita* D1 — 1,1 мг, *Plantago major* D3 — 1,1 мг, *Pulsatilla pratensis* D2 — 2,2 мг, *Solanum dulcamara* D4 — 1,1 мг. Вспомогательные вещества: твердый жир. Лекарственная форма. Суппозитории. Фармакотерапевтическая группа. Комплексный гомеопатический препарат. Показания. Воспалительные процессы различной локализации: ЛОР-органов, половых органов у женщин, инфекционные заболевания (ОРВИ, острые заболевания верхних дыхательных путей, инфекционно-воспалительные процессы внутренних органов), нервное возбуждение, состояние судорожной готовности. Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам препарата, ромашке или другим растениям семейства сложноцветных. Побочные эффекты. В очень редких случаях возможны аллергические реакции, включая сыпь, зуд, Р.С. № UA/6662/01/01 от 15.06.2012.

ЭНГИСТОЛ (ENGYSTOL®) Состав. 1 таблетка содержит: *Sulfur D4* — 37,5 мг, *Sulfur D10* — 37,5 мг, *Vincetoxicum hirundinaria* D6 — 75 мг, *Vincetoxicum hirundinaria* D10 — 75 мг, *Vincetoxicum hirundinaria* D30 — 75 мг. Вспомогательные вещества. Магния стеарат, лактоза моногидрат. Лекарственная форма. Таблетки. Фармакотерапевтическая группа. Комплексный гомеопатический препарат. Показания. В комплексном лечении гриппа и других вирусных заболеваний. Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Побочные эффекты. В отдельных случаях возможны реакции гиперчувствительности, включая сыпь, зуд, ангионевротический отек. Если возникли такие реакции, необходимо временно прекратить применение препарата. Р.С. № UA/2053/02/01 от 07.03.2013 г.

ТРАУМЕЛЬ С (TRAUMEEL® S). Таблетки. Состав. Действующие вещества: *Achillea millefolium*, *Aconitum napellu*, *Arnica montana*, *Atropa bella-donna*, *Bellis perennis*, *Calendula officinalis*, *Echinacea*, *Echinacea purpurea*, *Hamamelis virginiana*, *Hepar sulfuris*, *Hypericum perforatum*, *Matricaria recutita*, *Mercurius solubilis Hahnemanni*, *Symphytum officinale*. Фармакотерапевтическая группа. Комплексный гомеопатический препарат. Показания. В комплексной терапии при таких заболеваниях и состояниях: повреждение тканей при травмах (спортивных, бытовых) в виде ушибов, растяжений, вывихов, гематом, перелома костей и суставов; сотрясение головного мозга; острые и хронические воспалительные заболевания опорно-двигательного аппарата (тендовагинит, плечелопаточный периартрит, бурсит, артрит тазобедренного, коленного суставов и суставов стопы и кистей рук); зубочелюстного аппарата (периодонтит, пародонтит, гингивит); остеохондроз. Противопоказания. Повышенная чувствительность к одному из активных компонентов или вспомогательных веществ — арники, ромашки, *Achillea millefolium* или другим растений семейства астровых (сложноцветных). Полный список противопоказаний указан в инструкции по медицинскому применению препарата. Побочные эффекты. Препарат обычно хорошо переносится, но в очень редких случаях у лиц с повышенной чувствительностью к растениям сложноцветных (например *Arnica*, *Calendula*, *Achillea millefolium*) или к другим компонентам препарата могут возникать гиперсаливация; аллергические реакции, в том числе покраснение, отеки, сыпь, зуд, крапивница, в таком случае его применение необходимо прекратить. Р.С. № UA/5934/02/01 от 01.02.2013 г. Производитель. Биологиче Хайльмитель Хеель ГмбХ, Германия.