


«Капли датского короля»



На страницах художественной литературы, в том числе различных мемуаров, иногда можно встретить названия лекарств, которые в наше время уже не применяются либо обрели другое название. Если читатель, столкнувшийся с таким термином, не оставит его без внимания, а проявит интерес, то сможет не только более полно понять прочитанное, но и наверняка обогатит свои знания в истории фармации



«ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ...»

В репертуаре одного из наиболее ярких представителей жанра авторской песни 1960–1980 гг. Булата Окуджавы была одна довольно популярная шуточная песенка под названием «Капли датского короля», где есть такие слова:

«С детских лет поверил я,
Что от всех болезней
Капель датского короля
Не найти полезней».

После такой интригующей «рекламы» у многих слушателей возникает естественный интерес к неизвестному лекарству, тем более что исполнитель в припеве еще и призывает: «Капли датского

короля пейте, кавалеры!». Поскольку в современных справочниках ЛС таких капель не значится, можно предположить, что это просто выдумка автора.

Однако упоминание о каплях датского короля иногда встречается и в более ранних литературных произведениях, как, например, в рассказе А.П. Чехова «Аптекарша», впервые опубликованном в юмористическом журнале «Осколки» в 1886 г. Следовательно, препарат с таким названием все-таки существовал, но для установления истины нужно обратиться к научной, а не к художественной литературе, где он оставил лишь свои «следы».

Версию о том, что название капель каким-то образом может быть связано с отравлением датского короля — отца принца Гамлета, можно сразу отбросить, поскольку тот был отравлен соком белены.

КУДА ПРИВЕЛИ «СЛЕДЫ»?

Лекарство «капли датского короля» действительно существовало и применялось в медицине под таким названием вплоть до начала XX в., а его рецепт был впервые опубликован в 1772 г. в Копенгагене в первой датской фармакопее, где на латыни значилось:

ELIXIR PESTORALE RINGELMANNI,
vulgo REGIS DANIAE

R. Extract Liquiritiae uncias fex,
Aqua Focniculi libram unam,
Spiritus Salis Ammoniaci anifari libras trcs.
Per viginti quatuor horas digelta colentur



ІБУПРОФЕН -Дарниця

Состав эликсира — экстракт лакрицы, укропная вода и раствор анисового масла в аммиаке — в неизменном виде воспроизвоздился в последующих изданиях датской фармакопеи, выходивших уже в XIX в. Название «капли короля» рецепт получил потому, что, в соответствии с поверью, он «мог вылечить больного от смерти». Что же касается фамилии Ringelmanni, присутствующей, как можно видеть в названии рецепта, то, по всей вероятности, это — фамилия того человека, который его придумал и апробировал.

Рецепт эликсира, а также его варианты приводились в многочисленных германских фармакопеях, в которых, как правило, присутствовали ссылки на издания «Pharmacopoea Danica». Имеются сведения об этом эликсире и в голландских фармакопеях. Упоминания в различных справочниках позволили установить, что помимо наименования «грудной эликсир датского короля» стали использовать также название «датские капли»: в частности, Dänische Tropfen встретилось в немецкой энциклопедии, выпущенной в свет в 1887 г.

ИЗ ДАНИИ — В РОССИЮ

В Российской Империи ЛС был известен уже в конце XVIII в., о чем может свидетельствовать тот факт, что в 1787 г. Государственная медицинская коллегия издала аптекарский устав и аптекарскую таксу под названием «Оценка лекарствам, при том: Устав аптекарский, Устав повивального бабкам. Устав о должной плате медицинским чинам». В нем среди 1684 наименований упомянут и «Elixir Pectorale Regis Daniae... эликсир грудный короля Датского».

Интересно отметить, что высокую оценку препаратам, содержащим нашатырно-анисовый спирт, давал наш земляк Нестор Амбодик-Максимович — «надворный советник, медицины доктор и повивального искусства профессор». Так, в своем сочинении «Врачебное веществословие или описание целительных растений в пищу и лекарства употребляемых с изъяснением пользы и употребления оных...» (1785 г.) он писал: «Нашатырно-анисная водка часто от врачей предписывается, как надежное разбивающее и укрепляющее лекарство».

В 1866 г. вышло в свет первое издание «Российской фармакопеи». В этом обязательном руководстве для всех аптек России были представлены и рецепт лакричного эликсира, и его «королевское» название Elixir pectorale regis Daniae.

В дальнейшем список наименований эликсира был дополнен: в четвертом издании 1891 г. появились «Датские капли», а в пятом и шестом (последнем дореволюционном) изданиях «Российской фармакопеи» их заменили «Капли датского короля».

О распространности этого названия в конце XIX — начале XX в. говорит многое: его упоминают авторы различных фармацевтических справочников и лечебников, можно найти в энциклопедических и лингвистических словарях.

Таким образом, «утверждение» Булата Окуджавы о том, что капли датского короля — средство «от всех болезней», является явным преувеличением, а вот при острых и хронических заболеваниях дыхательных путей эти капли, но теперь уже под названием Грудной эликсир (Elixir pectoralis) — достаточно эффективны, способствуют разжижению и выведению мокроты из дыхательных путей. Такой эликсир и в наше время производится и широко используется в Украине

Подготовил Руслан Примак, канд. хим. наук

Для позбавлення
від болю,
не порушуючи ритм
життя і плани пацієнта



Для позбавлення
від болю

- при головному
та зубному болю;
- дисменореї;
- невралгії;
- болю у спині,
суглобах, м'язах;
- при ревматичних
болях



Склад. Дюча речовина: 1 таблетка містить ібупрофену 200 мг; допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, натрію кроскармелоза, кремнію діоксид колоїдний безводний, крохмаль кукурудзяний, матініє стеарат. Лікарська форма. Таблетки. Основні фізико-хімічні властивості: таблетки білого або майже білого кольору, круглої форми, з двоюгую поверхнею. Фармакотерапевтична група. Нестероїдні протизапальні та протиіріматичні засоби. Код ATХ М01АЕ01. Протипоказання. Підвищена чутливість до ібупрофену або до будь-якого з компонентів препарату. Алергічна реакція (наприклад, бронхіальна астма, риніт, набряк Квінке або крапивніка) після застосування ібупрофену або інших нестероїдних протизапальних засобів. Застосування препарату разом з іншими нестероїдними протизапальними засобами, включаючи специфічні інгібітори циклооксигеназ-2. Виразкова хвороба шлунка у даних чоловіків з анамнезом більше чотирьох згадок загострення виразкової хвороби чи кровотечі). Кровотеча у верхніх відділах травного тракту або прорив в анатомізі, пов'язані з попереднім лікуванням нестероїдними протизапальними засобами. Тіжка ниркова, печінкова або серцева недостатність. III триместр вагітності. Цереброваскулярні або інші кровотечі. Порушення кровотворення або згортання крові. Способ застосування та дози. Для перворічного застосування. Мінімально ефективну дозу застосовувати протягом нетривалого періоду: для позбавлення від симптомів болю — не більше 5 діб, для позбавлення від симптомів пропаснис — не більше 3 діб. При необхідності застосування препаратору більше 5 дін (якщо симптоми не зникають) слід звернутися до лікаря. Препарат призначати дорослим та дітям з масою тіла більше 20 кг (приблизно з 6 років) з розрахунком від 20 до 30 мг/кг маси тіла на добу. Не можна перевищувати дозу 30 мг/кг маси тіла на добу. Дітям з масою тіла від 20 до 30 кг (віком від 6 до 11 років) слід застосовувати 200 мг (1 таблетка), повторна доза при необхідності — через 6 год, але в будь-якому разі не більше 600 мг (3 таблетки) на добу. Дорослим і дітям з масою тіла більше 30 кг (віком від 12 років) застосовувати по 1–2 таблетки (200–400 мг ібупрофену) 3–4 рази на добу після їди. Рекомендованна початкова доза становить 1–2 таблетки. Максимальна добова доза — 1200 мг (6 таблеток). Особи літнього віку не потребують спеціального дозування. Пояснення з порушенням функції нирок та печінки (екзо-або помірного спустошення) не потребують коригування дози. Побічні ефекти. Перелік зачінчених низки побічних ефектів пов'язаних з побічними ефектами, що спостерігаються при нетривалому застосуванні ібупрофену у складі препаратів, що відпускають без receptу. При тривалому лікуванні хронічних захворювань можуть виникати додаткові побічні ефекти. Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C. Зберегати у недоступному для дітей місці. Упаковка. За рецептом. Р.П. № UA/2350/01/01. Інформація наведена в скороченні, більш детальна інформація викладена в інструкції для медичного застосування препарату. Інформація для розміщення у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.